

	Prehabilitatie groep: gebruikelijke preoperatieve zorg + prehabilitatie	
Toewijzen van behandeling	Patiënten worden blind gerandomiseerd tot reguliere zorg of prehabilitatie in een 1:1 ratio	Gebaseerd op datum van multidisciplinair overleg wordt patiënt toegewezen aan reguliere zorg (consult voor 1 juni 2017) of prehabilitatie (consult na 31 oktober 2018)
Follow-up	Start is gedefinieerd als datum van informed consent en vaststelling baseline karakteristieken. Patiënten worden opgevolgd tot 30 dagen na tumorresectie. Wanneer geen operatie wordt uitgevoerd na inclusie, worden patiënten opgevolgd tot 2 maanden na baseline	Start is gedefinieerd als datum van multidisciplinair overleg. Patiënten worden opgevolgd tot 30 dagen na tumorresectie. Wanneer geen operatie wordt uitgevoerd na inclusie, worden patiënten opgevolgd tot 2 maanden na baseline
Uitkomst-parameters	Primair: Aantal patiënten met een complicatie (totale follow-up periode, preoperatieve periode en postoperatieve periode) Secundair: complicatiescore per patiënt, aantal ligdagen, aantal heropnames	Idem
Causaal contrast	'Intention-to-treat'-effect 'Per-protocol'-effect (tenminste 9 consultaties met fysiotherapeut en 2 consultaties met diëtist)	Idem
Statistische analyse	'Intention-to-treat'-analyse en 'per-protocol'-analyse	'Intention-to-treat'-analyse includeert alle patiënten in zowel de gebruikelijke zorg als prehabilitatiegroep (ongeacht of de patiënten daadwerkelijk gestart zijn met prehabilitatie). 'Per-protocol'-analyse includeert alle patiënten in de groep met gebruikelijke zorg en patiënten die het prehabilitatieprogramma tenminste 3 weken gevolgd hebben. Weging gebaseerd op propensity-score om te corrigeren voor baseline confounding