

Dit is de volledige versie van de tabel die bij het artikel in het tijdschrift is afgedrukt, in de vorm zoals aangeleverd door de auteurs; deze tabel is niet vormgegeven of bewerkt door de redactie van het *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*.

Tabel

Belangrijke karakteristieken van deelnemers in het ANDIS cohort, en beschikbare confirmatiestudies

Cluster	%	Leeftijd bij diagnose (jr)	HbA1c (mmol/mol)	BMI (kg/m ²)	HOMA2-B (%)	HOMA2-IR
ANDIS cohort	n=8980					
1 - SAID	6.4	50.5	80	27.4	57	2.2
2 - SIDD	17.5	56.7	102	28.9	48	3.2
3 - SIRD	15.3	65.2	54	33.8	150	5.5
4 - MOD	21.6	49.0	58	35.7	95	3.4
5 - MARD	39.1	67.4	50	27.9	87	2.6
Duitsland	n=1105					
1 - SAID	22	37.7	46	26.5	56	1.1
2 - SIDD	3	43.8	72	27.0	39	1.7
3 - SIRD	11	58.6	44	34.2	173	3.9
4 - MOD	29	45.7	48	34.7	97	2.7
5 - MARD	35	58.8	45	27.4	86	1.9
Japan	n=1255					
1 - SAID	5.4	48	70	23.1	33	0.9
2 - SIDD	19.0	51	89	24.7	20	1.2
3 - SIRD	7.2	48	57	28.3	143	3.1
4 - MOD	28.9	53	53	26.1	79	2.0
5 - MARD	39.5	56	54	24.0	44	1.1
ORIGIN studie	n=7017					
1 - SAID	3.4	59	48	29.2	n.a.	n.a.
2 - SIDD	22.7	56	61	28.1	n.a.	n.a.
3 - SIRD	13.0	64	46	32.9	n.a.	n.a.
4 - MOD	22.7	52	47	33.9	n.a.	n.a.
5 - MARD	38.1	64	43	27.4	n.a.	n.a.

SAID=severe autoimmune diabetes. SIDD=severe insulin-deficient diabetes. SIRD=severe insulin-resistant diabetes. MOD=mild obesity-related diabetes. MARD=mild age-related diabetes. BMI=body mass index. ANDIS=All New Diabetics in Scania; ORIGIN= Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention. n.a.=niet aanwezig; HOMA2 = homeostatic model assessment 2; HOMA2-B is een maat voor de insulinesecretie (geschat percentage van de gebruikelijke secretie); HOMA2-IR is een maat voor de insulineresistentie.

Let op dat de methoden voor het meten van o.a. GAD antistoffen en C-peptide verschillen tussen de diverse studies, en dus niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn.