

## I N G E Z O N D E N S T U K.

*Geachte Heer Redacteur!*

Zou ik U voor eene opmerking, naar aanleiding van het Verslag van Dr. BALLOT, *Over de werking van de reglementen der prostitutie te Rotterdam*, een plaatsje mogen verzoeken in het eerstvolgend *Tijdschrift*-nummer? Zij betreft Tabel IV, pag. 289. In de tweede kolom van die Tabel wordt opgegeven, hoeveel malen in de jaren 1863 tot en met 1870 vrouwen werden gevonden, lijdende aan plaatselijke ulceratieve aandoeningen van syphilitischen aard, die in den regel door algemeene verschijnselen worden gevolgd (*chancres indurés*). Nu zal het zeker ieder deskundige vreemd en opmerkelijk voorkomen, dat gedurende de jaren 1863 en 1864 dit getal ongeveer drie-maal zoo groot is als in een van de zes volgende jaren, toen het steeds zes of zeven was. De opheldering van dit zonderlinge feit wordt gegeven door de oorspronkelijk door mij geleverde Verslagen omtrent het geneeskundig toezicht op de prostitutie. Men zal, die Verslagen opslaande, zien dat voor de jaren 1863 en 1864 het hoofd voor deze ziekte-rubriek eenigzins anders luidt dan voor de volgende jaren. Voor 1863 stond boven deze kolom: *Ulceratieve aandoeningen van syphilitischen aard, zonder eenig ander duidelijk kenmerk van algemeene syphilis (ulcera indurata, plaques muqueuses, etc.)*; — in 1865: *Ulceratieve aandoeningen, die hetzij tot algemeene syphilis aanleiding kunnen geven (zoo als het ulcus induratum), hetzij op syphilitischen bodem woekerende, echter van geene andere duidelijke kenmerken van algemeene syphilis vergezeld waren (plaques muqueuses, rhagades, etc.)*, voor de latere jaren zoo als het nu door Dr. BALLOT boven kolom 2 van Tabel IV is gesteld. — Hieruit blijkt dat ik, naar eene goede klassificatie zoekende, in die eerste jaren verschillende gevallen, die later in de eerste kolom (*duidelijk gekarakteriseerde verschijnselen van syphilis*) worden opgenomen, in die tweede heb gebracht, en dat ik deze eerst sedert 1865 uitsluitend heb gehouden voor de vermelding van het aantal mij voorgekomen gevallen van *Chancre induré* of van de zoogenaamde *primaire* syphilitische zweer. Ik behoef zeker niet uitvoerig te betoogen, dat de latere klassificatie beter is dan de vroegere, terwijl daardoor tevens eene bijdrage wordt geleverd tot de beantwoording van de veelzijdig besproken vraag over de meerdere of mindere zeldzaamheid van het voorkomen van den geïndureerden chanker bij de vrouw, in vergelijking van de gevallen, waarin die bij den man wordt waargenomen. Ik achtte deze kleine opheldering noodzakelijk, opdat niet uit verwondering over een zoo belangrijk en daarbij geheel ongemotiveerd verschil tusschen de eerste en de latere jaren ook wantrouwen mocht geboren worden omtrent de andere door mij geleverde cijfers.

Dr. H. VAN VOLLENHOVEN.

—❖—

## B E R I G T E N.

### BUITENLAND.

**LONDEN.** — *The Lancet* van 18 Mei l.l. bevat de beschrijving en afbeelding van een prostata catheter, door Dr. TEEVAN aangegeven en door de fabrikanten MAYER en MELTZER vervaardigd. Langs de binnenbogt van het instrument is eene zwakke stalen veer in het weefsel der elastieke sonde als het ware ingebed, waardoor zij