

aan de hand loopen en op deze plaatsen in een gipsverband zijn opgenomen. Ter hoogte van het elleboogsgewricht hebben deze staven kogelgewrichten, zoodat flexie, extensie en pro- en supinatie mogelijk zijn.

Voor olecranon-fracturen wordt het hechtpleisterverband van ALCOOK voor 't beste gehouden. Voor de typische radius-fracturen worden verschillende spalken aanbevolen, daar aan het circulaire gipsverband tal van gebreken kleven. In de eerste plaats de volaire „Pistolenschiene” van SCHEDE: verder die van BOND, LEVIS en CARR, welke alle dit gemeen hebben, dat er eene uitholling bestaat op de plaats tegenover de fracturen, zoodat hier ruimte blijft voor 't onderste fragment. Kleine modificaties zijn nog aangebracht door COOVER en BRAMWELL. BEELY gebruikt een spalk aan de dorsaalzijde bestaande uit gipshennep, terwijl BRAATZ in het *Centralblatt für Chir.* een spiraalspalk van 't zelfde materiaal heeft beschreven.

Bij de behandeling van femur-fracturen zijn eenige verbeteringen opgeteekend door HENNEQUIN beschreven in de *Revue de Chir.* 1887, n^o. 7, enz. HENNEQUIN neemt 3 hulpmiddelen te baat bij zijne behandeling, nl.: het planum inclinatum, de tractie en den lokalen druk van een spalk. Hiervoor heeft men noodig een matras, waaruit een rechthoekig stuk wordt genomen aan de zijde van het gebroken been. Vervolgens wordt het been tot aan de fractuur met een wattenverband ingewikkeld en hierover wordt aan de ondervlakte van de dij een rekverband bevestigd. HENNEQUIN gebruikt een dasvormig gevouwen servet, waarvan de einden elkaar kruisen in de fossa poplitea en even boven het midden van het onderbeen worden samengeknoopt ter bevestiging van koord en gewicht. Eindelijk wordt een spalk, liefst een draadspalk, waaraan een dwarspalkje verbonden is om het omkantelen te beletten, tusschen matras en dij ingeschoven. Ter aansluiting dienen de noodige watten en een paar riemen ter bevestiging. Voor patellair-fracturen worden tal van apparaten aangegeven zonder veel nieuws te brengen. Hetzelfde geldt voor fracturen van het onderbeen.

DE WAL.

— ❦ —

I N G E Z O N D E N.

NOG EEN MIDDEL TEGEN HARDNEKKIG HIKKEN.

In het voorlaatste Weekblad roemt Dr. KÜTHE de werking van een decoct. Jaborandi tegen hardnekkig hikken. Dit middel zal wel niet altijd aan te wenden zijn en zelfs wel eens tegenaangewezen zijn. Daarom meen ik gerechtigd te zijn, de wijze mede te deelen, waardoor ik in meerdere gevallen meestal uitstekend succes verkreeg.

Eén handdoek wordt stevig ineen gerold en in de maagkuil gelegd. Daarop wordt een tweede handdoek, het onderste gedeelte van de borstkas omvattend, zóó krachtig gebonden als maar eenigszins verdragen wordt.

De inplantingspunten van het middelrif worden daardoor tot elkander gebracht en de kramp laat meestal zeer spoedig na. Dr. A. K. W. ARNTZENIUS.

