

Acht weken na het trauma is de facialisparalyse zoo goed als genezen; de abducensparalyse nog in statu quo.

Katwijk, 1 October.

Dr. L. V. HOOG.

WETENSCHAPPELIJKE MEDEDEELINGEN.

Ter behandeling der vaginitis en endometritis gonorrhoeica wordt door Prof. FRITSCH, in n^o, 30 van het *Centralblatt für Gynäkologie*, het volgende aanbevolen: Men lost 50 gram chloorzink op in 50 gram water, en neemt van deze oplossing 20 gram op 1 liter water, waarmede nu in liggende houding, tweemaal daags, ook gedurende de menstruatie, wordt geïrrigeerd. De temperatuur van het water moet 30° R. zijn. Van de ontelbare middelen en methoden heeft hem dit nog de beste diensten bewezen.

Gewoonlijk heeft reeds na 10 uitspoelingen, de fluor geheel opgehouden. Natuurlijk keert hij in die gevallen, waarbij de cervix, het endometrium en de tubae in het proces deelen, weer spoedig terug. Dan wordt de binnenvlakte van den uterus met nog sterkere chloorzink-oplossingen gecauteriseerd en herhaaldelijk een jodoform-staafje ingevoerd.

Zonder te willen meenen, hiermede de gonorrhoe volkomen te hebben genezen, gaf deze methode toch zulke goede resultaten, dat FRITSCH zich verplicht achtte, ze ter kennis der vakgenooten te moeten brengen.

Breukelen.

Dr. A. MIJNLIEFF.

I N G E Z O N D E N.

TINCTURA STROPHANTHI.

In verband met de mededeelingen omtrent *Strophanthus hispidus* van Dr. A. G. RIJKENS, in het vorige nummer van dit *Tijdschrift*, waarin met het oog op het sterk werkend hartgif, dat de zaden dezer plant bevat, de wenschelijkheid eener uniforme bereiding voor de tinctuur wordt uitgesproken, meen ik niet te mogen verzwijgen, dat men beter doet voor het uittrekken der vette olie, *petroleumaether* in plaats van aether te gebruiken.

De eerste maal, dat ik deze tinctuur bereidde, en volgens voorschrift van FRASER aether voor het verwijderen van het vet gebruikte, stelde ik mij de vraag, of met het vet ook verlies van het werkzame bestanddeel te duchten was. En werkelijk bleek bij het onderzoek der groene olie, die tot een bedrag van 29.45 pCt. uitgetrokken was, dat een niet onaanzienlijk bedrag aan strophanthine aldus verloren gaat.

De tweede keer bezigde ik *petroleumaether*, en hoewel ook deze, behalve vette olie, een spoor strophanthine medeneemt, waren de algemeene reactiën

hierop en ook de bittere smaak van het water, dat met de olie werd geschud, bij lange na niet zoo intensief als in het eerste geval.

Op grond hiervan meen ik het gebruik van aether bij de bereiding van tinctura strophanhi te moeten ontraden, en daarvoor petroleumaether te mogen aanbevelen.

VAN LEDDEN HULSEBOSCH.

B E R I C H T E N.

BUITENLAND.

LONDEN. — Volgens het *British Medical Journal* zoude een Fransch militair Chirurg in de Académie den zonderlingen raad voorgesteld hebben, om bij de soldaten het beloop der grootste arteriën op het lijf onder toezicht van een deskundige af te teekenen. Bij gebrek aan hulp zoude daardoor iedereen de plaats kennen, waar gedrukt moet worden om verbloeding te voorkomen.

PARIS. — In de Académie de Médecine werd onlangs een vrij hevig debat over de „pélade” (tinea capitis decalvans) gevoerd. Het was vooral OLLIVIER, die op eene herziening aandrang van het reglement van 1875, dat de daaraan lijdende kinderen niet op de school gedooft. Hij beschouwde het lijden als geheel onbesmettelijk en achtte het daarom onbillijk daardoor de opvoeding van zoo menig kind te storen. Door HARDY en anderen werd volgehouden dat de pelade wel degelijk contagieus was; ten slotte werd aan OLLIVIER opgedragen voorwaarden te formuleeren waarop een aan genoemde ziekte lijdend kind al of niet op de school toegelaten mag worden.

BERLIJN. — In het jongste nummer van LEYDEN's *Zeitschrift für klinische Medizin* wordt van de genezing eener pernicieuse anaemie door het afdrijven van een bothriocephalus latus, gewaagd. Bekend is het, dat reeds in 1886 Prof. RENEBERG uit Helsingfors op de Naturforscher-Versammlung te Berlijn op het voorkomen der BIERMER'sche pernicieuse anaemie gelijktijdig met de aanwezigheid van den Bothriocephalus latus werd gewezen en dat hij in 19 gevallen van dit lijden, sinds 1883 op de Helsingforscher kliniek voorgekomen, bij 12 de genoemde parasiet aantrof. Ondanks dat BIERMER, QUINCKE en IMMERMANN op die vergadering de waarde van RENEBERG's mededeeling trachtten te ontkennen, deelt Dr. SAPIRO te St. Petersburg in bovengenoemd tijdschrift een in het Helena Pawlona-gasthuis aldaar waargenomen geval mede van een 13jarigen jongeling, waarbij al de bekende symptomen der pernicieuse anaemie aanwezig waren, maar de patiënt in betrekkelijk korten tijd na het afdrijven van het besproken entozoon genas.

— In de zitting van het „Verein für innere Medizin” deelde Prof. LEYDEN een schrijven mede van Dr. DOMINGOS FREIRE, den bekenden ontdekker der gele koorts-microbe te Rio Janeiro, waarin ook deze zijne prioriteit in de zaak der SCHEURLEN'sche kankerbacilli wil handhaven. Reeds in den aanvang van 1887 gaf hij in een te Rio verschijnend geneeskundig blad zijne „Premières études expérimentales sur le caractère du cancer”, terwijl hij beweert tot hetzelfde resultaat als SCHEURLEN te zijn gekomen.

— Volgens de mededeeling van Dr. TELSCHOW, uit San Remo teruggekeerd, was op 22 December de toestand van den Duitschen Kroonprins buitengewoon gunstig en was hem door den Prins verzocht dit bericht zoo spoedig mogelijk algemeen bekend te maken.