

deze rangschikking naar de functie in het algemeen overeen met de afzonderlijk gelegen periphere zenuw; elke zenuw innerveert hier spieren, die ongeveer gelijke functie hebben; van daar dat men hier een vrij scherpe scheiding der kernen van de verschillende zenuwen vindt. In het ruggemerg is dit niet het geval, de kernen der verschillende groote periphere zenuwen vermengen zich onder elkaar.

G. JELGERSMA.

I N G E Z O N D E N.

Geachte Redacteur!

Naar aanleiding van de mededeeling van den Heer O. A. PETERS, in het vorig nummer van dit *Tijdschrift* verschenen, een korte opmerking om aan te toonen, dat de schrijver voorzeker ten onrechte vèr-strekkende gevolgtrekkingen aan zijn mededeeling toevoegt.

Eerst van lieverlede werd de continuïteit der kaak, te midden van ziek, waarschijnlijk wel week been, opgeheven, en eerst daarna tot exstirpatie van het bovenste stuk besloten.

Een dergelijke, zeer bijzondere gang van zaken bewijst natuurlijk weinig voor de uitvoerbaarheid der operatie, of haar wenschelijkheid in meer algemeen zin.

Bovendien wordt door den schrijver het nadeel, dat reeds eenige dagen te voren de slijmvlies-incisie gemaakt werd, niet bijzonder gememoreerd. Het opereeren in een wond der mondholte, die bezig is zich te reinigen, zal voor den patiënt onaangenaam zijn en indien bij deze operatie diepgelegen los bindweefsel geopend wordt, nicttegenstaande jodoform-tamponnade, voorzeker lang niet onverschillig zijn. Ware het geval door pyaemie opgevolgd, dan zou zonder twijfel de operateur zich van dezen loop der operatie de schuld hebben moeten geven.

Ter stelselmatige verwijdering van een beenstuk, zooals de schrijver afbeeldt, ware de operatie-methode boven langs den nervus facialis en boven de parotis, volgens welke ook de resectie van het kaakgewricht bij ankylosis geschiedt, misschien het meest te verkiezen.

Met deze opmerkingen wordt natuurlijk niet afgekeurd, wat in casu achtereenvolgens pro re nata gedaan werd. Onze bewering was slechts, dat ook in dezen één zwaluw nog geen zomer maakt.

KG.

B E R I C H T E N.

B U I T E N L A N D.

NEW-YORK. — Dr. FORSTER alhier heeft opgemerkt, dat de invoering van glycerine-suppositoria in het rectum, bij barenden den partus bespoedigt.

— Wederom is in Amerika een nieuwe fabriek van diploma's in de geneeskunde ontdekt. Ditmaal betreft het een Trinity University of medicine and surgery te Benning-