

BÜTSCHLI wijst op de overeenkomst met spermatozoën, insgelijks bijna naakte kernen, waar het plasma zich bepaalt tot den staart en een dun omhulsel van den kop; hij uit zelfs het raadselachtige vermoeden „dass diese Aehnlichkeit „mehr als blosser Analogie ist“.

De korreltjes, die door ERNST voor kernen waren gehouden en die BÜTSCHLI bij veel plantaardige en dierlijke cellen terugvond, zijn volgens den laatsten chromatine korrels.

Ik mag niet nalaten op een argument te wijzen door BÜTSCHLI zelve zijnen tegenstanders in de hand gegeven, n. l. waar hij de verdeling van Chromatium Okenü beschrijft. Hier ontstaat n. l. het eerst een insnoering in de bastlaag en eerst daarna deelt zich de centrale massa in tweeën. Zou men hier niet het omgekeerde hebben mogen verwachten?

Uit het aangevoerde zal blijken, dat BÜTSCHLI recht heeft, wanneer hij zijn proeven nog slechts als voorloopige beschouwt, want kleuring met kernkleurstoffen, onoplosbaarheid in kunstmatig maagsap en in alkaliën kunnen wel tot een waarschijnlijkheids-diagnose leiden, maar niet als positieve bewijsmiddelen gelden. Als afdoend bewijsmiddel zou m. i. slechts de waarneming eener karyokinese bij bacteriën kunnen gelden.

FOKKER.

I N G E Z O N D E N.

Geachte Redacteur!

Voor weinige dagen ontving ik een particulier schrijven van Prof. PHELPS uit New-York, waarin deze mij bericht, dat hij op het Internationaal Congres te Berlijn mededeelingen wil doen omtrent een groote reeks gevallen van horrelvoet, door hem geopereerd met opene insnijdingen.

Tevens verzoekt hij mij, hem een zoo volledig mogelijke opgave te verschaffen van de gevallen, die in Nederland volgens zijn methode geopereerd zijn.

Om aan dien wensch te kunnen voldoen, verzoek ik de Heeren Collega's, die dergelijke operaties verricht hebben beleefdelyk mij zoo spoedig mogelijk een kort verslag van hun gevallen toe te zenden.

Wenschelyk is het dat daarbij worde opgegeven:

Aantal, leeftijd, vorm van gebrek (pes varus, pes varo-equinus, enz.). Aard van operatie (tenotomie van de Achilles-pees, al of niet klieven van het lig. deltoïdes door een half cirkelvormige snede om den binnen-enkel, al of niet toevoegen van osteotomie, of exstirpatie van tarsaal-beenderen, enz.). Aard en duur van nabehandeling (gips of andere verbanden, manuëele of instrumentale correctie van den stand). Resultaat.

Met de spoedige toezending van deze opgaven zullen de Heeren Collega's mij groot genoeg doen.

Abcoude, 17 April 1890.

Dr. H. P. KAPTEYN.

