

Heeren Prof. BOUCHARD, ROB. KOCH, ZIEGLER (Freiburg) en WELCH (Baltimore) (*Deutsch. Med. Wochenschr.*, S. 535).

**PARIJS. — Levenloos geboren.** Het is bekend, dat naarmate de vrouwen ouder zijn, de kans, dat zij levenlooze kinderen baren, toeneemt, BERTILLON, hoofd der statistische werkzaamheden te Parijs, wiens belangstelling in de voortbrengingskracht zijner natie reeds bekend is uit de oprichting van den antimalthusiaanschen bond, heeft nagegaan, op welk tijdstip der zwangerschap de leeftijd der moeders zijn invloed deed gelden. Hij heeft gevonden, dat dit in de 4 eerste en de 9de maand het geval is. In de andere maanden sterven er niet meer vruchten af bij oudere vrouwen dan bij jongere, tenzij de leeftijd 40 jaren te boven gaat. Steeds worden er meer jongens dan meisjes, meer onechte dan onnatuurlijke kinderen dood of te vroeg geboren. Vroeg-geboorten (van al of niet levende kinderen) hebben het meest plaats bij vrouwen, jonger dan 19 jaar (7.1 pCt.); daarna daalt dit cijfer tot het 34ste jaar tot 4.1 pCt. om dan weer te stijgen. Het vroeggeboren kind eener jonge moeder heeft echter meer kans om te blijven leven (*Sem. Méd.*, n<sup>o</sup>. 38).

**BERLIJN. — Röntgen-stralen.** EULENBURG deelt in de *Deutsche med. Wochenschr.* n<sup>o</sup>. 33 twee gevallen mede met bijvoeging van skiagraphiën, waarin door middel der X-stralen, dank zij den ongewachten vooruitgang der techniek, een kogel in de schedelholte ontdekt is. Het tweede geval is het merkwaardigst; het betreft een man van 33 jaar, die zich 10 jaar geleden een revolverkogel in de rechter slaapstreek schoot. Eerst traden verschijnselen van hersenruk op. Vier jaren had hij rust; toen kreeg hij hoofdpijnen, en bevingen, waardoor hij op het denkbeeld kwam, dat de kogel nog niet weg was. Behalve knippen met de oogen was er geen enkele stoornis (ook in het gezichtsveld) die op een vreemd lichaam had kunnen wijzen. Wel was pat. uiterst prikkelbaar, zoodat hij in een krankzinnigen-gesticht moest worden opgenomen. Vijf jaar later werd hij ontslagen, na een verklaring geteekend te hebben, dat hij niet meer aan de kogel geloofde. Hoofdpijnen komen soms nog voor, maar een nauwkeurig onderzoek van het zenuwstelsel bleef zonder positief gevolg. *Het onderzoek met X-stralen toonde echter aan, dat de kogel in de middelste schedelgroeve vlak achter de rechter fissura orbit. superior ligt.* Men komt tot de plaatsbepaling door het hoofd achtereenvolgens van verschillende kanten te skiagrapheren.

— **Furor operandi.** In n<sup>o</sup>. 22 van de *Münch. med. Wochenschrift* komt KOSSMANN op tegen de bekende rede van Sir WILLIAM PRIESTLEY over het te veel opereeren der gynaecologen. Hij meent, dat het opereeren op onvoldoende aanwijzing en het gebruik maken van methoden, die nog niet voldoende op de ervaring steunen, bij den chirurg meer voorkomt, dan bij den vrouwenarts. De grieven, die PRIESTLEY tegen deze in het algemeen heeft, berusten (volgens KOSSMANN) slechts op geheel op zichzelf staande gevallen.

De Edinburgsche kiezers hebben PRIESTLEY intusschen naar het Parlement afgevaardigd, waar zijn opvattingen aangaande „over-operating” wellicht dienst kunnen doen.

**BERN. — Beck's' serumspuit en het Bernsche heilserum.** Sedert anderhalfjaar wordt te Bern, onder leiding van Prof. TAVEL diphtherie-