

BERICHTEN.

BUITENLAND.

LONDEN. — Invaliden. De oorlog heeft de bevolking van Londen met 18000 invaliden verrijkt, waarvan velen er ellendig aan toe zijn. Wie het geluk hebben, in de longen of de ruggewervels geschoten te zijn, krijgen 2 sh. 6 p. per dag pensioen, maar de overige verminkten nauwelijks sixpence. Tweeduizend dier gewezen krijgers zouden thans aan epilepsie lijden als gevolg van het ontzettend geraas bij het ontploffen den nieuwste kruitsoorten (*Progrés medical*).

PARIJS. — Hulde aan Liébeault. Den 16den September werd de op dien dag 79-jarige LIÉBEAULT bij een bezoek aan zijn geboorteplaats Favierès verrast door het aanbrengen van een gedenkplaat aan het huis waarin hij geboren werd. Hierop staat zijn geboortedag vermeld en wordt hulde gebracht aan zijn ontdekking van de stelselmatige geneeskundige toepassing van de suggestie en het hypnotisme. In naam zijner talrijke vrienden en leerlingen werd dit gedenkteken geplaatst door VOISIN, BÉRILLON, MAGNIN en FAREZ van Parijs en verschillende buitenlanders, waaronder onze stadgenoot VAN RENTERGHEM (*Journ. de Neurologie*).

— **Een geschenk.** Prof. LANNELONGUE heeft aan de *Académie de Médecine* 38000 frcs. geschonken om uit de renten daarvan om de drie jaren een LANNELONGUE-prijs voor het beste werk over chirurgie uit te keeren (*Deutsche med. Wochenschr.*).

BERLIJN. — Zoogende moeders. Volgens een opgave van NEUMANN in de *Deutsche med. Wochenschr.* van 30 October gaat het zoogen door de moeders te Berlijn sterk achteruit.

De vier laatste volkstellingen geven de volgende cijfers per 100 zuigelingen :

JAAR.	Moeder- melk.	Min.	Moeder- en dierenmelk	Dieren- melk.	Onbekend.
1885	55.2	2.7	4.	33.9	1.4
1890	50.7	2.2	1.6	42.3	—
1895	43.1	1.4	1.7	45.3	0.2
1900	31.4	0.7	3.2	54.8	3.8

— **Sterftecijfers in Pruisen.** Het *Kaiserl. Gesundheitsamt* maakt de cijfers betreffende de sterfte in Pruisen gedurende 1900 openbaar. Voor de mannelijke bevolking bedroeg den sterfte 2.38 pCt., voor de vrouwelijke 2.09 pCt. Het gemiddelde cijfer, 2.23 pCt., was hooger dan in de jaren 1894 tot 1899, lager dan in de 19 voorafgaande jaren. De toename trof de leeftijden beneden 1 jaar en boven de 50 jaren; op den kinderleeftijd (1—10 jaren) was de sterfte minder, dank zij een geringer sterfte aan mazelen, roodvonk, diphtherie, kinkhoest en dysenterie. Onder de doodsoorzaken komt