

Verband tusschen aangeboren heup- en knie-ontwrichting. — Ofschoon men zelden gelegenheid heeft bij een kind met aangeboren heupontwrichting tegelijkertijd een knie-ontwrichting waar te nemen (KRÖNLEIN, *Deutsche Chirurgie* 1892 vond deze combinatie bij 90 kinderen slechts 1-maal), is het toch aan TRIDON (*Revue d'Orthopédie* 1905 p. 497) gelukt uit de literatuur 20 zoodanige gevallen te verzamelen, waaronder een eigen waarneming. Waarom een ontwrichte knie zoo zelden gezien wordt bij de kinderen, lijdende aan heupontwrichting, terwijl toch bij 121 aangeboren knie-ontwrichtingen de combinatie bij 20 werd gevonden, is waarschijnlijk tendeele te verklaren uit het zeldzame voorkomen er van en tendeele daaruit, dat op den leeftijd, waarop de heupontwrichtingen ontdekt worden, de symptomen der knie-afwijking verdwenen zijn.

Wat betreft de oorzaak der knie-ontwrichting tast men in het duister evenals bij de meeste heupontwrichtingen. Wel worden bij beide afwijkingen punten van overeenkomst gevonden. De kinderen zijn in den regel goed ontwikkeld, zonder dat andere defecten erbij voorkomen. Vijfmaal kwamen andere afwijkingen wel voor, maar stierven de kinderen vóór of bij de geboorte. Als bij de heupontwrichtingen komt de knie-afwijking vooral bij meisjes voor, terwijl de dubbelzijdige gevallen evenveel jongens als meisjes betrof, derhalve percentsgewijze meer jongens. Bij de eenzijdige luxaties komen de meeste links voor; ofschoon het niet gelukt is de knie-afwijking te verklaren uit trauma, stoornis in de ontwikkeling, ziekten van het kniegewricht, contracturen en paralyzen, is het toch opgevallen, dat binnen den uterus bij minstens 7 der gevallen de beenen in de knie overstrekt moeten zijn geweest bij maximale buiging in het heupgewricht. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ook bij de overige gevallen deze stand is voorgekomen, hetgeen niet of moeielijk is waar te nemen. Dat bij deze houding der beenen een ontwrichting naar voren tot stand kan komen is begrijpelijk. Inderdaad heeft DREHMANN (*Ztschr. f. Orthop. Chir.* Bd. 7) onder 115 gevallen van aangeboren knie-ontwrichting er 96 gevonden, waar de tibia naar voren verplaatst was.

Bij gepaste en vroegtijdige behandeling (repositie en fixatie) schijnt de prognose gunstig te zijn, en het kniegewricht zich volkomen normaal te ontwikkelen.

H. A. LAAN.

Het misbruik van medicamenteuse purgeermiddelen bij habitueele obstipatie. — In het „Festnummer” van de *Berl. klin. Wochenschrift* op 30 Oct. jl., uitgegeven ter eere van den 60sten verjaardag van EWALD, gaat CHR. JÜRGENSEN uit Kopenhagen te keer tegen het misbruik, dat zoowel door artsen als door leeken gemaakt wordt van purgantia bij habitueele obstipatie. Hij wijst vooral op eenige dwaalbegrippen, die algemeen burgerrecht verkregen hebben zoo bijv., dat ieder mensch iederen dag ontlasting behoort te hebben;