

Van 13 tot 16 October zal het tweede congres van dien aard worden gehouden, onder voorzitterschap van BACELLI. Het omvat drie secties: electrotherapie, kinesitherapie en hydrologie. Voor het lidmaatschap (20 Lire) melde men zich aan bij prof. COLOMBO, via Plinio, Rome (*Munch. med. Wochenschr.*).

GENUA. — Maragliano-prijs. Ter gelegenheid van het 25-jarig professoraat van MARAGLIANO is een prijs ingesteld, die naar den hoogleeraar is genoemd, en jaarlijks zal worden toegekend aan het beste werk over tuberculose (*Allg. med. Centralz.*).

Personalia. — Prof. NEISSER te Breslau (thans te Batavia vertoevend) is tot gewoon hoogleeraar benoemd. Dit is het eerste ordinariaat in de dermatologie in Duitschland. Prof. H. MUNK heeft het directeurschap van het physiologisch laboratorium der Thierärztliche Hochschule nedergelegd.

PINKHOF.

BINNENLAND

Rijksinrichting tot kweeking van koepokstof te Utrecht. —

Er zijn in het jaar 1906 gebezigd 29 kalveren, die na het slachten volkomen gezond bleken. Het kleinste aantal entsteekjes per kalf bedroeg 800, het grootste 1342. Bij twee kalveren mislukte de inenting geheel, maar de vaccine die bij het eerste kalf, met 850 steekjes, niets voortbracht, leverde een week later, bij een tweede, met 670 steekjes slechts 25 pCt., en twee weken daarna, bij een derde kalf, met 920 steekjes, 100 pCt. pokken. De vaccine van drieërlei oorsprong, die bij het tweede kalf zonder uitwerking bleef, leverde een week later bij een ander kalf, met 675 steekjes, 94 pCt. pokken, terwijl 3 weken oude vaccine, bij dit zelfde kalf, met 170 steekjes, 94 pCt. pokken voortbrachten. De vatbaarheid om entpokken voort te brengen bij normale kalveren blijkt dus zeer sterk af te wisselen, zooals dit ook in vorige verslagen herhaaldelijk is medegedeeld.

De inentingen geschiedden steeds door dr. WIRTZ zelf en met de vaccino-style MARESCHAL. Bij de overige 27 kalveren bedroeg het aantal goed ontwikkelde pokken 738 of 66.1 pCt. per kalf. Bij 5 kalveren was de opkomst slechts 20 pCt., bij 22 kalveren gemiddeld 75 pCt. pokken. Gemiddeld leverde entstof van 1—2 weken oud 61.9 pCt., die van 2—4 weken 66.8 pCt., die van 4—8 weken 67.1 pCt., die van 8—16 weken 75.4 pCt. pokken.

De uitslag der kalverinentingen, ofschoon ook dit jaar minder gunstig dan in den regel, was toch in het algemeen bevredigend. Zij was in 1906 met 66.1 pCt. het slechtst van de 9 laatste jaren, waarvan 1905 het laagste cijfer 66.4 en 1898 het hoogste cijfer 88.9 pCt. bedroeg. De geheele oogst aan pokweefsel van 27 kalveren bedroeg in 1906 135.5 gram, d. i. gemiddeld 5 gram per kalf, zijnde hetzelfde cijfer van de beide voorgaande jaren, doch met deze twee het laagste cijfer van de 7 daaraan voorafgaande jaren. Uit dien oogst werden gereed gemaakt 8750 enkele buisjes glycerine-vaccine, d. i. evenveel als in 1905, maar bijv. slechts de helft van het aantal, dat in 1894 werd gereed gemaakt. Daarvan zijn verzonden 5839 enkele buisjes in 1542 zendingen. Aangaande deze 1542 zendingen werden slechts 381 of 25 pCt. berichten ontvangen. Daaruit blijkt dat van twee zendingen geen opkomst vermeld werd, doch 336, of 88.2 pCt., van 100—50 pCt. opkomst hebben geleverd, en 43, of 11.3 pCt., van 40 tot minder dan 40 hebben voortgebracht. Van die 336