

racht te vermijden. Daar nu de niet-geneeskundige „Naturheiler“ dit niet kan, oefent hij kwakzalverij uit, evenals ieder, die zonder vakopleiding zieken behandelt. En tegen die kwakzalverij heeft de tentoonstelling terecht gewaarschuwd.

— **Sublimaatpastilles.** Een ministerieele beschikking heeft bepaald, dat beperkende maatregelen voor den verkoop van sublimaatpastilles niet noodig zijn, „omdat zij slechts zelden tot vergiftiging worden gebruikt, en dan meestal slechts bij personen, die zich in hun beroep de pastilles kunnen aanschaffen, zooals artsen en verplegers“ (*Deutsche med. Wochenschr.*).

— **Cholera-dienst.** De vijf rivierposten tot afwering van de cholera aan de Weichsel en de Memel zullen waarschijnlijk eerstdaags worden ingetrokken, omdat men dan vermoedelijk geen gevaar meer loopt, dat de cholera langs de waterwegen Pruisen zal binnendringen. Voorzichtigheidshalve zal men in het volgende voorjaar, als de vlotvoerderij weder begint, de posten opnieuw in werking stellen (*Deutsche med. Wochenschr.*).

**PARIJS. — Geschiedenis der geneeskunst in cijfers.** Zeer leerrijk zijn de cijfers, die GRIMBERT den 1sten October in de Académie de Médecine heeft medegedeeld, betreffende het verbruik van geneesmiddelen in 219 groote en kleine ziekenhuizen te Parijs. Van sommige middelen, „der ruhige Pol in der Erscheinungen Flucht“, wordt jaar in, jaar uit, evenveel gebruikt: 200 K.G. opium, 50 K.G. laudanum, 400 K.G. extr. chinae, 2000 K.G. emplastr. diachylon, 3000 K.G. tinct. jodii, 55000 K.G. glycerine, 1200 K.G. broomkalium, 500 K.G. subnitr. bismuth., 400 K.G. salicyl. natr., 60 K.G. nitras argenti, 30 K.G. calomel, 12 K.G. sulfid. stibic., 10—12000 bloedzuigers en 66000 fleschjes van 30 gram chloroform. In tien jaren tijds *verminderde* de vraag naar: joodkalium (tot eer der Parijzenaars!) van 1200 tot 700 K.G., joodnatrium van 100 tot 60 K.G., kininezouten van 75—50 K.G., antipyrine van 397—250 K.G., glycerophosph. calcis van 170—90 K.G. en kakodylas natr. van 14—6 K.G. Sterk verminderde de vraag naar vergiftige antiseptica en inwendige antiseptica: sublimaat (2000—693 K.G.), carbolzuur (12000—5000 K.G.), jodoform (600—200 K.G.), -naphtol (104—14 K.G.), salol (311—88 K.G.). Het rumgebruik viel van 68000 L. in 1900 op 27400 L. in 1906, aan canthariden werd voor 20 jaren 200 K.G. en thans 16 K.G. verbruikt, aan coffeïne 39 tegen 15 K.G. Daarentegen is het gebruik van aq. oxygenata gestegen van 1000 tot 102000 L., dat van formal van 300—2000 K.G. Zeer gezocht zijn geworden: theobromine, salicyl. methylic. en verder pyramidon, aspirine, urotropine, protargol, salopheen, veronal en dermatol.

**LONDEN. Boorzuur als ontbijt.** *The Lancet* klaagt er over, dat aan vele landgenooten het eerste ontbijt niet prettig bekomt, ook al zijn zij bijtijds, zonder te veel eten of drinken, naar bed gegaan, en al verdragen zij de overige maaltijden goed. En men tracht dit te verklaren doordat de spijsen, waaruit zulk een ontbijt bestaat, ham, kaas, bokking, worst of zelfs versche visch dikwijls in frisschen staat worden gehouden door toevoeging van boorzuur of borax. Bij de overige maaltijden wordt meestal versch vleesch gebruikt. Boorzuur nu is voor de spijsvertering niet dienstig en staat reeds in de reeks der verdachten van medeplichtigheid aan de appendicis. Op het vaste land, merkt *the Lancet* op, ontbijt men met brood en boter en een kop koffie. Het is waar, dat deze spijsen geen boorzuur bevatten, maar zou de