

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1922, No. 6.

S. PELLER. *Die Ergebnisse der von der Oesterr. Gesellschaft für Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit veranstalteten Sammelforschung.* — Van de ongeveer 6000 artsen hebben slechts 389 de vragenlijst ingevuld, zoodat wel een uitgebreide casuïstiek maar geen statistische gegevens verkregen zijn. Het tekort aan antwoorden wordt eenigszins opgeheven, doordat het geheele materiaal van de klinieken EISELSBERG en THALER statistisch bewerkt is. De vragen, die nu behandeld worden, betreffen den invloed van woning, leefwijze, erfelijkheid, besmetting (gehuwden), beroep, leeftijd en de ontwikkeling uit andere gezwellen. Wordt vervolgd.

ST. WEISS und E. STERN. *Ueber Haemolysinbildung nach Milzexstirpation.* — Uit de onderzoeken volgt, dat konijnen, wien de milt is weggenomen, langzamer en minder volledig haemolysine vormen dan de controledieren. In één reeks onderzoeken werd een afwijkende uitkomst verkregen.

PAUL SAXL und O. SCHERF. *Ueber Ausscheidung von Farbstoffen durch den Magensaft und durch die Galle.* — Het is reeds bekend, dat door de gal kleurstoffen, die parenteraal opgenomen zijn, worden afgescheiden. ROSENTHAL en anderen willen door opvangen van de gal met den duodenaalcatheter hiermede de snelheid van de leverfunctie bepalen; dit is onjuist, want ook het maagsap scheidt o. a. methyleenblauw af en geeft dus aanleiding tot onjuiste gevolgtrekkingen. Zieken met maag- en duodenumzweer vertoonen een versnelde uitscheiding van methyleenblauw.

HANS HOFFMANN. *Ueber Lungenabszess nach subkutaner Thoraxverletzung.* — Door een tramongeval kreeg iemand een kwetsing van de rugspieren, een breuk van de derde rib en een kneuzing van de long (geen bloed ophoesten). Na ongeveer vijf weken vormde zich een absces in de rugspieren, dat langs de vergroeide pleura-bladen communiceerde met een absces in de long. Na opensnijden en drainage genezing.

JOSEF POK. *Die Körperseitentemperatur, ein differentialdiagnostisches Hilfsmittel.* — Uit een reeks gevallen wil POK aantoonen, dat bij éézijdige afwijkingen (meest gynaecologische) de temperatuur van de zieke lichaamshelft, in den oksel gemeten, enkele tiende-graden hooger is, dan die van de gezonde zijde. Het verschil zou zóó regelmatig aantoonbaar zijn, dat het voor de diagnose gebruikt kan worden.

E. LEKISCH. *Eine Modifikation der NEISSER'schen Spritze.* — Om bij gonorrhoe de urethra „stroomend” door te spoelen, maakt LEKISCH een urethraspuit, die in de uitvloeioening een tweede kanaal bevat, dat onafhankelijk van de cilinder-ruimte voert naar een zijdelingsche uitvloeioening.

ALEXANDER FRAENKEL. *Zur Lehre von der Krebskrankheit. Schluss.*

I. FISCHER. *Feuilleton. Natur und Kunst in der Geburtshilfe.*

J. ED. ST.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1922, No. 5.

H. HERXHEIMER. *Zur Wirkung des Alkohols auf die sportliche Leistung.* — Ook kleine giften alcohol, gebruikt vóór het uitoefenen van sport, blijken een ongunstigen invloed op den uitslag uit te oefenen. Onderzoek bij hardloopen en snelzwemmen op 100 Meter afstand.

F. HAMBURGER. *Ueber die willkürliche Betätigung der glatten Muskeln.* — Het staat vast, dat wij verschillende gladde spieren willekeurig kunnen doen samentrekken, bijv. de blaasspier en vermoedelijk nog vele andere. Het verschil met de dwarsgestreepte spieren is, dat wij het effect der samentrekkingen gewoonlijk niet met onze zintuigen kunnen waarnemen.

M. KLIMMER und H. HAUPT. *Ist das Korynebakterium Abortus infectiosi BANG für Menschen pathogen?* — Schrijvers vonden dit staafje, dat bij runderen en eenige andere huidieren een veel voorkomende oorzaak van abortus is, in 32 pCt. van 22 onderzochte melkmonsters van de markt in Dresden. Amerikaanse onderzoekers hebben bij met koemelk gevoede kinderen antilichamen tegen deze bacterie gevonden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat zij ook bij den mensch in de baarmoeder kan woekeren en tot abortus leiden.

F. SCHULTZE. *Ueber die Ursache des juckenden Winterausschlags. (Eczema hiemale pruriens)*. — SCHULTZE zoekt de oorzaak dezer aandoening, aan welke hij zelf lijdt, in de droogte der lucht in onze kunstmatig verwarmde vertrekken. Door vochtige lucht, natte omslagen, wateraantrekkende lanoline enz. verbetert zij spoedig.

W. TH. SACK. *Ueber die psychogene Komponente des Pruritus und der pruriginösen Dermatosen*. — Deze psychogene component is bij vele lijdens aan jeuk duidelijk aanwezig. SACK zag bij dezen van hypnosebehandeling goede uitkomsten.

F. W. OELZE. *Weitere Erfahrungen über die Cyarsal-Mischspritze*. — Het voordeel van het kwikpraeparaat cyarsol is, dat het met salvarsaan een doorschijnend mengsel geeft. OELZE spuit 2 maal in de week een mengsel van 0.6 gram neosalvarsaan en 1—1.5 cm³ cyarsol in, totdat ongeveer 6 gram neosalvarsaan toegediend zijn. Geen bijverschijnselen. Voorloopig gunstige uitkomsten.

VON PEZOLD. *Ein Jahr LINSER-Verfahren*. — Aanbeveling der methode (intraveneuse inspuiting van een mengsel van neosalvarsaan en sublimaat) naar aanleiding van 3700 inspuitingen. Zij is goedkoop, pijnloos, eenvoudig, vertoont geen bijwerkingen van belang en doet de syphilitische verschijnselen sneller verdwijnen dan een kuur met salvarsaan alleen. Voor een duurzamer werking moet men trachten de hoeveelheid kwik te verhoogen.

P. VON SZILY und T. HALLER. *Einzeitige Behandlung der Syphilis mittels Soluesin und Neosalvarsan*. — De inspuiting van een mengsel van soluesine en neosalvarsaan biedt eenige voordeelen boven de methode van LINSER, waarvan het voornaamste is, dat soluesine behalve kwik ook joodnatrium bevat. Voorloopig gunstige uitkomsten bij 25 patiënten.

E. SCHLESINGER. *Die Wachstumshemmung der Kinder in den Nachkriegsjahren*. — Het achterblijven in gewicht en lengtegroei is na een laagsten stand in 1919 en 1920 tot staan gekomen en begint zelfs, wat den lengtegroei betreft, bij eenige groepen in te halen.

K. BAERTHLEIN. *Ueber ausgedehnte Wurstvergiftungen, bedingt durch Bacillus proteus vulgaris*. — De lijdens vertoonden gastrointestinale verschijnselen van over het geheel niet zeer ernstigen aard.

FÜRST. *Kropfhäufigkeit bei Münchener Fortbildungsschülern*. — Opmerkingen bij het artikel van KRAEUTER.

L. FUCHS. *Syringomyelie und peripheres Trauma*. — De ziekte volgde in het beschreven geval in aansluiting aan een vingerverwonding, die een zware etterige tendovaginitis veroorzaakte.

VORMANN. *Ueber einen an mir selbst beobachteten serologisch festgestellten Fall von Influenza-Myositis*. — Myositis der kuitspier. Influenza-widal positief.

A. H. HOFMANN. *Ueber einen Todesfall im Chloräthylrausch*. — Dood door syncope na een minuut bedwelming. Gezonde jonge man, geen status thymolymphticus.

O. RISSE. *Ueber Silikatpessare*. — Het beste materiaal voor pessaria is hard glas. Massief zijn deze te zwaar, daarom heeft OPITZ holle glazen pessaria doen vervaardigen, die onder den naam „Silikatpessare” in den handel zijn en door RISSE worden aanbevolen.

F. HONIGMANN. *Die Behandlung der von den Händen ausgehenden Wundinfektionen der Aerzte*. — Opmerkingen bij het artikel van BIER.

FRIEDLÄNDER. *Schmerzlose Entbindung*. — Opmerkingen bij het artikel van FLOEL.

E. THOMAS. *Röntgenologischer Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose in den Lungen*. — Opmerkingen bij het artikel van KAESTLE.

BRUBACHER. *Einiges über Zahnpflege*. — Opmerkingen bij het artikel van KÜHN.

A. KRECKE. *Die Frühdiagnose der allgemeinen eitrigen Peritonitis*.

La Presse médicale. 1922, No. 5.

J. A. SICARD et J. FORESTIER. *Rachialgie lombaire chronique (lumbago chronique rhumatismal): laminectomie*. — Uitvoerige beschrijving dezer aandoening en haar behandeling (laminectomie) naar aanleiding van vier gevallen.

H. COSTANTINI. *Luxation sous-acromiale bilatérale par action musculaire (épilepsie)*. — Een geval.

H. LEBON. *La radiothérapie pénétrante et profonde.* — Beschrijving van toestellen, dosering, werking op de weefsels, gevaren en aanwijzingen.

La Presse médicale. 1922, No. 6.

J. LHERMITTE et PH. PAGNIEZ. *Syndrome de section complète de la moelle dorsale datant de 10 ans consécutive à un traumatisme rachidien remontant à l'âge de 3 ans croissance: persistante des membres inférieurs.* — Uitvoering toegelichte ziekte geschiedenis.

L. IMBERT. *Sur l'extirpation du cancer prostatorectal.* — Operatietechniek met een reeks afbeeldingen.

DUHOT. *Médication antichoc par le sérum glycosé concentré.* — Ter voorkoming van angiotoxische verschijnselen na arsenobenzolinspuiting spuit DUHOT arsenobenzol opgelost in een 50 pCt. glyucoseoplossing intraveneus in.

L. CHEINISSE. *La sérothérapie de la pneumonie.* — Literatuuroverzicht.

La Presse médicale. 1922, No. 7.

E. RIST et A. STROHL. *Sur le rôle de la diffusion dans la résorption gazeuse et le maintien de la pression sous-atmosphérique dans la plèvre.*

G. MIGINIAC. *Plaies du coeur: voie d'accès transsternale médiane.* — Met afbeeldingen van de operatietechniek en beschrijving van een geval.

La Presse médicale. 1922, No. 8.

L. GALLAVARDIN. *Syndromes angineux dans les cardiopathies valvulaires endocardiques, aortiques ou mitrales.* — Tien gevallen van echte angina pectoris bij lijders aan endocarditische klepvliesandoeningen. Noch de theorie der sclerose van de kransarteriën van het hart, noch die van de uitzetting van eenige holte van het hart voldoen voor deze gevallen.

A. SÉZARY. *Le diagnostic des asthénies d'origine endocrinienne.* — SÉRAZY onderscheidt scherp de myasthenie d.i. de spoedige uitputting van de spier, en de gewone asthenie, waarbij de spier reeds dadelijk minder arbeid kan verrichten, doch niet spoedig vermoeit. De eerste vorm ontbreekt nooit bij insufficiëntie van de bijniere en wordt behalve bij deze waargenomen bij de myasthenie van ERB-GOLDFLAM en de ziekte van BRACHET en TASTIVIN, de tweede vorm is nooit toe te schrijven aan insufficiëntie der bijniere.

M. BLOCH et P. HEBERT. *Rareté extrême des bactériémies secondaires dans la fièvre typhoïde.* — Naar aanleiding van het artikel van RODET en BONNAMOUR deelen schrijvers mede, dat zij bij vele duizenden bloedonderzoekingen bij buiktyphus nooit andere dan typhus- of paratyphusbacillen hebben gevonden.

L. CHEINISSE. *Le chlorure de calcium comme médicament cardiaque.* — Literatuuroverzicht. P. SMIT.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1921, No. 45.

P. G. UNNA. *Streptodermie. Erysipel.* — Klinische voordrachten. Niet kort weer te geven.

S. SCHOENBORN. *Ueber den Wert neuerer diagnostischer Intrakutan-Methoden (Eigenharn, Eigenserum) bei Tuberkulose.* — Bij een aantal zieken en gezonden (de zieken deels lijdende aan longtuberculose) werden alle bekende intracutane reacties verricht. Op grond van de uitkomsten, moet schrijver zoowel de „Eigenurin”-als de „Eigenserum”-reactie, bij longtuberculose, elk specifiek karakter ontzeggen.

G. SCHRÖDER. *Zur Behandlung der Lungentuberkulose mit Röntgenstrahlen.* — Zoowel bij konijnen, die met bovine tuberculose geënt waren, als bij menschen met longtuberculose, werd geen gunstige invloed van Röntgenbehandeling waargenomen.

R. ZIMMERMANN. *Ueber klinische Immunität bei Lungentuberkulose.* — Bij 86 patienten vindt schrijver bevestigd, dat zware gevallen van longtuberculose vaker in een gezonde familie voorkomen, dan goedaardige vormen.

L. BLUMREICH. *Ueber Myom-Therapie.* — Voordracht voor een artsencursus.

H. LANGER. *Zur Technik der Wa. R. im Liquor cerebrospinalis.* — Bevestigt de mededeeling van LESSER in *Arch. f. Derm. u. Syph.* 131, dat liquor geïnactiveerd moet worden.

E. COHN. *Ueber das Verhalten des Blutbildes bei Mischinfektion von Masern*

und Keuchhusten, sowie über einen Fall von Masern ohne Exanthem. — Bij vier kinderen, die tijdens een kinkhoest mazelen kregen, werd een overgang van leukocytose met relatieve lymphocytose, in leucopenie met relatieve lymphopenie en verschuiving naar links, waargenomen. Een van hen kreeg geen exanthem.

F. W. OELZE. *Ueber Präzipitinreaktion im Dunkelfeld für forensische Zwecke nebst Bemerkung über die SACHS-GEORGI-Reaktion.* — Schrijver beveelt aan, de praecipitinereactie van WASSERMANN EN UHLENHUTH in den hangenden druppel in „donker veld” te bezien.

ZIEGELROTH. *Salzarme Diät und salzfreie Tage bei Zuckerkranken.* — Schrijver paste genoemd diët jarenlang bij diabetes mellitus toe, waardoor de dorst verbeterde, de hoeveelheid urine verminderde en het percent suiker soms weinig veranderde, een enkele maal zelfs afnam.

L. ISACSON. *Zur parenteralen Kaseintherapie.* — In vele opzichten werkt cascosan minder goed dan melk, misschien bevat deze nog andere werkzame proteïden. Caseosan werd gecombineerd intraveneus en intramusculair ingegeven.

BÉLA V. MEZŐ. *Verfeinerung der Nieren und Uretersteindiagnose.* — In de laatste drie maanden gelukte het schrijver, om in vijf gevallen röntgenologisch uraastenen aan te toonen door collargol-pyelographie, waarbij het collargol op de nierstenen, die zelf niet zichtbaar waren, neerslaat.

A. RETHI. *Die Technik der totalen Kehlkopfexstirpation.*

UEBERHUBER. *Ueber ein Gemisch von Silbersalvarsannatrium und Salvarsannatrium.*

H. G. AUSTGEN. *Ueber „Pavon”, ein neues Vollpräparat aus Opium.* — Bij patiënten met longtuberculose als hoestbedarende middel met goede uitkomst gebruikt.

H. A. GINS. *Ein praktisch erprobtes Verfahren zur Gewinnung Bakterienarmen Kuhpockimpfstoffes.* — Niet kort weer te geven.

A. GEIGER. *Ein Fall von Sporotrichose.*

T. PÉTERFI. *Der gegenwärtige Stand der Physiologie der Geschlechtsbestimmung.*

G. LEDDERHOSE. *Chirurgische Ratschläge für den Praktiker. VII. Verstauchungen und Verrenkungen.*

Soziale Medizin und Hygiene. C. SCHELENZ. *Produktive Lungenkrankenfürsorge.*

Oeffentliches Gesundheitswesen. H. SELLHEIM. *Straffreiheit des Abtreibung.*

Feuilleton. ETTISCH RUSSELL. *Form und Funktion.*

Standesangelegenheiten. S. ALEXANDER. *Aerztliche Standesfrage.*

Kleine Mitteilungen.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1921, No. 46.

R. KLAPP. *Ueber die erneute Fortsetzung der Gewebsantiseptis (Vuzin und Rivanol).* — Goede uitkomsten door infiltratie, bij plaatselijke etteringen en prophylactisch bij operaties. Rivanolis vooral zeer werkzaam tegenover streptocokken. Zes gevallen van gewrichtsem pyeem genazen na punctie en inspuiting van rivanol.

E. HAILER. *Zur vergleichenden Prüfungs- und Wertbestimmungsmethodik der Desinfektionsmittel.* — Bij de vergelijkende waardebeoordeling van desinfectantia make men gebruik van kiemdragers. Hiervoor neemt schrijver inplaats van de granaten van PAUL EN KRÖNIG stukjes batist.

A. LOEWY und H. ZONDEK. *Morbus Basedowii und Jodtherapie. Klinische und gasanalytische Beobachtungen.* — Evenals NEISSER hadden schrijvers goede uitkomsten van de behandeling van morbus Basedowii met milligrammen joodkali. Het welbevinden en de voedingstoestand worden beter. In drie gevallen werd een duidelijke vermindering van de verhoogde gaswisseling aangetoond.

F. KISCH. *Untersuchungen über die „haemoklastische Krise” bei Cholelithiasis* — Uit een onderzoek bij patiënten met cholelithiasis wordt besloten, dat leucopenie, ontstaand na gebruik van 300 gram melk, de diagnose steunt. Ook, doch niet zoo vaak, werd leucopenie na gebruik van water of suikerwater waargenomen.

A. LIPPMANN. *Zur Technik der kutanen Tuberkulinreaktion (Perlsucht- und Moros „diagnostisches” Tuberkulin).* — Bij 300 verdachte kinderen geeft alt-tuberkulin meer positieve uitkomsten, dan beide andere praeparaten.

H. BRÜTT. *Die Indikationstellung zur Operation beim Magen und Duodenalgeschwür.* — Voordracht. Slot volgt.

H. FÜHNER. *Die peritoneale Resorptionszeit von Gasen.* — Op grond van proeven bij konijnen raadt schrijver aan, bij het opvullen van lichaamsholten met gas in de röntgendiagnostiek, inplaats van zuurstof of lucht, stikstofoxydule te gebruiken, dat veel sneller wordt geresorbeerd.

F. KIRSTEIN. *Ueber eine auffallende biologische Eigentümlichkeit des Neugeborenen.* — Door immunisering van zwangeren met T. A. VII, wordt de morbiditeit van de pasgeborenen aan diphtherie niet veranderd, hoewel bij de kinderen van aldus behandelde moeders een verhoogde antitoxinetiter wordt gevonden. Specifieke serumtherapie is bij zuigelingen waardeloos.

W. ALWEUS. *Der Wert der Röntgenaufnahmen mit Glühkathodenröhren für die medizinische Diagnostik.*

M. FRAENKEL. *Die Strahlentherapie beim Karzinom mittels zellfunktionserhöhender Reizstrahlen.*

L. HALBERSTAEDTER. *Bemerkungen zu vorstehenden Ausführungen.*

G. BRUNHÜBERER und W. GEIGER. *Ein neues Verfahren zur Herstellung von Bakteriennährböden.*

G. VOSS. *Der augenblickliche Stand der Lehre vom Muskelrheumatismus (Myalgie).* — Samenvattend overzicht.

G. LEDDERHOSE. *Chirurgische Ratschläge für den Praktiker.* VIII. *Knochenbrüche. Öffentliches Gesundheitswesen.* ABEL. *Der Preussische Landesgesundheitsrat und die gerichtsarztlichen Ausschüsse in den Provinzen.*

Standesangelegenheiten. Die Zukunft des Privatärztlichen Tätigkeit in Nordamerika.

Brief aus Holland.

Kleine Mitteilungen.

Deutsche medizinische Wochenschrift. 1921, No. 47.

F. KAUDERS und O. PORGES. *Ueber die Beziehungen der CO₂-Spannung der Alveolarluft und Pathologie der Magenverdauung.*

H. ESSER, F. KAUDERS und O. PORGES. *Ueber die Beziehungen der CO₂-Spannung der Alveolarluft zu den Chloriden der Blutserums.* — I. Verhooging van de CO₂-spanning in de uitademingslucht na den maaltijd wordt aan de zoutzuurafscheiding toegeschreven. Hierdoor wordt de noemer van de constante: $\frac{CO_2}{NaHCO_3} = K$,

in het bloed, vergroot en dus moet ook de teller toenemen. Bij anaciditeit blijft de stijging van de CO₂-spanning achterwege. In twee gevallen van pylorusstenose met uitbraken van zuren maaginhoud was de CO₂-spanning zeer hoog. II. Chronische vermeerdering van de chloriden in het bloedserum verlaagt de CO₂-spanning in de uitademingslucht, en omgekeerd; zoo bijv. bij zieken met emphyseem, waar de CO₂-spanning verhoogd is, bleek het keukenzoutgehalte van het bloedserum laag.

W. LIEPMANN und E. SCHULTZ. *Neue Ergebnisse zur Plazentar- und Eklampsieforschung.* — Uit kort medegedeelde doorstreamingsproeven met de placenta wordt besloten, dat in de placenta een belangrijke eiwitvertering plaats vindt, die bij eclampsie verhoogd is.

ARNETH. *Das Blutbild als prinzipielles Untersuchungsmittel am Krankenbette.* — Antwoord op de mededeeling van SCHILLING in no. 27.

R. OFFENBACHER und A. HAHN. *Zur Methodik der Blutzuckerbestimmung.*

W. BROCK. *Ueber Zusammenhang von Dermatosen und innerer Sekretion.* — Door bestraling van de streek van den thymus met Röntgenstralen werd bij psoriasis en enkele andere huidziekten zeer spoedige genezing waargenomen.

V. KAFKA. *Die ungefärbte und gefärbte Normomastix-reaktion der Rückenmarksflüssigkeit.* — Technische raadgeving.

H. BRÜTT. *Die Indikationsstellung zur Operation beim Magen- und Duodenalgeschwür.* — Slot. Niet kort weer te geven.

ED. VON ZALEWSKI. *Praktische Erfahrungen mit „Normosal“.* — Gunstige

uitkomsten van onderhuidse toediening van een oplossing van „normosal” (de anorganische zouten uit het bloedserum) volgens STRAUB bij gynaecologische en obstetrische patiënten met ernstig bloedverlies en dergelijke. De werking is sneller en duurzamer dan die van physiologische keukenzoutoplossing.

F. LESSER. *Einige interessante Fälle von syphilitischer Reinfektion. Kritische Bemerkungen zur Salvarsandosierung.* — Mededeeling van 6 gevallen van reïnfectie na salvarsaan-behandeling. Tot 1919 zijn slechts 30 onbetwistbare gevallen van reïnfectie bekend.

B. SURING. *Ueber eine eigenartigen Form von fixem Salvarsanexanthem.* — Beschrijving van een geval van op roodvonk gelijkend „fixes Salvarsanexanthem”, dat door intramusculaire inspuiting van 1 mgr. adrenaline kon worden voorkomen.

I. VON BÜBEN. *Thermopenetration in der Therapie der weiblichen Gonorrhoe.* — Goede uitkomsten.

O. GOLDSTEIN. *Ueber Versuche mit einem neuen Durchleuchtungsschirm.* — Aanbeveling van het „Siriusschirm” van de firma KALHBAUM, dat o. a. het voordeel heeft niet na te lichten.

U. FRIEDEMANN. *Der jetzige Stand der Differentialdiagnose der exanthematischen Krankheiten.* — Niet kort weer te geven.

G. LEDDERHOSE. *Chirurgische Ratschläge für den Praktiker. IX. Knochen- und Gelenktuberkulose.*

Oeffentliche Gesundheitswesen. HAMMERSCHLAG. *Die wesentlichen Bestimmungen im Entwurf des neuen preussischen Hebammengesetzes.*

Geschichte der Medizin. TH. KÖLLIKER. *Ein Kunstbein im XVII. Jahrhundert.*

Korrespondenzen. Ein Aerztedenkmal. — Habana heeft een standbeeld van FINLAY opgericht.

Standesangelegenheiten. S. ALEXANDER. *Standesfragen II.*

Kleine Mitteilungen.

C. VAN DAM.

The Lancet. 28 Jan. 1922, No. 5135.

R. HUTCHISON. *The problem of the solitary child.* — Daar het voortdurend in het brandpunt van aller belangstelling staat, wordt het eenige kind, het nakomertje, het door grootouders opgevoede kind, negativistisch, en vertoont allerlei lichamelijke, geestelijke en zedelijke afwijkingen. In een andere omgeving (zeker als het kind een ernstige organische ziekte heeft, daar alle therapie en onderzoek thuis onmogelijk is), geneest het negativisme spoedig.

CH. BALLANCE. *A glimpse into the history of the surgery of the brain. II.* — Slot.

W. B. GABRIEL and A. NEAVE KINGSBURY. *A case of acute anaerobic (B. Welchii) infection of uterine fibroids, with a reference to the aetiology of necrobiosis.* — Acute roode ontarding van fibromyomen (necrobiose) wordt veroorzaakt door een anaërobe infectie van de baarmoederholte uit. Behalve plaatselijke veranderingen in het gezwel (haemolyse, verweking, phlebitis, thrombosen) lijdt ook de algemeene toestand door resorptie en door haemolyse; patiënte ging in enkele dagen aan septichaemie te gronde.

S. COLYER. *Chronic deep infection of the jaws.* — Zelfs na verwijdering van alle zieke tanden en kiezen kunnen in de kaak nog (Röntgenologisch steeds aantoonbare) infectie-haarden aanwezig blijven.

R. V. SOLLY. *Two cases of fever.*

The Lancet. 4 Febr. 1922, No. 5136.

R. MC. CARRISON. *An address on faulty food in relation to gastro-intestinal disorder.* — Het flesschenkind en ook de volwassene, die zich hoofdzakelijk voedt met wittebrood, margarine, thee, suiker en jam, krijgt maag- en darm-stoornissen, daar maag en darmkanaal alleen gezond blijven bij voldoende en afwisselende, vitaminenrijke kost.

H. CHAMBERS, G. M. SCOTT and S. RUSS. *Experiments upon immunity to tumour growth.* — Bij dieren blijkt het mogelijk immuniteit op te wekken tegen overgeënte kwaadaardige nieuwvormingen door entingen met gezwel-weefsel, dat blootgesteld is aan een passende hoeveelheid stralende energie.

TH. H. KELLOCK, H. CHAMBERS and S. RUSS. *An attempt to procure immunity to malignant disease in man.* — Vier tot vijftien cm^3 gezwelweefsel (op een steriele schaal fijn gemaakt en bestraald met de dubbele hoeveelheid X-stralen, benodigd om de gezwelcellen in vitro te doden), wordt den patiënt zelf weer ingespoten in twee zakjes onder de diepe fascie van den buikwand. Sedert Mei 1920 toegepast bij 30 personen.

A. E. BARCLAY. *The X-Ray diagnosis of gastric ulcer.* — De Röntgenologische diagnose van de maagzweer is een laboratoriumwerk en dus afhankelijk van drie factoren: geoefendheid, toestel en techniek van den Röntgenoloog. Als deze zijn diagnose controleert in de operatiekamer en bij de lijkopening, kan hij evenals in de kliniek van MAYO tot 95 pCt. goede diagnoses komen.

W. J. WILSON. *The serological test in typhus.* — Een emulsie van *B. proteus* X19 (WEIL-FELIX) wordt aan het eind van de eerste week geagglutineerd door het serum van een lijder aan vlektyphus. De levende *B. proteus* X19 wisselt nogal eens in agglutineerend vermogen. Als *B. proteus* X19 snel in vacuo wordt gedroogd, blijft dit vermogen bij kamer- en bij lichaamstemperatuur maandenlang behouden. Emulsies van deze gedroogde bacillen kunnen met 1:1000 formaline enkele weken bewaard worden.

H. SMITH. *The earliest stage of senile cataract.* — Als iemand van boven het 40ste jaar klaagt over slecht in de verte zien, is een lichte lenstroebling het eerste begin van staar. Aanbevolen wordt oogbadjes te geven met joodkali 1:30 — 1:25 om hyperaemie op te wekken en zodoende den voedingstoestand van de lens te verbeteren.

WESLY.

La Riforma medica. 1921, No. 44—45.

Dit dubbelnummer bevat het verslag van het *XXVII Congresso della Società Italiana di Medicina interna* (25—28 October te Napels), met portretten der voornaamste deelnemers. Hoofdonderwerpen: *Tubercolosi, Pleuriti purulenti* en *Encefalite epidemica*.

La Riforma medica. 1921, No. 46.

Dit nummer bevat het verslag van het *XXVIII Congresso della Società Italiana di Chirurgia*. Hoofdonderwerpen: *Plosi gastro-intestinali, Tubercolosi renale e sua cura*.

En van het *XII Congresso della Società Italiana di Ortopedia*. Hoofdonderwerpen: *Cura della spondilite tubercolare* en *Osteoartrite deformante*.

La Riforma medica. 1921, No. 47.

L. TORRACA. *Sulla concomitanza di alcune malformazioni uretrali con anomalie testicolari.* — Schrijver komt tot de bevinding, dat bij lichte graden van epi- en hypospadie het meest veelvuldig afwijkingen in de ligging der teeltballen gevonden wordt.

C. ALESSANDRI. *Brevi ricerche sulla colesterinemia nell' uomo in svariate condizioni morbose.* — Bepalingen van het cholesterine-gehalte van het bloed bij 22 patiënten. Het hoogere gehalte in bepaalde gevallen komt overeen met wat reeds vroeger beschreven is. Na onderhuidsche inspuiting van adrenaline was het gehalte veelvuldig verhoogd.

C. MARTELLI. *Ricerche sulla prova di WASSERMANN.* — Schrijver besluit dat men steeds de proef moet doen met verschillende antigenen. Dan is een positieve uitslag bewijzend voor lues. Bij actieve lues is 0.1—0.2 cm^3 serum voldoende, in twijfelachtige gevallen moet 0.4—0.5 cm^3 worden genomen. In latente gevallen doet veelvuldig een korte specifieke behandeling de reactie positief worden.

A. MAZZARELLA. *Sopra alcune variazioni del reperto ematico prodotte dalla linfoganglina con speciale riguardo alla eosinofilia.* — Het uittreksel der lymphklieren (linfoganglina) volgens prof. MARFORI verwekt eosinophilie en werkt dus ook in dit opzicht antagonistisch tegenover adrenaline.

H. A. J. M. SPOORENBERG,