

# LITERATUUR-OVERZICHTEN.

## WEEKBLADEN.

### Münchener medizinische Wochenschrift. 1922, No. 22.

F. KROH. *Die künstliche, ein- und doppelseitige Lähmung des Zwerchfells.* (*Eine experimentelle und klinische Studie*). — Uit dierproeven en waarnemingen bij den mensch blijkt, dat geleidingsonderbreking in den nervus phrenicus leidt tot verlamming, niet dadelijk tot volledige ontspanning van het middenrif; het gevolg is maximale uitademingsstand van het middenrif, dat alleen bij diepe ademhaling nog (niet paradox) passief bewogen wordt. Subphrenisch liggende organen worden hierdoor dus niet meer gemobiliseerd. Men kan deze verlamming bewerken ter behandeling van tetanus van het middenrif, zij is het beste middel tegen hik.

W. SCHÖNFELD. *Die vorbeugende Salvarsanbehandlung.* — SCHÖNFELD bestrijdt deze; men behandelde niet, voordat de diagnose is gesteld.

B. FISCHER. *Ueber intravenöse Menthol-Eukalyptol-Injektionen bei Tuberkulose und den Einfluss intravenöser Oelinjektionen auf das Lungengewebe.* — FISCHER acht de door LEPEHNE aanbevolen menthol-eukalyptolie-inspuitingen gevaarlijk, daar zij steeds tot infarctvorming leiden. De olie is hier niet de schuldige, doch de toevoeging aan de olie van een stof, die het weefsel prikkelt; kamferolie bijv. veroorzaakt nooit longinfarct, terwijl hersenbloedingen enz. alleen door circulatiestoornis ontstaan, indien te veel olie intraveneus is ingespoten.

W. WEICHARDT und TH. STEINBACHER. *Familiengeschichtliche Erhebungen in Kreisen gelernter Industriearbeiter Mittelfrankens.*

J. S. ESSER. *Schnittführungen in der struktiven Chirurgie.* — Voordracht.

F. HAMBURGER. *Ueber den Kropf im Säuglingsalter.* — HAMBURGER beschrijft de in Stiermarken niet zelden bij zuigelingen voorkomende struma. Behandeling met jodiumzalf en 2—3 maal in de week 1 mgr. joodnatrium.

C. B. HÖRNICKE. *Ueber das sogenannte Mühlengeräusch.* — In het beschreven geval waren twee verklaringen mogelijk; haematopneumothorax of luchtembolie.

HILGENREINER. *Darmzerreissung durch eigenhändige Reposition eines freien Leistenbruches.*

R. JAEGER. *Ein neues direkt zeigendes und registrierendes Röntgenstrahlengerät (SIEMENS-RÖNTGEN-Dosismesser).* — Met afbeeldingen.

W. SANDROCK. *Verbreitung der Lungentuberkuloseinfektion auf dem Lande.* — Opmerkingen bij het artikel van NEHRING.

H. SAENGER. *Erfahrungen mit der KIELLANDSchen Zange.* — Beantwoording van ZIMMERMANN.

A. BACMEISTER. *Die Behandlung der Lungenblutung.* — Overzicht.

### Münchener medizinische Wochenschrift. 1922, No. 23.

A. BIER. *Ueber medizinische Betrachtungsweisen, insbesondere über die mechanistische und über die teleologische.*

W. STORM VAN LEEUWEN und H. VAREKAMP. *Ueber die Tuberkulinbehandlung des Asthma bronchiale.* — Reeds in dit Tijdschrift besproken.

F. VON MIKULICZ-RADECKI. *Ueber die Bedeutung der Ovariallipoide.* — Voordracht.

TH. SCHAPS. *Beobachtungen an 600 in Injektionsanästhesie vorgenommenen Operationen.* — Uit het overzicht blijkt, dat deze methode niet geheel ongevaarlijk is: bij 4.5 pCt. ernstige stoornis van hart en circulatie, bij ruim 4 pCt. ademhalingstoornissen, bij niet weinigen braken, hoofdpijn, excitatie, motorische verlamming enz.. Bij 4 pCt. was de gevoelloosheid geheel onvoldoende.

K. BÄTZOLD. *Ueber die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen im Zitratblute luetischer Säuglinge.* — De roode bloedlichaampjes, die bij normale zuigelingen reeds veel sneller neerslaan, dan bij volwassenen ( $1^3\frac{1}{4}$ — $2^3\frac{1}{4}$  uur tegen 5—9 uur bij volwassenen), doen dit bij luetische zuigelingen nog sneller (tot 19—38 minuten). Na specifieke behandeling ziet men den tijd weer langer worden.

P. PITZEN. *Die Differentialdiagnose zwischen der beginnenden tuberculösen Spondylitis und dem chronischen Rheumatismus der Rückenmuskeln.* — Vóór rheumatismus spreken verhardingen in de spieren (myogelosen) en geringe beperking der beweeglijkheid van de wervelkolom; voorts bespreekt PITZEN verschillen in de spontane pijnlijkheid en de pijnlijkheid bij druk en beweging.

SCHALL. *Vergleichende Untersuchungen über verschiedene Tuberkuline in diagnostischer Anwendung.* — Onderzocht werden „Alttuberkulin Höchst” en het diagnostische tuberculine van MORO. Het onderzoek viel ten gunste van het laatste uit.

L. ZILL. *Zur Technik der Scheidenspülungen.* — Voordracht met afbeeldingen.

L. VOIGT. *Die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten in Nürnberg.*

T. BÁRSONY und E. EGAN. *Die Gastroduodenalsonde. (Eine neue Methode zur exakten Untersuchung physiologischer und pathologischer Verhältnisse des Magens und Duodenums am Menschen).* — Afgebeeld.

A. MEYER. *Ueber das Verhalten des Blutdruckes nach Bestrahlung mit künstlicher Höhensonne bei Kindern.* — Na bestraling gedurende een uur werd gemiddeld een daling van 10.8 mM. kwik gevonden.

J. PETRUSCHKY. *Zur Kritik der perkutanen Tuberkulosebehandlung.* — Beantwoording van MORO en ROEPKE.

E. EBSTEIN. *Die Kunst des Einbalsamierens vor 100 Jahren.*

A. KRECKE. *Zur Differentialdiagnose der Mammatumoren.* — Overzicht.

### Münchener medizinische Wochenschrift. 1922, No. 24.

G. AXHAUSEN. *Ueber Vorkommen und Bedeutung epiphysärer Ernährungsunterbrechungen beim Menschen.* — Niet kort samen te vatten.

TH. GÖTT und E. WILDBRETT. *Zur Frage der Säuglingseklampsie.* — Tetanie op zich zelf leidt wel tot stemspleetkramp, doch niet tot eclampsie; dit doet zij alleen, als het kind een „convulsieven aanleg” heeft. Schrijvers vonden in de families van aan eclampsie lijdende zuigelingen opmerkelijk dikwijls spraakstoornissen, epilepsie en linkshandigheid; zij nemen daarom verwantschap aan tusschen zuigelingeneclampsie en genuine epilepsie; beide groeien uit denzelfden bodem, den convulsieven aanleg.

W. LOELE. *Ueber die Verwendbarkeit eines Arionextraktes bei der sogen. HECHT-schen Modifikation der WASSERMANN'schen Reaktion.* — Een alcoholisch extract van arion rufus geeft bij latente en behandelde lues in ongeveer 90 pCt. positieven uitslag.

J. F. S. ESSER. *Hautbeschaffung aus Mamma und Präputium u. s. w.* — Voordracht.

R. KORBSCH. *Zur Behandlung der Pleuraempyeme: Empyem-Troikart, Aspirator und Ueberdruckmaske.* — Met afbeeldingen dezer instrumenten.

W. TH. SACK. *Vorbehandlung mit Koffein bei der Salvarsanbehandlung der zentralen Nervenlues.* — Coffeine bewerkt electief vernauwing der mesenteriale vaten. SACK spuit daarom 10 minuten vóór een intraveneuse salvarsaaninspuiting onderhuids 200 mgr. coffeinum natrio-benzoicum of -salicylicum in, opdat minder salvarsaan naar de buikorganen en meer naar het centrale zenuwstelsel worde geleid.

TH. FÜRST. *Die ärztliche Mithilfe bei Berufseignungsprüfungen in gewerblichen Betrieben.*

RAUENBUSCH. *Ein seltener Fall von Appendixgeschwulst.*

A. JAPHA. *Anfälle von Mastdarmkrampf.* — JAPHA houdt deze niet voor een perineumkramp, zooals ELSNER doet, doch voor een kramp van den musculus sphincter internus.

M. SCHIRMER. *Purinäquivalententabelle.*

O. LUBARSCH. *Ueber Entzündungsbegriffe und Entzündungstheorien.* — Opmerkingen bij het artikel van ASCHOFF. G. RICKER voegt hier nog eenige opmerkingen aan toe.

H. SCHRÖDER. GERARD VAN SWIETEN. *(Zu seinem 150. Todestage).*

**La Presse médicale. 1922, No. 52.**

P. E. WEIL, BOCAGE et ISCH-WALL. *Le syndrome de l'insuffisance hémocrasique du foie.* — Uitvoerig worden de wijzigingen, die in het bloed plaats vinden bij leverinsufficiëntie, besproken, in het bijzonder de veranderingen in den duur van het bloeden van een wond bij verschillende leverziekten.

A. GIRAULT et A. RICHARD. *Intoxication par l'oxyde de carbone suivie de gangrène et de rétention recto-vésicale.* — Ziektegeschiedenis.

J. MIRC. *Note sur le traitement de l'épilepsie par le gardénal.* — Bij 3 van 8 lijdens aan epilepsie, bij wie de luminalbehandeling plotseling werd gestaakt, volgde binnen 48 uren een hevige verergering van den toestand (état de mal), die niet langer dan 12 uren duurde en gevolgd werd door een tijdperk van somnolentie. Deze verergering bleef bij hen uit, indien men om de 2 dagen de giften met 20 mgr. verminderde.

L. CHEINISSE. *Les injections intraveineuses d'huile camphrée sont-elles inoffensives?* — Overzicht van de artikelen van LEO, LEPEHNE, FISCHER en anderen.

**La Presse médicale. 1922, No. 53.**

E. TOULOUSE et L. MARCHAND. *De l'état de mal épileptique.* — Uitvoerige beschrijving van dezen toestand, zijn pathogenese en behandeling.

H. M. BÉRAUD. *La transfusion du sang citraté par le procédé des trois seringues.* — In bijzonderheden wordt deze eenvoudige methode beschreven.

1e Congrès des dermatologistes et syphiligraphes de langue française (suite).

P. SMIT.

**Il Policlinico. 24 Aprile 1922.**

G. AIELLO. *Sui prodotti di scissione dell' albumino nel liquido cefalo-rachidiano.* — De bedoelde splitsingsproducten zijn tryptophaan en tyrosine. De reactie op tryptophaan is de volgende: bij 3 cM<sup>3</sup> cerebrospinale vloeistof voegt men 15 tot 18 cM<sup>3</sup> geconcentreerd HCl en 1 of 2 druppels formaline 2 pCt.. Men mengt en na eenige minuten laat men langzaam langs de wanden van de reageerbuis 25 of 30 druppels van 0.06 pCt. natriumnitriet toevloeien. Bij aanwezigheid van tryptophaan ziet men op de scheidingsplaats een violetten ring, die na 3 à 5 minuten verschijnt. De reactie op tyrosine is: bij 1 cM<sup>3</sup> cerebrospinale vloeistof tot kookhitte verwarmd wordt het reactief van MILLON gevoegd (gelijke gewichtsdeelen ac. nitric. en nitrose, met metallisch kwik met eenzelfde hoeveelheid aqua destill. verdund). Er ontstaat dan een dik wit neerslag. Bij normale cerebrospinale vloeistof is de tryptophaanreactie gewoonlijk negatief alsook bij lues en meningitis serosa. Is zij bij heldere vloeistof positief, dan is er meestal tuberculeuse meningitis. Ook geeft sclerose en plaques een positieven uitslag. De reactie op tyrosine gaat evenwijdig met de hoeveelheid aanwezig eiwit.

G. B. ANTONGIOVANNI. *Cisti teno-sinoviali e tubercolosi.* — Klinische mededeeling.

GUIDO CARISI. *I metalli colloidal nella cura del cancro.* — Over de toepassing van colloidaal zilver bij kanker is CARISI niet geestdriftig gestemd.

AUGUSTO CASSUTO. *Una modificazione dell' uretroscopia di VALENTIN.*

M. GIOSEFFI. *Bonifica umana e desinfezione idrica nel risanamento antimalarico.* — Verbetering van de levensvoorwaarden voor den mensch en drooglegging van het terrein (door den mensch in 1919, door de natuur in 1920 en 1921) is de malaria in een streek, waar gemiddeld 200 gevallen van malaria voorkwamen, zoo goed als verdwenen.

**Il Policlinico. 1 Maggio 1922.**

UMBERTO BACCARANI. *Sopra due casi di crisi-asmatiche di origine pleurica. La pleurite asmogena.* — Klinische mededeeling.

GUIDO SQAURTI. *Sindromi nervose poco comuni nella malaria dei bambini.* — Klinische mededeeling.

EUGENIS PIRONDINI. *Contributo alla semeiologia della prostata.* — Geen nieuws.

L. BOTTACIN e D. MAGRO. *Autolinfoterapia nella tubercolosi.* — De techniek is zeer eenvoudig. Op de goed ontvette huid van de borst, wordt een kleine Spaan-

sche vliegpleister gelegd. Na 24 uur ongeveer is een blaas ontstaan, de pleister wordt verwijderd, de huid gesteriliseerd en met een spuitje wordt de vloeistof erin opgezogen en vervolgens onderhuids ingespoten. De hoeveelheid verschilt. Gewoonlijk begint men met  $\frac{1}{2}$  cM<sup>3</sup> en vermeerdert deze gift tot 2 à 3 cM<sup>3</sup>. Elke week wordt ingespoten. Vooral in beginnende gevallen zou deze wijze van handelen zeer gunstige gevolgen hebben.

VICENZO BILLOTTA. *Un nuovo piccolo strumento chirurgico. L'ago specillo.*

### Il Policlinico. 8 Maggio 1922.

SERAFINO BELFANTI. *La terapia proteinica (aspecifica) nella pratica e nella teoria.* — Wordt voortgezet.

GUILIO TESSIER. *Contributo alla casistica delle fratture della rotula.*

BERNARDUS MASCI. *Di un nuovo segno osservato nei parkinsoniani post-encefalitici.* — Dit bestaat daarin, dat zieken, die ternauwernood langzaam kunnen gaan, toch in staat zijn heel vlug te loopen.

V. VANNI. *Sopra un dispositivo semplicissimo per ultramicroscopia.*

GIUSEPPE CASUCCIO. *La scelta del mestiere.*

### Il Policlinico. 15 Maggio 1922.

SERAFINO BELFANTI. *La terapia proteinica (aspecifica) nella pratica e nella teoria.* — Samenvattend overzicht.

ORMISDA FALCI. *La cura medica nell' ascesso epatico da ameba.* — Een typisch geval van leverabsces door amoeben werd met gunstig gevolg behandeld met inspuitingen van hydrochloras emetini. In 4 dagen tijds werd in het geheel 330 mgr. ingespoten. Na 14 dagen pauze opnieuw drie dagen lang 120 mgr..

SANTE SOLIERI. *Considerazioni sulla creazione specifica peritoneale di SGAMBATI nelle urine.* — Wordt aangeraden de reactie van SGAMBATI ook geregeld toe te passen bij febris typhoidea, om indien peritonitis dreigt tot operatie te kunnen overgaan.

V. SEBASTIANI. *Per rendere più semplice e più pratica la ricerca dell' indacano nella urine.* — Men neemt het gewone zoutzuur uit den handel en voegt daaraan toe minstens 2 per duizend ijzerroest (poeder). Dan doet men bij een deel urine 2 deelen van deze vloeistof en laat het mengsel 10 minuten staan, waarna men 2 of 3 cM<sup>3</sup> chloroform toevoegt en alles goed schudt. Daarna laat men het weer staan, verwijdert het boven het chloroform zich bevindende en vervangt het door water. Daarna schudt men weer, waardoor het chloroform van het chloret. ferrici wordt bevrijd. Is de reactie positief, dan is het chloroform meer of minder blauw gekleurd.

### Hospitalstidende. 1922, No. 12, 13, 14.

E. DAHL-IVERSEN. *Om Ileus som Følge af visse medfødte Misdannelser belyst ved danske Tilfælde.* — Wordt voortgezet.

### Hospitalstidende. 1922, No. 15.

E. DAHL-IVERSEN. *Om Ileus som Følge af visse medfødte Misdannelser belyst ved danske Tilfælde.* — Klinische mededeeling.

AAGE O. WOLFF. *Om Røntgenrørets Centrering.* — Tijdens de opname wordt de Röntgenbuis liefst iets achterover geplaatst. Het anode gedeelte moet het laagst staan. Bij opnamen, waar op dezelfde plaats gezond en ziek gedeelte moeten vergeleken worden, zooals bijv. bij de bijholten van den neus, bij de longen enz., letten er vooral op, dat de lengteas van de buis parallel staat met de lengteas van den patiënt.

### Hospitalstidende. 1922, No. 16.

HOLGER RUD. *Om Fibro-adenoma mammae hos Mænd.* — Slot volgt.

### Hospitalstidende. 1922, No. 17.

HOLGER RUD. *Om Fibro-adenoma mammae hos Mænd.* — Wanneer men een gezwel van de borstklier bij een man waarneemt, verwijdere men het steeds. Zijn er ontstekingsachtige verschijnselen, dan wachte men eerst, totdat die voorbij zijn.