

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1922, No. 43.

Klinische Vorträge. K. GLAESSNER. *Darmstörungen bei Pankreaserkrankungen.*

Originalabhandlungen. F. KAUDERS und O. PORGES. *Der Einfluss des Duodenalinhaltes auf die Magensekretion.* — Bij vier normale personen werd langs de duodenumsonde de twaalfvingerige darm geprikkeld tijdens het proefontbijt en daarna dit laatste op zoutzuur onderzocht. Zoutzuur en sterk geconcentreerde zoutoplossingen remmen de maagsapafscheiding, alkaliën verhoogen deze.

KARL PASCHKIS. *Zur Biologie des reticulo-endothelialen Apparates.* — Door inspuiting met streptocokkenvaccin verliest alleen de milt de eigenschap later ingespoten carmijn vast te leggen, zonder de binding van ijzer te verliezen; de andere reticulo-endotheliale cellen ondervinden hiervan geen invloed.

WALTER JACOBI. *Ueber kombinierte endovenöse Mirion-Neosalvarsanbehandlung bei progressiver Paralyse.* — Gelijkijdige intraveneuze inspuiting van 5 cM³ 20 pCt. mirion-oplossing en neosalvarsaan had geen gunstige uitwerking op de metaluetische processen.

KARL PREIS. *Die Kochfestigkeit des Tuberkelbazillus.* — Niet gefixeerde, met carbolfuchsine gekleurde tuberkelbacillen verliezen door koken gedurende ongeveer 5 minuten hun kleurstof nog niet, terwijl ongeveer alle andere zuur-vaste bacteriën door koken reeds in 1 à 1½ minuut ontkleurd worden. De runderbacillen zijn minder kookvast dan de humane.

E. VON BALOGH. *Unter dem Bilde der toxischen Formen von Paratyphus verlaufende Typhusinfektionen.* — De beschrijving van vier gevallen, die bacteriologisch en serologisch onderzocht wezen op een besmetting met typhusbacillen, doch klinisch (en voor één geval ook pathologisch anatomisch) geheel overeenstemmen met een toxischen paratyphus.

WILHELM NEUTRA. *Hypnotische und posthypnotische Analgesie.* — Aanmerkingen op het stuk van KOGERER in de *W. kl. Ws.* No. 23—25.

J. ED. ST.

La Presse médicale. 1922, No. 85.

P. BROCOQ et L. MONIER. *Sur le traitement chirurgical des accidents initiaux de la dent de sagesse inférieure et l'extraction de cette dent encore incluse.* — Operatietechniek met vele afbeeldingen.

A. ZIMMERN et P. COTTENOT. *L'électromyographie.* — Schrijvers beschrijven de electromyogrammen van normale spieren, verkregen volgens de methode van PIPER, na prikkeling van een geïsoleerde zenuw, na opwekking van een reflex en bij willekeurige samentrekking. Ook zijn op deze wijze de samentrekkingen van gladde spieren onderzocht, terwijl in de pathologie o.a. WERTHEIM SALOMONSON den voetklonus bestudeerde.

La Presse médicale. 1922, No. 86.

TH. JONNESCO. *Nouvelle technique de la rachi-anesthésie générale.* — JONNESCO heeft zijn techniek zoozeer verbeterd, dat hij nu zonder bezwaar elke operatie van hoofd tot voeten onder rachianaesthesie uitvoert. Hij spuit in ter plaatse van het segment, dat ongevoelig moet worden. Bulbaire verschijnselen nam hij niet meer waar, sedert hij met stovaine niet meer strychnine, doch 500 mgr. cafeïne inspuit. Hij is overtuigd, dat deze afdoende, eenvoudige, snelle, ongevaarlijke methode spoedig algemeen zal worden toegepast.

R. TARGOWLA. *La réaction du benjoin colloïdal dans la paralysie générale.* — De beteekenis dezer reactie voor de differentiale diagnostiek staat vast. TARGOWLA merkt bovendien op, dat de graad der reactie evenwijdig loopt met den ernst en de ontwikkeling der meningo-encephalitis; een herhaald uitgevoerd onderzoek geeft belangrijke aanwijzingen voor de prognose.

F. NIDERGANG. *L'infezione focale dentaire en médecine générale.* — Kleine, soms alleen door Röntgenonderzoek te herkennen etterhaardjes, uitgaand van den tandwortel, kunnen de oorzaak zijn van verschillende algemeene verschijnselen.

L. CHEINISSE. *Arsénobenzènes et solutions glycosées hypertoniques.* — Literatuuroverzicht. Door arsenobenzol met hypertonische suikeroplossing in te spuiten schijnt men met kleiner giften te kunnen uitkomen en de kans op bijwerkingen geringer te worden.

La Presse médicale. 1922, No. 87.

A. BROCA. *Arthrites non tuberculeuses de la hanche.* — Broca bespreekt deze heupaandoeningen, in hoofdzaak om te wijzen op de moeilijkheden, die zij voor de diagnostiek geven kunnen.

F. PEDRAZZINI. *Obésité et hypertension.* — De neiging tot apoplexieën bij zwaarlijvigen brengt PEDRAZZINI in samenhang met vetophooping om de hersenvliezen, waardoor de dura mater haar elasticiteit verliest en de bloedsomloop binnen de schedelholte wordt belemmerd. Ook de hypertensie acht hij hiervan afhankelijk. Door rust, werkeloosheid enz. wordt deze vetophooping bevorderd; beweging, ademhalingsgymnastiek enz. voorkomen haar het best.

P. SMIT.

Il Policlinico. fasc. 30, 1922.

M. PERGOLA. *Sui bacilli difterici e pseudodifterici.* — Onderzoekingen over den diphtheriebacil, die echter nog niet tot besliste uitkomsten leidden.

SALVATORE AUREMMA. *Sulla diagnosi delle fratture della clavicola.* — Klinische mededeeling.

C. F. ZANELLI. *Il pericolo cocainico.* — Ook in Italië neemt het cocainemisbruik toe.

Il Policlinico. fasc. 31, 1922.

PIERO BOVERI. *Dissociazione albumino leucocitaria nel liquido cefalo-rachidiano e sua importanza diagnostica.* — Uit de waarnemingen bij een paar gevallen wordt afgeleid, dat belangrijke hyperalbuminose van de cerebro-spinaalvloeistof, zonder overeenkomstige leucocytose, doet denken aan de mogelijkheid van een langzame compressie in het gebied van de hersen- of ruggemergsvliezen. Hypercytose zonder overeenkomstige hyperalbuminose is de uitdrukking van een acuut ontstekingsproces, heel dikwijls van luetischen aard.

SAVERIO CARABELLESE. *Sulla cura contemporanea della sifilide con la miscela „Neosalvarsan-Cyarsal”.* — Het mengsel wordt ten eerste aanbevolen. Het is gemakkelijk toe te passen, volmaakt onpijnlijk, en wordt heel goed verdragen. CARABELLESE paste het dan ook in zijn spreekuurpraktijk toe. Het werkt zeer snel verbeterend op de klinische verschijnselen, zoowel als op de serumreactie.

OSCAR BRUNICARDI. *Un apparecchio per mantenere la mandibola fissa in alto e la bocca aperta durante la narcosi chirurgica.* — Een toestelletje, waardoor het mogelijk is gedurende de narcose den mond geopend en de onderkaak in subluxatie te houden. Het biedt volgens den maker zeer veel voordeelen aan. Verschijnselen van stikking zouden niet meer voorkomen, terwijl het ook niet meer noodig is de tong naar voren te trekken.

LETI-TESTI. *Per rendere più semplice e più pratica la ricerca dell' indacano nell' urina.* — In fasc. 20, 1922 komt een artikel voor van SEBASTIAAN om indacaan in de urine aan te toonen. Er wordt op gewezen, dat die methode volstrekt niet nieuw is.

Il Policlinico. fasc. 32, 1922.

NICOLICH GIORGIO. *Considerazioni de un vecchio urologo sui recenti risultati della terapia Röntgen.* — Schrijver is niet erg geestdriftig.

V. VANNI. *Sulla spirochetose ittero-emorragica.* — Klinische mededeeling.

VIOLA FRANCESCO. *Sopra un caso di epatite sifilitica.* — Klinische mededeeling.

GUIDO REINA. *Applicazione dei metodi fotografici per allestire preparati permanenti di batteri che si decolorano facilmente.* — Een methode om te maken, dat de niet GRAM-resistente bacteriën zeer langen tijd hun kleur blijven behouden. Hij paste

een fotografische methode toe. Eerst werd het praeparaat gefixeerd met formaline gemengd met natrium-nitrat en alcohol. Daarna werd het behandeld nitras argenti en vervolgens met hydrochinon en natriumsulfiet. Dan werd het praeparaat ingesloten en coupes gemaakt, die behandeld werden met chloorgoud, natriumhyposulfiet en sulfocyanetum ammonicum.

Il Policlinico. fasc. 33. 1922.

SILVIO CRAINZ. *Sul trattamento incruento del ginocchia valga rachitico*. — Beschrijving van een onbloedige wijze om de rachitische genua valga te behandelen.

REMO MONTELEONE. *L'esame della funzionalita epatica e l'emoclasia digestiva*. — De digestiehaemoclasie van WIDAL (*La presse médicale* 1921, no. 43 valt positief uit in de meerderheid der gevallen van aandoeningen aan de lever. Hypoglobulie en hypotensie komen steeds erbij voor. De alimentaire glycosurie heeft als verschijnsel zeer weinig waarde.

GIOVANNI GENOESE. *Terapia della pertosse con l'etere*. — Aether werkt zeer gunstig bij kinkhoest. Hij spuit in de spieren om den anderen dag in. Bij kinderen beneden zeven maanden $\frac{1}{2}$ cM³. Bij kinderen tot 3 jaar 1 cM³. Daarboven 2 cM³.

GUGLIELMO BILANCIONI. *Di un voluminose polipo etmoidale a diramazioni multiple*. — Klinische mededeeling.

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Dermatologische Wochenschrift. 23 Sept. 1922.

M. OELZE—RHEINBOLDT. *Ueber Ulcus vulvae acutum und Scheidenbazillen*. — *Bacillus crassus* kan voorkomen zonder ulceratie, en *ulcus vulvae acutum* kan voorkomen met, uitsluitend met, of zonder *Bacillus crassus*.

F. BENEDEK. *Die gefärbte Normomastixreaktion (KAFKA) im Liquor cerebrospinalis*. — (Vervolg en slot). Verschillende krommen, de praecipitatie weergevend in den liquor van luetische zenuwziekten, van tuberculeuse meningitis, etterige meningitis enz..

F. HAMMER. *Die Behandlung des Karbunkels unter Beziehung auf den Aufsatz von SCHÜTZ*. — Hij behandelt niet operatief, maar met rust en afsluitend vochtig verband.

H. DESELAERS. *Wismutinjektion in der Syphilistherapie mit Bismogenol „Tosse“*. — Acht gevallen van syphilis met bismogenol behandeld — geen stomatitis opgetreden wel een lichte bismuthzoom in 4 gevallen — uitstekende werking op syphiliden.

Dermatologische Wochenschrift. 30 Sept. 1922.

FR. HAMMER. *Ueber Hautreize und deren Verwendung*. — Voordracht over de door huidprikkels van verschillenden aard teweeggebrachte huidveranderingen. (Wordt vervolgd).

L. WAELSCH. *Unterempfindlichkeit der Haut gegenüber akutem Ekzem, innerhalb eines Naevus telangiectaticus*. — Ook voor een proefondervindelijk opgewekte dermatitis bleek de naevus telangiectaticus ongevoelig, misschien mede tengevolge van het ontbreken van vasomotorische zenuwen.

NOURNEY. *Erwiderung auf DELBANCO's Bemerkungen zu NOURNEY's Immunitätsbehandlung der Geschlechtskrankheiten*. — Herhaalde ontwikkeling der gronden voor de gunstige immuniseerende werking der met eigen bloed verrichte inspuitingen „Vebli“ bij syphilis.

Dermatologische Wochenschrift. 7 Oct. 1922.

EVENING. *Beitrag zur Frage der diffusen Hautinfiltrate im sekundären Stadium der Lues*. — Deze zeldzame syphilis-aandoening wordt vaker bij aangeboren dan bij verkregen syphilis aangetroffen. Zij zetelt dikwijls om den mond en laat straalsgewijs gelegen litteekens achter.

FR. HAMMER. *Ueber Hautreize und deren Verwendung*. — (Vervolg en slot). Behandelt het gewinnen aan huidprikkels, de sensibilisatie, de jeukprikkels en de behandeling van de reacties op prikkels.

Dermatologische Wochenschrift. 14 Oct. 1922.

P. UNNA en A. PLAUT. *Sektionsbefund bei einem klinisch geheilten Lepra-fall.* — Beschrijving van een geval van lepra bij een patiënt met syphilis. In de laatste levensjaren waren de verschijnselen verdwenen en geen nieuwe opgetreden. De genezing bleek na overlijden van den patiënt schijnbaar te zijn, want bij de lijk-opening vond men naast verschillende niet-lepreuse aandoeningen een lepreuse ontsteking van den nervus ulnaris, met talrijke leprabacillen.

H. KRUG. *Beitrag zur einzeitigen Behandlung der Lues.* — Verslag van 76 syphilis-gevallen behandeld met een kuur van 2.5—3 gram zilversalvarsaan gemengd met novasurol of met een kuur van 4—5 neosalvarsaan en cyarsal, eveneens gemengd. Bij de patiënten, die de kuur volgden, werd de reactie van WASSERMANN negatief.

MENDES DA COSTA.

BOEKAANKONDIGINGEN.

Dr. OSCAR HUG, *Thoracoplastik und Scoliose.* (Beilage-
heft der *Zeitschrift für orthopädische Chirurgie*, Band XLII),
Stuttgart, FERDINAND ENKE, 1922.

In het eerste hoofdstuk geeft HUG een kritische bespreking van, den tegenwoordigen stand van de chirurgie bij longtuberculose. De chirurgische behandeling van de longtuberculose is gebouwd op de ondervinding verkregen bij ribresecties wegens empyemen. Terwijl de operaties van FREUND en KLAPP ten doel hebben den longtoppen de gelegenheid tot ontplooiing te geven, streven de meeste andere operaties er naar een collaps van de zieke long tot stand te doen komen. Dit is het geval met de pneumothorax-behandeling volgens FORLANINI, met de thoraxplastieken volgens WILMS, FRIEDRICH, SAUERBRUCH e. a. (gecombineerd of niet met longplomben, phrenicotomieën, resecties van tusschenribszenuwen en de zenuwen, welke de m. m. scaleni innerveeren) en eveneens met de geheele thoractomie. HUG maakt het duidelijk, dat een uitgebreide kennis van de pathologie der longtuberculose en een juist inzicht in het ademhalingsmechanisme noodig zijn om op dit zeer moeilijke terrein den weg te vinden. Groote beteekenis moet gehecht worden aan de stellingen van TENDELOO omtrent de wisselende respiratorische spanningen der alveoli in de verschillende deelen van de long voor een goed begrip van de localisatie van de longtuberculose.

In het tweede hoofdstuk worden de vormveranderingen van borstkas en wervelkolom behandeld, welke ontstaan na operaties wegens longtuberculose. Zóóvele momenten zijn van invloed op de vorming van deze difformiteiten, dat het onbereikbaar schijnt a priori de waarheid te benaderen. De voornaamste dezer momenten zijn: 1^o. De toestand van borstkas, wervelkolom, van de ligamenten en de borstkas omhullende spieren, o. a. het al of niet aanwezig zijn van een week beenstelsel, slappe banden en spieren, vergroeiingen tusschen ribben en wervels. 2^o. De toestand, waarin zich de pleurae en longen bevinden. Het bestaan van pleura-vergroeiingen, pleuraverdikkingen, de graad en localisatie van