

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1923, No. 52.

Klinische Vorträge. L. STANOJEVIC. *Massage als therapeutisches Mittel bei Psychomotorischer Erregtheit.*

Originalabhandlungen. I. AMREICH. *Zur Aetiologie und Prophylaxe der nach der VEIT-SMELIESCHEN Handgriff auftretenden Klavikularfracturen.* — Het sleutelbeen breekt in deze gevallen in het spierlooze gedeelte tusschen de aanhechting van den pectoralis major en den deltoideus door druk tegen de eerste rib bij sterk naar beneden trekken van het schoudergewricht. Het is te voorkomen door de vingers zoo dicht mogelijk bij den hals in te haken en de beweging van het hoofd te ondersteunen door druk op den buik.

JULIUS K. MAYR. *Das Gonoyatren bei der Behandlung der gonorrhoeischen Nebenhodenentzündung.* — Inspuiting van gonocokkenvaccine kan gunstig werken bij de gonorrhoeische verwickelingsontstekingen, maar deze gunstige werking wordt slechts in weinig gevallen verkregen. Men kan trachten dit aantal te vergrooten door gelijktijdige inspuiting van cel-activeerende stoffen; de combinatie gonocokken en yatreen blijkt in vele gevallen goed te voldoen.

B. ASCHNER. *Die konstitutionelle Bedeutung der Amenorrhoe und ihre Behandlung.* — Slot. Naast plaatselijke oorzaken wordt hoofdzakelijk gewezen op de anaemische en de plethorische constitutie als aetiologisch moment en wordt aanbevolen deze constitutie te verbeteren, waarbij een geheele reeks min of meer obsolete middelen weder worden aangeraden.

DURIG. *Nekrologie von ROBERT TIGERSTEDT.* — De bekende Zweedsche physioloog stierf 3 December 1923 op zeventig-jarigen leeftijd.

J. ED. ST.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1923, No. 51.

SELTNER, KNAUER und GESCHKE. *Zum Problem der Tuberkulose-Schutzimpfung.* — Immunisering tegen tuberculose is alleen mogelijk door tuberculeuse besmetting, welke een tuberculeusen haard veroorzaakt. Het is schrijvers gelukt bij kalveren met behulp van zóó lang fijngewreven tuberkelbacillen, dat slechts 0.001 pCt. van deze zijn structuur behouden had, een zeer lichten, latent haard te verwekken. Proeven omtrent de immuniteit van deze dieren mislukten.

A. SEITZ. *Untersuchungen in Schriftgiessereien.* — Lood en antimonium worden hier in hoofdzaak door het spijsverteringskanaal opgenomen. Het bloedbeeld der arbeiders is niet gekenmerkt door basophilie (aan de inwerking van lood schijnt gewenning op te treden), doch door betrekkelijke lymphocytose en verminderd aantal thrombocyten, blijkbaar in hoofdzaak gevolg van de inwerking van antimonium. Aanwijzingen voor de voorbehoeding.

VON HOFMEISTER. *Ideale Cholezystektomie, kombinierte Bauchoperationen.* — Voordracht. HOFMEISTER bericht over 117, volgens zijn methode zonder drainage, alle met goed gevolg uitgevoerde cholecystectomiën. Hij heeft zich eraan gewend bij laparotomie steeds alle buikorganen te onderzoeken en in één tempo te opereeren, wat te opereeren valt. Hij nam bijv. bij zijn 117 cholecystectomiën 112 maal den appendix weg, voerde o.a. 29 maal een maagsectie uit enz..

E. MAHLO. *Ueber die Behandlung von Bronchialerkrankungen mit Jaborandi-blättern.* — Versterking van speeksel- en zweetafscheiding door folia jaborandi wordt algemeen aangenomen, over versterking van de bronchiaalsecretie zijn de meeningen verdeeld. MAHLO heeft hieromtrent bij verschillende bronchitislijders onderzoekingen gedaan en is overtuigd, dat deze bladeren het beste middel zijn om bij droge bronchitis, met weinig taai slijm, de afscheiding te vermeerderen en meer vloeibaar te maken. Ook bij asthma en kinkhoest met weinig expectoratie beveelt hij het aan. Hij geeft 3 maal daags een gram als infuus.

K. FLEISCHER und O. HIRSCH-TABOR. *Zur Potenzierung der Yohimbinwirkung.* — Door samenvoeging met eenige eveneens vaatverwijdende alcaloïeden (papaverine, methylhydrastimide) kan men de werking van yohimbine aanmerkelijk versterken. Daar deze alcaloïeden minder giftig zijn dan yohimbine, zijn de door schrijvers samengestelde praeparaten papaverine-yohimbinetartraat en methylhydrastimide-yohimbinetartraat, die ongeveer 43 pCt. yohimbine bevatten, minder giftig dan yohimbine, terwijl hun werking als aphrodisiaca bij dier en mensch dezelfde blijkt te zijn. Men kan ze onderhuids of per os toedienen.

V. C. IRK. *Ueber einen eigenartigen Fall von innerer Einklemmung des Dünndarmes bei gleichzeitiger geplatzter Tubenschwangerschaft.*

FRIEDLÄNDER. *Ueber die gewöhnlichen Fehler bei der allgemeinen Narkose.* — Opmerkingen bij het artikel van KRECKE.

C. HAEBERLIN. *Unzweckmässige Blutstillungsversuche durch Laien.* — Nadeelige gevolgen van verkeerd uitgevoerde afsnoering volgens ESMARCH.

BAMBERGER. *Ueber künstliche Blutleere mittels SEITRScher Klemme.* — Aanwijzingen voor de techniek.

R. DITTLER SIEGFRIED GARTEN †.

K. PORT. *Die Behandlung der Schenkelhalsfrakturen.* — Overzicht.

La Presse médicale. 1923, No. 98.

A. B. MARFAN. *La cuti-réaction: sa valeur pour le diagnostic de la tuberculose des enfants du premier âge.* — Klinische les, waarin MARFAN de groote diagnostische betekenis van de cutireactie bij kleine kinderen uiteenzet.

LAIGNEL-LAVASTINE, FREUD, *Freudisme et freudiens.* — Kritiek op den arbeid van FREUD en zijn volgelingen.

L. CHEINISSE. *Quelques essais récents dans le traitement de l'encéphalite épidémique.* — Literatuuroverzicht.

La Presse médicale. 1923, No. 99.

BOSCH ARANA. *Les amputations cinéplastiques.* — Voordracht, met vele afbeeldingen.

F. COSTE. *Effets physiologiques de l'extirpation du foie.* — Overzicht van de proeven bij honden van MANN en MAGATH.

La Presse médicale. 1923, No. 100.

D. DANIELOPOLU. *Traitement du rhumatisme polyarticulaire aigu par les doses massives de salicylate.* — Bij een groot aantal sedert 1910 tijdig volgens deze methode behandelde gevallen nam DANIELOPOLU nooit een hartverwikkeling waar, in tegenstelling met op andere wijze behandelde patiënten. Het eenige goede praeparaat is salicylas natricus, dat vroeg, lang en in stijgende en later dalende doses per os moet worden toegediend, in middelmatig zware gevallen bij volwassenen tot 18 gram daags (beginnend met 8 gram), in zware tot 25—30 gram, aldus verdeeld, dat overdag alle 2 uren, 's nachts alle 4 uren wordt ingenomen. Ter voorkoming van acidose geve men het met de dubbele gift bicarbonas natricus en late men de voeding voornamelijk uit meelspijzen en suiker bestaan. Een hartverwikkeling is geen tegenaanwijzing, de behandeling kan ook deze verbeteren. Bij kinderen per K.G. gewicht nog grooter giften dan bij volwassenen.

P. L. VIOLLE. *L'épreuve de la diurèse fractionnée et le régime des boissons au cours des néphrites.* — VIOLLE laat den sedert den vorigen avond nuchteren rustenden patiënt vanaf 7 uur 4 maal 200 cM³ water van Vittel gebruiken, met halve uren tusschentijd en meet vanaf half 8 tot 10 uur de elk half uur geloosde urine. In normalen toestand stijgt de hoeveelheid uitgescheiden urine tot 9 uur (300 cM³) en zijn om 10 uur 940 cM³ geloosd, bij ernstige nephritis zijn de hoeveelheden geringer en is de stijging minder uitgesproken. Uitvoerig wordt toege- licht, hoe deze proef inzicht geeft omtrent de „souplesse fonctionnelle” en de „capacité fonctionnelle” van de nier.

J. SÉNÈQUE. *Remarques sur le traitement de l'orchépididymite tuberculeuse.* — Literatuur overzicht.

La Presse médicale. 1923, No. 101.

P. VALLERY-RADOT, J. HAGUENAU et M. A. DOLLFUS. *Les tests pharmacodynamiques du tonus vago-sympathique et les états anaphylactiques.* — Schrijvers hebben bij eenige anaphylactische toestanden (urticaria, asthma, hooikoorts, migraine) en bij normale personen de reacties op adrenaline, atropine en pilocarpine, onderhuids toegediend, bestudeerd en bij beide groepen de meest uiteenlopende uitkomsten verkregen, zoodat zij twijfelen aan de waarde van deze tests voor de herkenning van evenwichtstoornissen in het vegetatieve zenuwstelsel.

A. DESJARDINS. *L'instrumentation dans la chirurgie biliaire.* — Met vele afbeeldingen.

W. FILATOFF. *Opérations plastiques à tige ronde ambulante.* — FILATOFF heeft deze methode, die hij naar aanleiding van 12 gevallen beschrijft, in Rusland reeds in 1916, dus vóór GILLIES toegepast.

La Presse médicale. 1923, No. 102.

A. B. MARFAN. *Les enseignements de la cuti-réaction: l'immunité antituberculeuse.* — Voordracht.

C. DANIEL et A. BABES. *Etude sur le xanthome de la trompe utérine (salpingite xanthomateuse).* — In 3 gevallen, bij welke schrijvers voor salpingitis salpingectomie verrichtten, vonden zij in het slijmvlies der tuba xanthomen. Zij vonden deze salpingitis xanthomatosa nog niet in de literatuur vermeld en beschrijven uitvoedig het anatomisch beeld en de onderscheiding van kaashaarden, accessorie bijnieren in het ligamentum latum, lipomen en papillomen van de tuba.

L. CHEINISSE. *Associations et synergies médicamenteuses.* — Overzicht.

P. SMIT.

Klinische Wochenschrift. 1923, No. 51.

GEORG JOANNOVIC. *Reizgeschwülste.* — Beschouwing.

WOLFGANG WEICHARDT und GEORG SCHOLZ. *Ueber im Körper unter verschiedenen Bedingungen entstehende aktivierende Spaltprodukte.* — Onder activeering der cellen moet men verstaan een verandering ervan in reactie op gelijke prikkels en wel een versterking. De activeerende stoffen kunnen inderdaad ontstaan uit splitsingsproducten van het eigen lichaamseiwit.

ERICH KOSTERLITZ. *Zur Klinik und Therapie der Atemlähmung.* — Het ademcentrum is het meest gevoelige in de medulla, die ook door druk van de groote hersenen in het foramen occipitale kan geperst worden. Dit is van belang zoowel bij operaties in de achterste schedelgroeve als bij de verloskundige praktijk. Laag leggen van het hoofd is de physiologische behandeling.

F. GEORGI und J. STEINFELD. *Zur Serodiagnostik der Kaninchensyphilis.* — Bij dieren vindt complementbinding met de bij de serodiagnostiek gebruikte extracten wel plaats, zonder dat er een syphilitische besmetting bestaat. Die niet specifieke positieve reactie is rechtstreeks afhankelijk van de aanwezigheid van zeer labiele globulinen, die door verdund zoutzuur verwijderd kunnen worden.

G. LEPEHNE und HEDWIG BANDISCH. *Ueber die Verwertbarkeit der MILLON'schen Reaktion im Harn als Leberfunktionsprüfung.* — De reactie met MILLON's reagens volgens EPPINGER kan de titrimetrische bepaling der aminozuren als maatstaf voor een gestoorde leverfunctie niet vervangen. Voor zoover het kleine onderzoek uitwijst, is met die reactie ook bij belasting door aminozuren geen zeker resultaat te verkrijgen.

W. GAEHTGENS. *Die Schichtprobe im Dienste der serologischen Syphilisdiagnostik durch Ausflockung.* — Vooral bij noodzaak van snelle diagnostiek heeft deze proef, die door KODAMA werd ingevoerd, waarde: een positieve reactie is afdoende bewijs voor syphilis, een negatieve sluit syphilis niet altijd uit.

KURT KLARE. *Einheitliche Nomenklatur bei der Beschreibung von Röntgenogrammen der kindlichen Lunge.* — Voorstel om de afwijkingen aan hilusklieren en longen nader te omschrijven en daarvoor bepaalde namen te gebruiken.

BERNHARD STUBER. *Zur Theorie der Thrombin- und Kalkwirkung. Eine Entgegnung an EDGAR WOHLISCH.* — Polemieek met en antwoord van EDGAR WOHLISCH.

EDGAR WOHLISCH und KARL PASCHKIS. *Zu unserer Arbeit: „Ein direkter Nachweis der spezifischen Rolle des Kalks bei der Entstehung des Thrombins.“* — Wijzen op een proef van prof. FULD, die aantoonst, dat kalk voor het ontstaan van het thrombine uit cyto- en plasmazym noodig is.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

S. BÜCHNER und E. GRAFE. *Zur Kenntnis der Wirkungsweise des Insulins.* — Insuline is een sterk stimulans voor de celwerking in het algemeen en in het bijzonder voor de suikerverbranding: het aangrijpingspunt ligt dus niet in een bepaald orgaan.

PAUL SAXL. *Eine Trypsinflockungsreaktion im Serum.*

G. STIEFLER. *Unilaterale tabische Arthropathie des ersten Carpometacarpalgelekes.* — Casuïstiek.

HANS HOLFELDER. *Die Erfahrungen mit der Röntgentherapie der malignen Tumoren an der SCHMIEDENSchen Klinik.* — Samenvattend overzicht.

Klinische Wochenschrift. 1923, No. 52.

O. BRUNS. *Ueber Wiederbelebung.* — Overzicht.

H. STAUB, FR. GÜNTHER und R. FRÖHLICH. *Veränderungen im Ionengehalt des Blutes unter Insulin. Vorläufige Mitteilung.* — Bij een hond werden na inspuiting van insuline de veranderingen nagegaan, wat de mineraalstofwisseling betreft.

KURT GOLDSTEIN und WALTHER RIESE. *Ueber induzierte Veränderungen des Tonus (Halsreflexe, Labyrinthreflexe und ähnliche Erscheinungen). Blickrichtung und Zeigeversuch.* — Niet kort weer te geven.

P. MÜHLENS. *Ueber Gefahren bei der Fieberbehandlung der Paralyse.* — Men moet letten op aanwezigheid van luizen en muggen, op de weerstandskracht van den patiënt, op de noodzakelijkheid van het gebruik van zuivere tertianastammen, op de gevoeligheid van den patiënt voor chinine.

A. CZEPA und F. HÖGLER. *Zur Pathogenese des Röntgen- und Radiumkaters.* — Men moet de oorzaak zoeken in een veranderde stofwisseling; o.a. is een functioneel minderwaardigheid van de lever, waarschijnlijk door abnormale stofwisselingsproducten, bewezen. De stoornis in de zoutstofwisseling is nog geen uitgemaakte zaak. Schrijvers wijzen dan op de overeenkomsten tusschen de verschijnselen bij de proteïnlichamentherapie en die bij Röntgen- en radiumbestralingen.

KURT DRESEL. *Chondroitinschwefelsäure im Serum. Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Amyloid und Chondroitin-Schwefelsäure.* — Zoowel in het serum van lijdende aan amyloïde onttaarding als van die aan lipoidnephrose werd een vermeerdering van chondroitine-zwavelzuur gevonden; misschien is deze dus gevolg van retentie van deze stof, die normaliter door de nier wordt uitgescheiden en is zij geen chemisch bestanddeel van amyloïde.

KARL MEIXNER. *Bemerkungen zu G. STRASSMANN, „zur Unterscheidung von Ein- und Ausschuss.“* — Polemieek.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

E. FRIEDBERGER und A. CECCHINI. *Ueber die Immunisierung des Meerschweinchen gegen Typhusbacillen durch Vorbehandlung mit lebenden und toten Bacillen und mit Passagevirus.*

EMERICH BACH. *Ueber die Wirkung der H-Ionenkonzentration auf die Guanidinvergiftung des isolierten Froschmuskels.*

TH. FAHR. *Gutartiger Tumor als Passagehindernis im Oesophagus.* — Casuïstiek.

E. ROEDELIIUS. *Ueber den malignen Oberlippenfurunkel.* — Voor de praktijk.

J. VAN TILBURG.

Dermatologische Wochenschrift. 10 November 1923.

H. FUHS. *Die Indikationsstellung zur Röntgentherapie verschiedener Ekzemformen.* — Hardnekkige en vaak terugkerende eczemen genazen door bestraling met door 0.5—1 mM. aluminium gefiltreerde röntgenstralen in reeksen van enkele giften van 0.5—3 H., met lange tusschenpoozen. Eczema cruris varicosum en eczema tyloticum plantare et palmare bleven na deze behandeling vrij onveranderlijk.

G. NOBL. *Ueber Beziehungen der Neurodermitis zu Alopecie*. — Vier gevallen bij vrouwen, bij wie overgang van neurodermitis in alopecia areata was waar te nemen.

J. ZOLLSCHAU. *Urtikarielles Arzneiexanthem nach Behandlung einer Psoriasis*. — Na genezing der psoriasishaarden met 10 pCt. cignolinezalf ontstond om de vroeger aangetaste plaatsen een urticaria-achtige uitslag. Schrijver vat dit op als een allergische haardreactie en als een ondersteuning der theorie van den parasitairen oorsprong der psoriasis.

A. HOLLÄNDER. *Zur Behandlung der Psoriasis vulgaris mit intravenösen Natrium-salicylicum-Injektionen bei gleichzeitiger Salbenapplikation*. — Behandeling volgens SACHS-HUBNER; salicylas natricus intraveneus, salicylzuur-cignolinezalf op het lichaam, salicylzuur-, witte praecipitaatzalf op het hoofd. Na de inspuitingen vaak duizeligheid, flikkeren voor de oogen, hittegevoel in het hoofd. De werking der inspuitingen is weinig in het oog vallend.

E. WOHLSTEIN. *Dermatitis exfoliativa subacuta non generalisata*. — In tegenstelling met BROcq's dermatitis, vertoonde de uitslag geen generalisatie.

M. HODARA. *Ein Fall von Sporotrichose der Genital und Analgegend und der Mundschleimhaut*. — Het polymorphe ziektebeeld deed het meest aan syphilis denken, maar de daarop gerichte behandeling had geen gevolg. De ware oorzaak bleek uit de cultuur op SABOURAUD's voedingsbodem. OMER-FUAD beschreef drie dergelijke gevallen.

E. WELLMANN. *Rektumkarzinom und Syphilis bei einer Jugendlichen*. — De diagnose adenokarzinom werd eerst na den dood gesteld. Verslag der lijkopening.

S. MENDES DA COSTA.

II Policlinico. 1923, fasc. 41.

L. SPOLVERINI. *L'esame ultramicroscopica del sangue in relazione al genere di allattamento*. — Wanneer wij normale bloedwei, door centrifugeeren verkregen, en genomen liefst kort na een maaltijd, microscopisch onderzoeken, dan zien wij daarin talrijke uiterst kleine glanzende partikeltjes door MÜLLER in 1896 haemoconiën genoemd. Zij bestaan voornamelijk uit vet. SPOLVERINI onderzocht het serum van 12 kleine kinderen, die voor een deel natuurlijke voeding kregen. De wijze, waarop zich de haemoconiën voordoen, hangt van de wijze van voeding van het kind af. Bovendien kan men gevolgtrekkingen er uit maken over het soort van voedsel, den tijd verstreken sedert de laatste voedselopneming, en den toestand van de spijsverteringsorganen.

PIO MARIANO POLLERI. *Sopra un caso di meningite acuta sifilitica in periode terziario*. — Klinische mededeeling.

BERNARDINO MASCI. *Meningite acuta sifilitica nel periodo secondario precoce*. — Klinische mededeeling.

II Policlinico. 1923, fasc. 42.

AUGUSTO CASCUTO. *Alcune indicazioni alla pielografia*. — Een pleidooi voor de pyelographie.

UGO REITANI. *Sopra un caso di polineurite malarica grave*. — Klinische mededeeling.

GIUSEPPE BROTZU. *Un caso di febbre ricorrente in Sardegna*.

II Policlinico. 1923, fasc. 43.

LUIGI SCHIBONI. *Contributo allo studio clinico e anatomo-patologico dei tumori cistici del cervello*. — Beschrijving van twee gevallen, waaruit blijkt, dat hersenzwellen zeer lang kunnen bestaan, zonder dat men ze kan herkennen, met als eenig verschijnsel hoofdpijn.

OLINTO SCIARRA. *L'azione antiluetica del bismuto é indipendente dalla sua influenza sulle sieroreazioni positive*. — Bismuth heeft geen enkelen invloed op de positieve seroreactie bij konijnen.

A. ILVENTO. *Alcuni rilievi sull'epidemiologia e della cura della peste bubbonica*. — Zeventien gevallen van bubonpest werden behandeld met onderhuidse inspuitingen van jodiumtinctuur. Er werden vier inspuitingen gedaan van

$\frac{3}{2}$ cM³, om de bubonen heen, wat den volgenden dag werd herhaald. Verder werd met een spuitje de etter uit de bubonen verwijderd en daar dan ingespoten glycerine met jodium. Alle zeventien gevallen genazen voorspoedig.

Il Policlinico. 1923, fasc. 44.

ITALO LDVI. *Pericoli da arsenobenzoli e loro profilassi.* — Als voorbehoedende middelen beveelt LEVI aan inspuiting van een oplossing van één per duizend adrenaline. Verder beginnen met kleine giften en de kuur inleiden met kwikpraeparaten.

M. GIOSEFFI. *Il morso della vipera.* — Wijze om adderbeten te behandelen. Een voorname rol spelen afbinden, het doen bloeden van de beetwondjes door insnijding. Zeer werkzaam moet verder zijn een oplossing 1 : 12 van chloretum calicum of calcium hypochloriet. Hiervan wordt 5 cM³ vermengd met 45 cM³ kokend water, waarmee men de wond uitwascht, terwijl tevens onderhuids van die oplossing bij volwassenen 20 à 30 cM³ en bij kinderen 10 cM³ wordt ingespoten op drie of vier plaatsen in de buurt van de wond. Als specifiek middel geldt het door CALMETTE reeds in 1894 bereide serum.

Il Policlinico. 1923, fasc. 45.

Gewijd aan het medisch en chirurgisch congres van 24 October 1923.

Il Policlinico. 1923, fasc. 46.

Bevat het verhandelde op de congressen voor interne geneeskunde, voor chirurgie, voor urologie en voor orthopaëdie.

Il Policlinico. 1923, fasc. 47.

GIULIO LECCISOTTI. *La vaccinazione antirabica col metodo dei vaccini jenicati a crescente virulenza.* — De uitkomsten gedurende twee jaren verkregen met de Italiaansche methode ter behandeling van rabies door FERMI uitgevonden (vaccine verzwakt door acid. phenol).

GIUSEPPE BELLORRI. *Le iniezioni endovenose di urotropica nei processi infiammatori delle vie urinarie.* — In de aderen gespoten heeft urotropine een veel krachtiger werking dan door den mond toegediend.

Il Policlinico. 1923, fasc. 48.

DANTE DE BLASI. *Sul fenomeno paradossoso nella reazione di WASSERMANN.* — Soms gebeurt het, dat hetzelfde bloed van lueslijders op verschillende dagen, nadat het afgenomen werd, ook verschillend reageert.

G. TROGU. *Contributo allo studio della frattura del rene.* — Klinische mededeeling.

DEL RIO-DARIO. *Nuova segna della predisposizione alle malattie subacute del torace e conseguenti applicazioni pratiche.*

Il Policlinico. 1923, fasc. 49.

A. PASINI. *Il Bismuto nella cura della Sifilide.* — Bismuth is inderdaad werkzaam bij lues. De beste werking oefenen de zouten in suspensie uit (trepol, oleobismuth spironal, novallosan).

GILE BRENDOLAN. *Su di un caso di stenosi pilorica di origine biliare.* — Klinische mededeeling.

NINO BLANDINI. *Un caso di appendicocèle strozzato.* — Klinische mededeeling.

Il Policlinico. 1923, fasc. 50.

Salvatore Traina. *La reazione di SCHICK negli adenocidei.* — Van de honderd onderzochte kinderen met adenoïde vegetatie vertoonden er 40 de reactie van SCHICK. Veertig dagen na de verwijdering daarvan vertoonde slechts 24 die reactie.

PANTALEONI PIO. *Un caso di chiluria nostrale.* — Klinische mededeeling.

DOMENICO CARBONE. *Il meccanismo della crise pneumonica.* — Kritiek.