

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1925, No. 21.

H. SCHMIDT. *Zur Narzylennarkose.* — Voordracht. Uitvoerig worden de vier bezwaren tegen deze bedwelming: onvoldoende ontspanning, vermeerderde bloeding, groot toestel en ontploffingsgevaar, besproken. Niettemin acht SCHMIDT narcyleen een groote aanwinst voor de bedwelming bij operaties, alleen is het niet geschikt voor groote laparotomieën, bij welke volkomen ontspanning vereischte is.

F. K. WALTER. *Ueber die physiologischen Grundlagen der natürlichen Euthanasie.* — WALTER vergelijkt de agonale bewustzijnsstoornis met die bij toxische symptomatische psychoses: de oorzaak is volgens zijn onderzoekingen dezelfde, bij beide is de doorgankelijkheid der hersenvliezen verhoogd en bereiken vergiften uit het bloed gemakkelijk het centrale zenuwstelsel.

E. ANDERSEN. *Das Gemeinsame der Strahlen-, Proteinkörper- und Insulinwirkung.* — De overeenkomst bestaat hierin, dat alle drie een acidose bewerken, welke na eenigen tijd in alcalose omslaat. ANDERSEN zet uiteen, dat het zaak is bij de behandeling met deze middelen de acidoseperiode te verlengen, wat het beste gelukt door diët (haver- keukenzoutdiët, graan- en leguminosenzaden, vleesch). Door een acidose te bewerken, wordt de doseering dezer 3 middelen gemakkelijker en bereikt men met kleinere i ten het doel.

M. BUDDE. *Ueber Ueberschussbildungen an den Gallenwegen.* — Voordracht.

U. MULLERN-ASPEGREN. *Einiges über die GENNERICHSche Endolumbalbehandlung.* — In een reeks gevallen van cerebrospinale lues, tabes, beginnende paralyse enz., heeft schrijver zich overtuigd van de grootere doeltreffendheid van de endolumbale salvarsaanbehandeling boven de intraveneuse. Een bezwaar is, dat de patiënt voor elke inspuiting eenige dagen zijn werk moet onderbreken en een ziekenhuis moet opzoeken.

H. JESSEN. *Gaswechseleergebnisse bei Erkrankungen der Schilddrüse.* — Bij de ziekte van BASEDOW en hyperthyreose, wordt een sterke verhooging gevonden, die door psychische opwinding en onmiddellijk na de strumectomie nog toeneemt; daarna begint langzamerhand de daling, die dikwijls een jaar of langer voortduurt en een indicator is voor de genezing. Bij struma zonder hyperthyreoidismus vindt men geen of geringe verhooging, die zich na strumectomie niet wijzigt.

H. GÄNSSLE. *Ueber das subaquale Darmbad in der Gynäkologie.* — GÄNSSLE heeft deze baden volgens BROSCHE in 600 gevallen toegepast zonder eenigen na-deeligen invloed op te merken. Hij kent geen beter middel voor regeling van den stoelgang en reiniging van den darm. Bij 25 pCt. faalde de methode. Van groot belang is zij ter voorbereiding van operaties aan het perineum.

W. HAASE. *Ueber den Einfluss der arsenigen Säure auf das weisse Blutbild.* — Ongeveer 8—14 dagen na begin der toediening (liq. Fowleri, arseentriferrol) ontstaat bij normaal of ongeveer normaal bloedbeeld een vermindering van het aantal leucocyten, soms tot beneden de helft van het oorspronkelijke; in het bijzonder verminderen de neutrophiele cellen. De eosinophiele cellen en monoccyten vermeerderen gewoonlijk een weinig. De lymphocyten verhouden zich verschillend: was hun aantal tevoren normaal, dan wijzigt zich hun vol; trekte aantal weinig; bestond reeds een etrek e ij lymphocytose, dan daalt het aantal lymphocyten, doch minder dan dat der neutrophiele cellen: men vindt dus nog een betrekkelijke lymphocytose.

M. LANGE. *Entstehung und Behandlung einer Pseudarthrose in einer alten Femurfraktur.* — Ziektegeschiedenis.

F. SCHLUNK. *Zusammenstellung der wichtigsten therapeutischen Massnahmen bei der Behandlung von Varizen und ihren Folgeerscheinungen.* — Overzicht.

E. KAPFF. *Ein Llama-Serum gegen Lues.* — Naar aanleiding van de mededeeling van JAURÉGUI over lamaserum, deelt KAPFF mee, dat hij reeds voor 20 jaren op de lamasyphilis opmerkzaam heeft gemaakt.

A. KÖHLER. *Zur Technik der Röntgenaufnahmen mit BUCKY-Blende.*
 F. LANGE. *Die Behandlung der Knochenbrüche durch den praktischen Arzt auf Grund orthopädischer Erfahrungen dargestellt.* — Overzicht.

La Presse médicale. 1925, No. 42.

PIERRE-MARIE. *Eloge de J. M. CHARCOT.*

A. SOUQUES. *CHARCOT intime.*

L. HASKOVEC. *JEAN MARTIN CHARCOT (1825--1893).*

La Presse médicale. 1925, No. 43.

M. CHIRAY et I. PAVEL. *Physiologie de la vésicule biliaire.* — De galblaas is geen overbodig orgaan, zij vervult een belangrijke rol als contractiel galreservoir, terwijl voorts de concentratie van de gal in de galblaas van beteekenis is: op het gunstige oogenblik ontvangt het duodenum een ruime hoeveelheid zeer werkzame ingedikte gal. De resorptie van galbestanddeelen door de galblaas achten schrijvers van minder belang, terwijl de beteekenis der secretie nog onvoldoende is opgehelderd.

CH. LAURENT. *Les albuminuries prolongées et curables de la syphilis.* — LAURENT beschrijft deze naar aanleiding van 4 ziektegeschiedenissen. Hoewel men hier anatomisch van nephritis kan spreken, ontbreken klinisch de kenmerkende nephritisverschijnselen.

PH. PAGNIEZ. *Le traitement de la paralysie générale par l'inoculation du paludisme.* — Literatuuroverzicht.

P. SMIT.

Il Policlinico. 1925, fasc. 13.

MARIO PRATI. *L'influenza dei prodotti autoliotici per l'attaccamento del diplococco di Fränkel nelpolmoni.* — Systematische proeven, waarbij hetzij door inspuiting, hetzij door verdamping virulente culturen van pneumocokken diep in de luchtwegen van konijn, hond enz. werden gebracht. Het bleek, dat de aanwezigheid van die cokken alleen in de alveoli kan worden verdragen, zonder dat er ziekteverschijnselen ontstaan. Het ontstaan van een pneumonie eischt bovendien nog een beschadiging van het longweefsel. Hetzij door alcohol, hetzij door trauma, door kouvatten of door inademen van prikkelende stoffen. Daarbij ontstaan autolytische producten, die den bodem vatbaar maken voor de werking der bacteriën.

GEORGIE FANELLI. *Fibroleiomina de tenue e indagine radiologica.* — Klinische mededeeling.

M. GIOSEFFI. *Recrudescenza della malaria in Istria e come debel lare l'infezione.* — Zoo spoedig mogelijk gedurende twee weken 1.2 tot 2 gram su f. chinini per dag, dan ophouden en in plaats daarvan ferro-arsenicum met strychnine. Zoo noodig later weer chinine.

Il Policlinico. 1925, fasc. 14.

LUIGI PHILIPPON. *La terapia sterilizzante di EHRlich della sifilide recente.* — Pleidooi voor krachtige en grondige behandeling met salvarsaan.

SERTORIO MARINACCI. *Di una forma rara di ernia di LITRE.* — Klinische mededeeling.

LUIGI TOSARI. *Di un caso di litite plastica dello stomaco.* — Klinische mededeeling.

Il Policlinico. 1925, fasc. 15.

M. MICHELI e G. FANELLI. *Contributo alla reazione di BOTHELO per la sierodiagnosi del cancro.* — Weinig bemoedigende uitkomsten.

CARLO VEDIHA. *Contributo clinico alla conoscenza della litrasi polmonare.* — Klinische mededeeling.

PETRO TUNPANI. *Un caso di Kala-Azar in una donna de 25 anni.* — Klinische mededeeling.

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1925, No. 21.

Klinische Vorträge. BROGSITTER. *Mikroskopische Befunde bei Arthritis uricæ.*
Originalabhandlungen. STARLINGER. *Zur Verwendung des Glühbrenners in der kleinen Chirurgie mit besonderer Berücksichtigung der Mastitisbehandlung.* — Een aanbeveling tot veelvuldig gebruik van den thermocauter van PAGENLIN, waarmee men bij vele acute ontstekingen een snelle genezing kan verkrijgen zonder onnoodig gebruik van antiseptica, verband en verpleeghulp. Voor borstabscessen is de behandeling uitstekend, geeft weinig littekenmisvorming, voor diffuse mastitis deugt deze methode niet.

HANS SCHNEIDER. *Zur Klinik der Duodenalphlegmone.* — De beschrijving van een doodelijk afgelopen geval, dat klinisch niet herkend was. Zooals ook bij andere gepubliceerde gevallen ($\frac{1}{6}$) was de patiënt tevens lijder aan levercirrhose. Voor de diagnose gewichtige symptomen zijn niet op te geven.

FRITZ BRUNN. *Ueber das Durstgefühl.* — Volgens MULLER ontstaat het dorstgevoel door kramp van den slokdarm bij te hoog zoutgehalte van het bloed. BRUNN komt hiertegen op en bepleit een opvatting, die meer overeenkomt met de verklaring van het hongergevoel volgens DURIG. Hij wil het vochtverlies van de weefsels, in het bijzonder van pharynx en oesophagus, op den voorgrond plaatsen en het kristalloïdgehalte van het bloed een meer secundaire rol toekennen. Zoutwater inspuiting in het bloed zonder dorst, atropine-verlamming van den slokdarm met behoud van dorstgevoel zijn enkele der gronden waarop zijn meening berust.

K. TOLDT. *Ein vermutliche Herd von Menschen befallenden Milben bei Wien.* — Aansluitende aan de mededeelingen uit het Schlerengebied (*Wkl. Ws* 1921. no. 34), meldt TOLDT nu, dat bij Mödling ten Zuiden van Weenen een veld is, waarop een ander soort mijt voorkomt, die eveneens den mensch aanvalt en tot een kortdurenden jeukenden uitslag (8 dagen) leidt.

K. STAUNIG. *Ueber Röntgentherapie der Arthritis deformans.* — Bij 400 lijders aan arthritis deformans werd verbetering van de subjectieve klachten verkregen door bestraling met röntgenlicht. De gewenschte dozeering wordt opgegeven.

PAUL BECK. *Das partielle Wasserbett.* — Door riemen wordt een van onderen open, gummi reservoir waterdicht op de wond (meest decubitus) bevestigd en hierdoor b.v. gedurende 4 uur daags een stroom warm water gevoerd. Op zeer eenvoudige wijze kan men zoo de voordeelen van HEBRA's waterbed verkrijgen.

Therapeutische Richtlinien. A. F. HECHT. *Die Therapie des Erbrechens im Säuglingsalter.*

Wiener klinische Wochenschrift. 1925, No. 22.

Klinische Vorträge. FALTA. *Ueber den Zuckerwert der Kost.*

Originalabhandlungen. SCHÖNBAUER und WHITAKER *Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des vegetativen Nervensystems auf die Funktion experimentell geschädigter Nieren.* — Proefondervindelijk werd aangetoond, dat dieren zeer ingrijpende operaties aan de nier beter doorstaan, indien tegelijkertijd de sympathicusvezels van de art. renalis verwijderd worden. De hierdoor ontstane hyperaemie en hyperfunctie van de nier stelt het dier in staat om ook bij sterke vermindering van de hoeveelheid nierweefsel een voldoende reiniging van het bloed te onderhouden.

H. KRÖSL. *Syphilis und Reizung.* — Bij een patiënt vormt zich een papuleus syphillide aan schouder en onderarm, juist waar de huid voortdurend geprikkeld werd door de uitoefening van zijn beroep (houtsnijder), terwijl tevens een uitslag ontstond ter plaatse, waar een breukband de huid drukte.

N. GALATZER und A. SACHS. *Erfahrungen mit dem neuen Goldpräparat Triphal bei interner Tuberkulose.* — Intraveneuze inspuiting van triphal (een goudverbinding met thiobenzimidazol-carbonzure natrium) gaf in meer dan de helft van de behandelde gevallen verbetering, zich voornamelijk uitende in gewichtstoename, temperatuursdaling, vermindering van het sputum, verbeterde eetlust en vermindering van de ontstekingsverschijnselen in de longen.

EDMUND MALIWA. *Ueber den wirksamen Gasgehalt der neuen Schwefeltherme in Baden sowie der biochemischen Grundlagen der Schwefelbäder.* — Het zwavelgehalte van de Mariabron in Baden is 0.00639 gram H₂S per liter; dit geringe gehalte wordt voldoende geacht om de geneeskrachtige werking te verklaren.

D. ADLERSBERG und O. PORGES. *Basedowsche Krankheit.* — Tegen de meening van SCHLESINGER (*W. Kl. W. s.*, 1925, No. 19) wordt het gebruik van gynergeen (wijnsteenzure ergotamine) bij BASEDOW's ziekte aanbevolen.

A. HABERDA. *Plötzlicher Tod im Streit.* — Een bespreking van twee rapporten van deskundigen over de vraag, of een sterfgeval op te vatten was als dood door hartverlamming of dood door mishandeling (verworging).

Therapeutische Richtlinien. E. SCHUTZ. *Ulcus duodeni.*

J. ED. ST.

The Lancet. No. 5307, 16 Mei 1925.

W. WATSON CHEYNE. *Memorial lecture on LISTER's great achievement.*

J. B. LEATHES. *Croonian lectures on the rôle of fats in vital phenomena.*

H. F. HÖST. *Carbohydrate tolerance in pregnancy.* — Van 13 vrouwen, die in de eerste drie maanden der zwangerschap waren, hadden 8 na gebruik van 50 gr. glucose op de nuchtere maag glucosurie, van wie 7 bij een (max.) hyperglykaemie van meer dan 0.2 pCt. en van 26 vrouwen, die langer zwanger waren, 5 bij 15—0.20 pCt. en 5 bij minder dan 0.15 pCt. Schrijver maakt de gevolgtrekking, dat in de eerste zwangerschapsmaanden de glucosurie veroorzaakt wordt door hyperglykaemie, maar dat zij in de latere maanden van renalen oorsprong is.

O. ROSENHEIM and T. A. WEBSTER. *Rickets and cholesterol.* — Uit proeven op ratten blijkt, dat cholesterine door bestraling met ultra-violet licht anti-rachitische eigenschappen verkrijgt, de hoeveelheid van het anti-rachitische bestanddeel schijnt eenigszins toe te nemen bij verlengen van den bestralingstijd. Het smeltpunt van cholesterine wordt door bestraling verlaagd enz.

JAMES B. WHITFIELD. *Treatment of lupus by ionisation.* — Een uitgebreide lupus der beide billen, waarvan het randgedeelte zich voortzette op de dijen, werd na 3-jarige behandeling met ionisatie genezen tot een litteken, dat geen schrompeling of verdikking vertoont. De techniek wordt beschreven.

J. VAN NIEUKERK.

Dermatologische Wochenschrift. Bd. 80. No. 20. 1925.

F. M. PETER. *Ueber Chilblainlupus.* — Slot volgt.

H. MUEHLPFORDT. *Zur Ursache des Ekzems der Bäcker.* — MUEHLPFORDT's patiënt kreeg het eczeem slechts dan, wanneer een bepaald soort deeg verwerkt was, waaraan een geringe hoeveelheid hertschoornzout was toegevoegd, welk zout pyridine- en chinoline-verbindingen bevat. Daar het politoer der meubelmakers ook 1/2 pCt. pyridine bevat, zouden nu vele gevallen van meubelmakers-beroepscezem hiermee tevens verklaard zijn.

A. SCHOCH. *Familiärer Typus der Syphilis.* — De lupoide lues was zoowel bij de moeder als bij den zoon gelocaliseerd op de linker gezichtshelft. De differentiale diagnose met tuberculose was noch klinisch, noch microscopisch te maken. Met materiaal geënte Guineesche biggetjes bleven in leven. Ex juvantibus (jod. kal. en neosalvarsaan) bleek de diagnose lues juist. Bij den zoon is van de luetische aandoening een cancroïed uitgegaan, hetwelk ondanks exstirpatie en bestraling terugkwam.

P. G. RINSEMA.