

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1925, No. 23.

W. HEUBNER. *Zur Frage der Homöopathie.* — Beantwoording van BIER.

M. A. RAKUSIN. *Zur Frage der aktivierten Holzkohle als Universalgegengift.* — Verschillende stoffen worden in verschillende mate door geactiveerde houtskool geadsorbeerd. RAKUSIN geeft hieromtrent tabellen.

C. HIRSCH. *Ueber die chirurgische Behandlung der Kehlkopftuberkulose.* — Voor-
dracht.

F. WIRZ, *Jodiontophorese bei Aktinomykose.* — Twee hardnekkige gevallen, die zeer snel genazen na toepassing van jodiumiontophorese.

W. ROTHER. *Ueber Scheidendesinfektion.* — Ons doel moet zijn de normale flora te behouden en pathogene micro-organismen te doden. ROTHER heeft nu den invloed van verschillende ontsmettingsmiddelen op culturen van bac. vaginae en streptocokken vergeleken: het gunstigst werkten melkzuur en rivanol. Hij beveelt voor vaginale spoeling een 1:10000 rivanoloplossing aan, waaraan 0.3 pCt. melkzuur is toegevoegd. Over het eveneens bruikbare vagintus heeft hij geen ervaring.

H. BLENCKE. *Reizkörperbehandlung mit Mirion bei Arthritis deformans.* — BLENCKE bevestigt de gunstige ervaringen van FLIEGEL en STRAUSS met dit middel. Hij paste het bij 56 patiënten toe en nam bij 13 geen verbetering waar, bij 15 een geringe, bij 15 een aanmerkelijke en bij 13 een volkomen opheffing der subjectieve verschijnselen. Bij 14 werd een algemeene of plaatselijke reactie waargenomen. Men zorgde er voor intramusculair in te spuiten.

C. MIRTL. *Periodisch einsetzender ileusartiger Komplex bei hochgradiger Enteroptose.* — Een geval.

H. KOPF. *Hypophyse und RAYNAUDSche Krankheit.* — In 3 gevallen herstel of aanmerkelijke verbetering van de ziekte van RAYNAUD na inspuitingen van hypophysine en gebruik van hypophysistabletten.

W. STEINHÄUSER. *Reargonblasenstein.* — De steen werd ontdekt, nadat de patiënt wegens gonorrhoe een kuur met reagoninspuitingen had doorgemaakt. Het centrum bestond uit neergeslagen reagon, de schaal uit ozaalzuur, phosphorzuur, calcium en magnesium.

KLEINS. *Hat der Tuberkelbazillus eine Lebensgemeinschaft mit dem Menschen?* — KLEINS zet uiteen, dat veelal de tuberkelbacil in symbiose met den mensch leeft: wij moeten leeren met onze tuberculose te leven.

MÜLLER. *Vom Stillen.* — De moeilijkheden met het zoogen, vooral in de eerste week, zijn voor een deel gevolg van het te lange aanleggen van het kind. Volgens de waarnemingen en berekeningen van MÜLLER krijgt in de eerste week het kind reeds na 5—10 minuten zuigen voldoende voedsel.

G. CONRAD. *Zur Frage der „inneren Untersuchung“ durch die Hebamme.* — Ook CONRAD is van oordeel, dat dit onderzoek tot het uiterste moet worden beperkt. Waar onderzoek noodig is, acht hij echter vaginaal onderzoek met gummi handschoenen te verkiezen boven het door FELDMANN aanbevolen rectale onderzoek.

H. WESKOTT. *Der Einfluss der kombinierten Diät-Insulintherapie auf die durch Lungentuberkulose komplizierten Fälle von Diabetes mellitus.* — Insuline bezit de eigenschap bij tuberculose, in het bijzonder bij den exsudatieven vorm van longtuberculose, een haardreactie te kunnen uitlokken. WESKOTT beschrijft een geval, waarbij insuline op het longproces een ongunstigen invloed schijnt te hebben uitgeoefend. Hoewel dit volgens zijn ervaring een uitzondering is, zij men toch bij met tuberculose verwikkelden diabetes met insuline voorzichtig, beginne met en gebruike zoo klein mogelijke giften. Iederen diabeteslijder onderzoeke men zorgvuldig op tuberculose.

F. LANGE. *Die Behandlung der Knochenbrüche durch den praktischen Arzt auf Grund orthopädischer Erfahrungen dargestellt.* — Overzicht.

L. KREHL. *Einige Bemerkungen über die klinische Vorlesung.*

La Presse médicale. 1925, No. 46.

L. BINET et J. VERNE. *Évolution histo-physiologique de la veine à la suite de son oblitération expérimentale.* — Beschrijving en afbeeldingen van de dedifferentiatie, die men aan de verschillende elementen, die den aderswand samenstellen, waarneemt, als de ader haar functie heeft verloren.

A. BERGERON. *Réaction de VERNES, réaction de WASSERMANN et mesure de l'infection syphilitique.* — Uit een uitvoerige bespreking dezer methodes besluit BERGERON, dat beide reacties een groote diagnostische beteekenis bezitten, doch dat geen reactie voor ons een juiste maat voor de syphilitische besmetting biedt.

J. GALUP. *Recherches complémentaires sur le réflexe oculo-cardiaque dans les états respiratoires chroniques: applications à l'étude de la thérapeutique hydro-minérale de ces états.* — Uitvoerig wordt aangegeven, hoe deze reflex, met zwakken druk uitgevoerd (druk van 400 gram, 20 en 30 sec. lang), zich verhoudt bij asthma en verschillende andere ziekten der ademhalingsorganen. Bovendien werd de invloed van een kuur te Mont-Dore, onmiddellijk en na een jaar, nagegaan. Belangrijke gegevens voor diagnostiek en behandeling levert deze reflex niet op.

F. COSTE. *Équilibre acidobasique des milieux biologiques. I. Le pH: sa mesure.* — Overzicht.

P. SMIT.

Klinische Wochenschrift. 1925, No. 21.

LEON ASHER. *Die Drüseninnervation und ihre Bedeutung für die Funktion.*

PHILIPP STAHR JR. *Ueber das embryonale Herz.* — Een geëxplanteerd hart ontwikkelt in de vreemde omgeving nooit tot den typischen vorm, al worden de vier gedeelten in vorm en pulsatie wel herkenbaar. Ook de grootte wordt geregeld door de normale omgeving. Getransplanteerde hartcellen dringen het omgevende weefsel op zij, groeien zelfs ten koste daarvan en gaan het allerlaatste te gronde. Elke enkele hartcel afzonderlijk kan rhythmische samentrekkingen uitvoeren.

A. SCHWENKENBECKER. *Ueber die wirtschaftliche und doch sachgemäße Behandlung und Verhütung des Kropfes.* — Elke toediening van jodium brengt in de kropstreken een ernstig gevaar mede n.l. de jodiumhyperthyreoidie. Deze „Jodium-basedow” ontstaat gewoonlijk als de therapie een al te snelle verkleining van den krop veroorzaakt. Meestal is het wilde jodiumgebruik zonder voldoende contrôle de oorzaak. Toch blijft jodium het souvereine middel maar de gevaren moet men vermijden door zeer kleine giften voor te schrijven en individueel te doseeren, door niet langen tijd achter elkander het voor te schrijven en de patiënten gedurende de behandeling zorgvuldig te controleren. Zeer belangrijk is in de jeugd te behandelen, daar bij volwassenen veel meer refractaire gevallen voorkomen.

ERICH STERN. *Ueber die Wirkung künstlicher Sauerstoffatmung im Hochgebirge. (Vorläufige Mitteilung).* — Het meest gevoelig voor de zuurstofvermindering in het hooggebergte zijn het ademcentrum en het beenmerg. Inademen van zuurstof neemt meestal de bezwaren weg.

GERHARD DOMAGK. *Bei der Eklampsie auftretende Endothelveränderungen und ihre Bedeutung.* — Zwangerschap brengt een sterke belasting van de eiwitstoffwisseling mede. Door vermeerderde ontleding van eiwitproducten worden de endotheliën beschadigd: de veranderingen hierdoor kunnen in verschillende organen het sterkst op den voorgrond treden, vandaar het bonte beeld der eclampsie.

S. LOEWE und F. LANGE. — *Zur Pharmakologie der Silbergerbstoffpräparate.* — Reargon en Targesine zijn zeer weinig geïoniseerd, terwijl toch de werking van deze praeparaten op bacteriën zeer groot is.

FRANCESCO PAOLO TINOZZI. *Beitrag zum Studium der Colibacillen in den Verdauungswegen, besonders in Bezug auf die perniziose Anämie.* — Het gehalte aan te kweken bacteriën uit het maagsap is afhankelijk van de totale ende zoutzuuraciditeit ervan. Bij lijders aan pernicioze anaemie vindt men bij ver-

betering der klinische verschijnselen een vermindering van het aantal te kweken bacteriën uit maag- en darmsap.

H. CRAMER und H. KALKBRENNER. *Zur Therapie der Entzündungen mit Röntgenstrahlen.* — Alle ontstekingsprocessen ondervinden gunstigen invloed door Röntgenbestraling; voornl. wordt de pijn verminderd en het proces verkort. Acute processen luisteren beter dan chronische; het gunstigste oogenblik voor het instellen der behandeling is het allereerste begin.

EDGAR WÖHLISCH. *Zum Problem der Stabilität der Plasmaeiweißkörper.* — Opmerkingen bij vorig artikel.

LILIENTSTEIN. *Wie machen wir den Herzaktionsstrom hörbar?* — Polemie met H. REKDER.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

A. KLOPSTOCK. *Ueber die Verwendbarkeit des Cholesterins bei serologischen Reaktionen.*

E. RAJKA. *Weiterer Beitrag zur Pathogenese der Hyperaemie bei der Entzündung.*

KARL L. PESCH. *Periostaler Meningokokkenabsces ohne Genickstarre; Beteiligung des Kniegelenks.* — Casuistiek.

ERNST OPPENHEIMER. *Die Bromtherapie.* — Voor de praktijk.

WALTHER STOCKENIUS. *Ueber Metaplasie.* — Samenvattend overzicht.

Klinische Wochenschrift. 1925, No. 22.

EDMUND NOBEL und ADOLF F. HECHT. *Zur Tonsillenfrage.* — Beschouwing.

A. OSWALD. *Die Beziehungen zwischen Schilddrüse und Nervensystem.* — De schildklier staat als prikkelversterkingsmiddel of multiplicator tusschen de prikkelverwekkende centra en de zenuwuiteinden in, terwijl de hormonen der andere endocrine klieren zelf prikkels zijn. Het thyreoglobuline bevat alle eigenschappen van het schildklierhormoon, terwijl het thyroxine niet alle physiologische eigenschappen heeft. Thyroxine is een kunstmatig splitsingsproduct van het thyreoglobuline.

RICHARD PRIESEL und RICHARD WAGNER. *Ueber Hypoglykaemie.* — Waarschijnlijk is de doseering van de verschillende soorten insuline naar de krampverwekkende werking bij konijnen niet de goede maatstaf voor de werkzaamheid van een praeparaat.

HANS REITER und DYDO OGAWA. *Ueber Beziehungen zwischen Antigen aus sauresten Bakterien und dem Serum tuberkulöser Menschen.* — De bijna volkomen specificiteit van antigeen uit menselijke tuberkelbacillen volgens VON WASSERMANN bereid, die voornamelijk is gekenmerkt door de negatieve reactie ervan met normaal en luesserum, wordt niet bereikt met antigeen uit zuurvaste bacillen.

FERDINAND HOFF. *Ueber die Wasserstoffionenkonzentrationen im Sputum.* — Waarschijnlijk heeft de bepaling der waterstofionenconcentratie in sputum prognostische beteekenis bij longtuberculose.

BIRKHOLOZ. *Ueber die Tiefe der Wirkung epimukös aufgetragener örtlicher Betäubungsmittel, abgeleitet an Prüfungen in der Nase.* — Vergelijkende onderzoeken met cocaine, psicaine en tutocaine.

CAESAR HIRSCH. *Ueber die Stillung schwerer Nasenblutungen mit chirurgischer Diathermie.* — Deze behandeling is zeer aan te bevelen, daar er nog altijd gevallen van neusbloeding voorkomen, die op geen tot nu toe gebruikelijke manier te helpen zijn.

MAX POPPER. *Regulatieve Reiztherapie der Staphylokokkenkrankungen und der Gonorrhoe.* — Het gedeeltelijke mislukken der vaccintherapie berust op de onvolkomenheid der technisch bereide antigenen: daarom kan de onspecifieke prikkeltherapie werkzamer zijn in sommige gevallen dan de specifieke. Yatreen zou volgens KEINING alleen de geprikkelde cel tot grootere werkzaamheid aanzetten, maar de antilichamenproductie moet al in gang zijn. Vandaar de gunstige werking van staphylo- en gonoyatreen. Verdere beschouwingen over wijze van toediening en doseering.

ERNST FROMEMR. *Heilwert der Hirnluftfüllung (Lebensrettende Wirkung).* —

Bij hersenvliesontsteking is, zij het ook voorbijgaand, gunstig gevolg bekend van de luchtinblazing in het ruggemergkanaal. Hier wordt een geval beschreven van acute toxische hersenziekte met krampen, dat genas na inblazing van zeer veel lucht, zoodat lucht weer uit de naad terugstroomde.

K. DRESEL. *Zum Blutchemismus der pharmakologischen Vagusreizung.* — Polemie met VOLLMER.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

E. FRANK, E. HARTMANN und M. NATHMANN. *Ueber Glykogenanreicherung in der Leber hungernder Normaltiere unter dem Einflusse des Insulins.*

VAN DER REIS und GOSMANN. *Ueber die Verdauung pflanzlicher Zellwand- und Rohfaserstoffe beim Menschen.*

CAESAR HIRSCH. *Ueber den heutigen Stand der Lokalanästhesie im Gebiet des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege.* — Voor de praktijk.

ALEXANDER MUSZKAT. *Praxis der Inhalationstherapie.* — Beschouwing.

CLEMENS WIESE. *Ueber die starke Zunahme der Sterblichkeit der unehelich geborenen Säuglinge in Alt-Berlin und dessen Ursachen.* — Overzicht.

Klinische Wochenschrift. 1925, No. 23.

KARL WILMANN. *Lues, Paralyse, Tabes.* — Beschouwing. Slot volgt.

HANS EPPINGER, FR. KISCH und H. SCHWARZ. *Arbeit und Kreislauf.* — Niet kort weer te geven.

D. VAN DEN BERGH. *Diabete bronzé fruste.* — De meest kenmerkende verschijnselen van de ziektegevallen onder dezen naam zijn pigmentaties der slijmvliezen, wisselende hyperglykaemie, urobilinurie, leucopenie met relatieve lymphocytose en gelijkelijk histologisch beeld der gepigmenteerde deelen. Lever en milt behoeven niet voelbaar te zijn. Waarschijnlijk te herstellen endocrine stoornissen zijn in het spel.

FERDINAND BERTRAM. *Ueber Aktivierung des Insulins durch Eisweisskörper.* — Over de werking van eiwitlichamen, parenteraal toegevoegd, bij zuikerziekte is men het nog niet eens, maar op het beloop van de bloedsuikerkromme bij zuikerziekte hebben zij geen invloed. Spuit men een mengsel in van insulien en eiwitlichamen, dan verkrijgt men een duidelijke versterking en langeren duur der insulinerwerking.

W. BRACH. *Die Abhängigkeit des Juckens und der Hautveränderungen bei Lebererkrankungen von der alimentären Hämoklasie und ihre Beeinflussung durch sog. Peptone.* — Bij lijdens aan leverziekte kan men de haemoclasie na voedselopname doen verdwijnen door WITTE-pepton of leverpoeder te laten gebruiken evenals bij prurigo vulgaris: tegelijkertijd verdwijnen ook het jeuken en de prurigineuze huidveranderingen. De prurigo vulgaris is geen ziekte-eenheid, maar op een lijn te stellen met jeuk en urticaria.

HEINRICH FISCHER. *Beiträge zur Beurteilung der refraktometrischen Magensaftuntersuchung.* — De refractometrische onderzoeking van de maagsapafscheiding heeft geen nieuwe gezichtspunten geopend.

EVENING und ROTTMANN. *Studien über die MEINICKESche Frühungsreaktion (M.-T.-R.³).* — Deze reactie is een bruikbaar en technisch gemakkelijk diagnosticum voor syphilis. Neemt men de op de troebeling, die in 98 percent zekere resultaten geeft, volgende uitvlokking als waardevolle reactie erbij, dan moet men met een toename van 3.3 pCt. onspecifieke reacties rekenen.

P. GYÖRGY. *Therapeutische Versuche mit bestrahlter Milch bei der Rachitis.* — Door bestraling van melk krijgt melk eigenschappen, die zich uiten in een gunstigen invloed op de stofwisselingsstoornissen bij rachitis.

KARL JUNKMANN und WILHELM STROSS. *Pharmakologische Untersuchungen am überlebenden Ligamentum rotundum Uteri.* — Bij het konijn en de kat bezit het ligamentum rotundum de eigenschap zich sterk te kunnen verkorten, een uitgesproken rhythmiek en een gevoeligheid voor verschillende giften, die overeenkomt met die der baarmoeder.

KARL VORLAENDER. *Heilungsversuche am experimentellen Krebs. I Vorläufige Mitteilung.* — Met een mengsel van choline, adrenaline, trypaanblauw en ceri-

umchloride werd ongelooflijk gevolg verkregen bij proefondervindelijk verwekte muizenkankergezwellen. Het onderzoek is nog in vollen gang.

G. PFEFFER. *Die klinische Verwendbarkeit der Formol-Gelatinierung im Blut.* — Opmerking bij vorig artikel.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

H. PFEIFFER, F. STANDENATH und R. WERBER. *Ueber den Peptidasenhaushalt unserer Versuchstiere und des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung des Epileptikers.*

H. HANDORSKY und CHAO CHI FONG. *Die Bedeutung der Calcium-Ionen für die Erregbarkeit der Nerven.*

WALTER NIDEREKE. *Vaginale oder rectale Untersuchung in der Geburtshilfe.* — Voor de praktijk.

R. FROMHERZ. *Neuere Forschungen zur Physiologie der Hypophyse.* — Samenvattend overzicht.

J. VAN TILBURG.

The Lancet. No. 5309, 30 Mei 1925.

RICHARD LAKE. *A clinical lecture on blood pressure: its relation to the treatment and diagnosis of vertigo and tinnitus.*

GRACE STAPLETON. *Late rickets and osteomalacia in Delhi. An analysis of seventy-three cases.* — Een onderzoek naar de levensomstandigheden van 20 meisjes van 10—20 jaar met rachitis tarda, welke op 8—15 jarigen leeftijd was begonnen, van 47 patiënten met osteomalacie en van 6 meisjes met een overgangsvorm tusschen beide ziekten, leerde, dat het meerendeel der gevallen veroorzaakt werd door gemis aan zonlicht en lichaamsbeweging. In het beloop der osteomalacie kwam vaak tetanie voor.

WM. J. POPE and R. T. M. HAINES. *Colloidal kaolin: I. Some properties of colloidal kaolin.* JOHN W. H. EYRE. *II. The absorption of toxin by kaolin.* — I. Kolloid kaoline geeft met positief geladen kolloide oplossingen dadelijk uitvloeking, met negatieve van arseensulfide, goud, enz. geen verandering, het is daarom een negatief kolloid. WALKER vond, dat kaoline uit een suspensie van cholera-vibriënen het toxine geheel verwijdert; dit toxine gedraagt zich dus als de positieve kolloïden. II. Diphtherietoxine geschud met een kaoline-agar-mengsel of met kaoline alleen wordt niet noemenswaard geadsorbeerd; gefiltreerd door deze stoffen, door het eerste zwak, door kaoline alleen sterker; het toxine van dysenteriebacillen wordt door het mengsel en door kaoline alleen gelijk geadsorbeerd.

R. D. LAWRENCE. *Local insulin reactions.*

FRANCIS E. SHIPWAY. *Acetylene, ethylene, propylene.* — Acetyleen gaf bij 15 operaties voldoende verdooving, maar het onderzoek over dit gas werd opgegeven, omdat de reuk, de zuivering van aceton en het veroorzaken van speekselvloed belangrijke bezwaren waren en bovendien met aethyleen bij 68 operaties, waarvan 10 voor hernia en 5 borstampaties, gunstiger uitkomsten werden verkregen. De voor- en nadeelen der aethyleenverdooving en eenige tegenaanwijzingen worden genoemd. Propyleen werd nog niet voldoende onderzocht.

The Lancet. No. 5310, 6 Juni 1925.

LEONARD ROGERS. *Relationship between pneumonia incidence and climate in India.*

F. G. CHANDLER. *Skin tests, asthma and idiosyncrasy.* — Beschrijving van de techniek der huidreacties en enkele bereidingswijzen van proteïne-extracten; voor een reactie met een mengsel van verschillende proteïnen mag de oplossing niet te slap zijn; proteïnen opgelost in $\frac{1}{4}$ pCt. carbol blijven ten minste 2 jaar „actief”; vele van deze stoffen behouden na koken hun werking. Schrijver heeft vele patiënten trachten te desensibiliseeren en hoewel sommigen zich beter voelden, lukte het niet de huidreactie te doen verdwijnen.

S. WYARD. *Cancer of the breast. An attempt to estimate the duration of life after operation.* — Van 560 patiënten, gedurende 1905 t/m 1914 geopereerd voor borstkanker, konden in 1924 van 420 datum en oorzaak van overlijden worden opge-

spoord en leefden toen nog 45 (van de overledenen hadden 36 nog 10 jaar of langer na de operatie geleefd). De levensduur na operatie werd niet beïnvloed door den leeftijd en was gemiddeld 4.6 jaar of eigenlijk ongeveer 5 jaar, waar 45 patiënten nog leefden en 41 aan andere ziekten waren gestorven.

J. VAN NIEUKERK.

Wiener Klinische Wochenschrift. 1925, No. 23.

L. FISCHER. *Die Anfänge der Gynaecologie in Wien.* — WILHELM JOS. SCHMITT was de eerste hoogleeraar in de vrouwenziekten aan de universiteit in Weenen. Hij gaf van 1798—1824 onderwijs.

L. ADLER. *Ueber die Zweckmäßigkeit des Namens Metropathie.* — De naam metropathie wordt dikwijls gegeven aan met bloeding gepaard gaande afwijkingen in de vrouwelijke geslachtsdeelen waarbij geen duidelijk objectief waarneembare stoornissen zijn aan te toonen. ADLER keurt dit af, omdat dit naamverwarrend werkt en onnoodig op baarmoederlijden wijst, als soms algemeen of endocrien lijden bestaat.

ROBERT BAUER. *Fistula cervicovaginalis laqueatica.* — Een geval, waar waarschijnlijk bij het opwekken van miskraam een gang geboord is van het achterste scheidewegewelf naar het bovendeel van het halskanaal en waarbij later een normale geboorte langs dezen kunstmatigen weg volgde met achterlaten van een fistel.

JOS FABRICIUS. *Beitrag zur Kasuistik der Douglashernien.* — Vijf gevallen, waarbij darmlissen van de fossa Douglasi af gezakt waren in het perivaginale bindweefsel en als uitpuilende breuk tusschen vagina en rectum te voorschijn kwamen.

JOSEF HALBAN und ROBERT KÖHLER. *Ueber das Auftreten von Blutungen nach Eingriffen am Follikelapparate.* — Een studie over de schijnbaar menstruale bloeding, die ontstaat, als men een rijpen follikel aansnijdt, in vergelijking met de bloeding, die voorkomt na verwijdering van een corpus luteum.

HANS HEIDLER. *Wangeninfiltrate der Haut Neugeborener — eine typische Zangen-druckfolge.* — Vele gevallen, vroeger beschreven als plaatselijke sclerodermie van zuigelingen, moeten opgevat worden als infiltraten van de huid en het vetweefsel tengevolge van traumatische beschadiging. Hieronder zijn velen waarbij het trauma werd toegebracht door de tangextractie, in het bijzonder door den voorliggenden lepel.

R. HOFSTÄTTER. *Spontane und artifizielle Aenderungen des Menstruationsrhythmus.* — Getwijfeld wordt aan den onverstoorbaren samenhang tusschen ovulatie en menstruatie. Naast de zeer regelmatige spontane ovulatie kan een geprovoceerde ovulatie bestaan; komen hierbij nog andere zenuwvloed, dan volgt op de geprovoceerde ovulatie een menstruatie, terwijl de volgende bloedingen zich dan regelmatig aansluiten aan die eerste vervoegde.

H. KAMNIKER und A. L. SCHMID. *Studien über den weiblichen Fluor und über dessen Beeinflussung durch verschiedene Spülmittel.* — Een onderzoek van de flora der vagina, de subjectieve klachten en de wijzigingen, die deze ondergaan bij verschillende spoelingen of behandeling met poeder. De beste gevolgen werden verkregen met adstringentia en met melkzuur.

HEINRICH KATZ. *Der Abstand zwischen vorderem oberen Darmbeinstachel und groszem Rollhügel als Maszstab in der Geburtsprognose des rachitisch-platten Beckens.* — Indien de afstand tusschen spina ant. sup en trochanter major 11—12 cM. bedraagt, bestaat bijna nooit een belemmering voor de geboorte; bij plat rachitisch bekken kan die afstand verminderen tot 10 cM. en, zooals uit de tabellen blijkt, is dan een normale bevalling een zeer groote zeldzaamheid.

H. KATZ und A. SZENES. *Ueber die Leistungsfähigkeit der Mikro-ABDERHALDEN-Reaktion in der Diagnostik der Bauchhöhlenschwangerschaft.* — In 20 zekere gevallen was de reactie 19 maal positief, in 28 twijfelachtige gevallen, die later bleken niet zwanger te zijn, was de reactie 25 maal negatief, zoodat inderdaad aan deze onderzoeking waarde gehecht moet worden.

H. KEITLER. *Beitrag zur operativen Behandlung der entzündlichen Beckenerkrankungen.* — Aanbeveling om de baarmoeder vaginaal te verwijderen bij ongunstig verloopende resp. recidiveerende ontstekingen van het kleine bekken, indiene gewone rust-warmte-behandeling geen genezing brengt.

FRITZ KERNMAUNER. *Zur Bewertung und Behandlung der Colpitis granularis.* — Door onderhuidsche inspuiting van pituisan werd in vele gevallen genezing verkregen zonder eenige plaatselijke behandeling.

L. KRAUL und L. BODNAR. *Untersuchungen über Säure- und Alkaliwerte des Genitalsekretes.* — Het alkaligehalte van vaginaal secret wisselt van 0.04—0.8 pCt. NaOH., het cervicaalslijm van 0.1—0.5 pCt.. Door scheidobacteriën kan het cervicale slijm, onafhankelijk van het glycogeeengehalte der epithelia, zuur worden, terwijl men in vitro in staat is zuur vaginaal slijm door scheidobacteriën in alcalische reactie om te zetten.

H. PEHAM. *Zur Bedeutung von Uterusnarben für Schwangerschaft und Geburt.* — Beschrijving van een doodelijk aflopend geval van baarmoederscheur tijdens de geboorte, door verdunning van den spierwand door voorafgaande wigvormige uitsnijding van de tuba. Een waarschuwing om toch vooral de vorming van een litteken in den wand van de baarmoeder niet te licht te tellen.

H. PETERS. *Zur Frage des Verschlusses der Einbruchspforte bei der Nidation des menschlichen Eies.* — Een kort uittreksel van het artikel over hetzelfde onderwerp, dat in het *Archiv f. Gynaek.* (Bd. 124, Hft 2) verschenen is.

LUDWIG PISKACEK. *Zur Stillung atonischer Postpartumblutungen durch äussere Handgriffe.* — Door langs den voorsten buikwand diep in het kleine bekken te gaan kan een hand het onderdeel van de baarmoeder omvatten en naar boven halen. De zoo gefixeerde baarmoeder wordt dan door de 2de hand van boven af tegen de eerste hand gedrukt. Indien de greep goed gelukt, worden de beide aetiaae uterinae omvat en mede dicht gedrukt.

OTTO PRITZI. *Zur Aussprache über die Zweckmässigkeit der Zange.* — Een vergelijkend overzicht van de sterfte van moeder en kind in de verschillende klinieken na tangextractie; gewaarschuwd wordt voor een te ver gevoerde aanwijzing tot beëindiging van de geboorte met behulp van de forceps, vooral buiten de verloskundige klinieken.

JOSEF SCHIFFMANN und LEO SZAMEK. *Zur Kenntnis und Genese entzündlich-eitriger Veränderungen der Niere nach Uterus-Scheidenfisteln.* — De etterige nierontsteking bij fistels na radicale verwijdering van kanker der baarmoeder ontstaat het zeldzaamst door ascendeerende ontsteking langs het lumen van den ureter; veelvuldiger wordt de besmetting veroorzaakt langs lymphogenen weg submucosus of periuretraal al of niet gepaard aan haematogene infectie. Nephrectomie is in vele gevallen noodzakelijk en, tijds uitgeoerd, levensreddend.

ALFRED SZENES. *Der Kalkgehalt des Fluors und der Lochien.* — Het gehalte aan kalk van de afscheiding na de geboorte en bij fluor albus is bijna dubbel zoo groot als het kalkgehalte van het bloed.

HANS THALER. *Zur Abhängigkeit des Scheideninhaltes von Ovarialfunktion und Schwangerschaft und über Möglichkeiten seiner pharmakologischen Beeinflussung.* — Door onderzoek van de bacteriesoorten in het scheidelijm worden graden van reinheid gesteld. De min of meer normale flora is afhankelijk van de eierstok functie en van zwangerschap, de normale zuurvormende staafjes treden hierbij op den voorgrond. Bij zwangeren kan men door irrigatie met melkzuur den fluor van de vagina snel verbeteren, bij niet zwangeren gelukt dit veel beter met salicylzuur ($\frac{3}{4}$ per duizend).

W. WEIBEL. *Lassen sich die Behandlungserfolge beim Carcinoma Colli uteri verbessern?* — Beginnende gevallen opereere men vaginaal, alle ernstige gevallen volgens de methode van WERTHEIM; om de aanwijzing tot radicale ontleding van het bekken nog uit te breiden is geen reden, zeker niet langs vaginalen weg. Verbetering is mogelijk nog te verkrijgen door stralen-behandeling.

P. WERNER. *Zur Therapie des Fluor.* — Algemeen wordt toegestemd, dat de algemeene constitutie van grooten invloed is op het ontstaan van fluor albus (niet gonorrhoeisch), maar bij de behandeling wordt hiermede niet bijzonder rekening gehouden. WERNER heeft getracht fluor te genezen door gestelwijziging n.l. bestraling van de hypophysis en zonder plaatselijke behandeling. In 45 pCt. der gevallen kreeg hij verbetering.

Dermatologische Wochenschrift. No. 21, (Bd. 80), 1925.

TH. PREININGER. *Ueber die diagnostische Bedeutung der Senkungsgeschwindigkeit roter Blutkörperchen in der Dermatologie.* — Deze reactie blijkt voor de dermatologie van geen waarde te zijn.

K. SKUTEZKY. *Beitrag zur Behandlung der Psoriasis.* — Met tusschenruimten van 4—6 dagen werd, opklimmend van 0.025 tot 0.1 gr., in het geheel 0.425 gr. triphal, bij een elfjarige, op alle denkbare wijzen reeds 5 jaren vruchteloos behandelde lijderes aan psoriasis, in de ader gespoten. Deze zeer zindelijke behandelingswijze gaf geen stoornissen. Na 6 weken was de aandoening spoorloos verdwenen. Opwekking om dit goudpraeparaat op bredere basis bij psoriasis te bestudeeren.

G. B. DE STEFANI. *Die Bismutpräparate in der Behandlung der Syphilis.* — Bismuth is beslist een nieuw antiluetisch middel, staat in het algemeen in werking bij arsenobenzol en kwik ten achter, maar is van groote waarde bij de behandeling van zoogenaamde, aan arsenicum en kwik weerstandbiedende gevallen.

F. M. PETER. *Ueber Chilblainlupus.* — (Slot). Nadat er op is gewezen, dat de door HUTCHINSON het eerst beschreven „chilblain-lupus” en BESNIER-TENNESON'S „Lupus pernio” in de latere literatuur ten onrechte niet meer scherp worden gescheiden, volgt het verslag van een geval van chilblain-lupus met nauwkeurig histologisch onderzoek. Hoewel het bewijs ook nu niet is geleverd, neemt PETER op goede gronden aan, dat de als primaire stoornis opgevatte veranderingen aan de vaten, aan den tuberkelbacil of zijn toxinen ten laste komt. Als behandeling beveelt schrijver inspuitingen van „alttuberculin” aan, gepaard aan het uitwendig gebruik van 10 pCt. ichthyolspiritus.

Dermatologische Wochenschrift. No. 22, (Bd. 80), 1925.

O. GRÜTZ. *Beitrag zu den seltenen Mykosen. Ueber eine durch Akremonium verursachte Pilzkrankung.* — In aansluiting aan een voor het trekken van een kies noodig geachte infiltratie-anaesthesie, ontstond langzaam een plankharde, niet pijnlijke zwelling der onderkaakstreek (zonder opzetting van lymphklieren), welke tenslotte verweekte. Als oorzaak werd een schimmel gevonden (beschrijving der eigenschappen in kweek), welke na veel moeilijkheden bij het geslacht akremonium werd ondergebracht.

J. SELLEI. *Ueber das Jucken.* — Op grond van klinische ervaring en proefondervindelijk onderzoek, besluit de schrijver, dat het op uitwendige oorzaken berustende jeukgevoel ontstaat door prikkeling der uiteinden der sensibele zenuwen, terwijl daarentegen de op inwendige oorzaken berustende jeuk een gevolg is van de prikkeling der zenuwuiteinden der haarvaten der huid.

M. KÄRCHER. *Die Behandlung der Gonorrhoe mit Targesin.* — Targesine bezit een krachtige werking op bacteriën. Het is onschadelijk, onpijnlijk, slaat geen eiwit neer, en werkt door zijn tannine-component adstringeerd. Gaf de lijder zich van een 1—3 pCt. oplossing 3—6 maal daags, 15—25 minuten durende inspuitingen in het vóorkanaal, dan genas de enkelvoudige druiper aldaar in 2—4 weken (21 gevallen). In 15 dezer gevallen werd de behandeling met arthigoninspuitingen besloten. Het is niet duidelijk, of deze laatste nog therapeutisch dan wel als provocatie bedoeld waren. In verwikkelde en sleepende gevallen eveneens gunstige ervaringen.

P. G. RINSEMA.