

De syphilitische bursitis kan den vorm van een eenvoudig hygroma, vooral tijdens de secundaire luesperiode, vertoonen of als een gummeuse, ulcerouse, dan wel fungueuse vorm tijdens het tertiaire stadium zich voordoen. Karakteristiek voor dezen vorm van bursitis zouden zijn: het bestaan van een syphilitische infectie, een chronisch beloop, de afwezigheid van belangrijke pijnlijkheid of functiestoornis, symmetrie van de aandoening en de promptte werking van een anti-luetische kuur.

De cystes zijn voornamelijk van traumatischen oorsprong, meestal bij mannen, die zwaren lichamelijken arbeid verrichten moeten. Ook herhaaldelijke geringe traumata kunnen tot een cyste voeren. Ook schijnt „rheuma” van het heupgewricht bij de vorming een groote rol te spelen. De verschijnselen zijn, naast een weeke vaak fluctueerende zwelling in de liesstreek (in het bovenste deel van SCARPA'S driehoek, onmiddellijk onder het midden van het ligament van POUPART), die langzaam aan ontstaan is, vage pijnen en lichte functiestoornissen van het heupgewricht; pijnen in de knie zijn niet zeldzaam. Het been wordt meestal in lichten flexie-, abductie- en buitenrotatiestand gefixeerd gehouden; de pijnen worden verergerd door beweging in andere richtingen.

De eenige rationeele behandeling van deze cystes is de volledige exstirpatie daarvan. De gevolgde operatietechniek wordt beschreven.

TH. SCHEFFELAAR KLOTS.

Verscheuring van pezen. — Meestal komen die tot stand door een soms zeer gering trauma, zoodat men dan spreekt van een spontane verscheuring; dit is bijv. het geval bij de pees van den langen kop van den musculus biceps brachii. Bekend is hun voorkomen verder aan de Achillespees (boksers), bij den quadriceps femoris, den rectus abdominis; onder den naam „Trommlerlähmung” is bij onze oostelijke bureu bekend een secundaire verscheuring van de pees van den musculus extensor pollicis longus aan den distalen rand van het lig. carpi transv. dorsale, die mogelijk wordt gemaakt door een chronische vernielende ontsteking.

E. L. GILCREEST (*The J. o. the Am. Med. Ass.* 13 Juni 1925, bldz. 1819) beschrijft een geval van verscheuring van de pees van den langen kop van den biceps brachii en de verschillende daarbij in toepassing gebrachte operatiemethodes. Ref. heeft verscheidene van deze gevallen gezien eenigen tijd, soms eenige jaren, na de verscheuring van deze pees; de menschen waren niet behandeld, waarschijnlijk omdat de diagnose niet juist was gesteld; maar de andere heel gebleven helft van de biceps deed het werk zóó voortreffelijk, dat alle werkzaamheden konden worden verricht.

L. HAVINGA.

Periarterieele sympathectomie. — De operatie van LERICHE is langzamerhand zóó vaak verricht, dat de tijd schijnt aangebroken voor statistische bewerking van de verkregen uitkomsten. BERTRAM BERNHEIM (*Surgery, Gynaecology and Obstetrics*, Juni 1925, bldz. 828, 35) deelt zijn ervaringen mede, opgedaan bij het behandelen van de endarteriitis obliterans, zoowel die van