

Chatillon 80 kinderen geboren. Van 54 hadden de vader en de moeder lepra, van 26 had de moeder lepra, vader onbekend. Tot 1923 waren 23 kinderen gestorven, waarvan 17 jonger dan 1 jaar; *in 1923 waren 9 kinderen als lepreus bekend*. Behalve de hooge sterfte, was dus in 25 jaar ruim 10 pCt. der kinderen weer met lepra besmet. Volgens WOLFF moeten dan ook de kinderen, die in leproserieën geboren worden, zoo spoedig mogelijk na de geboorte worden opgenomen en opgevoed in een bijzonder kindertehuis. Wat Ned. Oost-Indië betreft schreef VAN LOGHEM destijds in Vraagstukken der Indische Hygiëne aangaande dit onderwerp, dat aan lepra-asyls groote bezwaren verbonden zijn. Het is wreed om menschen, die ondanks hun sleepende ziekte dikwijls nog in de kracht van hun leven zijn, of subjectief volkomen gezonde kinderen uit de samenleving te verwijderen door hen te plaatsen in een asyl. Het lepradorp komt hierin tegemoet, in streken waar zeer veel zieken zijn en waar de bevolking de besmettelijkheid der ziekte erkent. Deze bijzondere omstandigheden gelden voor de Bataklanden op Sumatra, waar in 3 dorpen in 1919 te zamen 770 patiënten woonden. Deze dorpen zonderen dus een groot aantal gevallen af, zoodat hun bestaan als een hygiënische maatregel van hooge orde moet worden beschouwd. In een der dorpen worden de geslachten gescheiden gehouden, in het andere laat men het huwelijk toe, zoodat de toestand hier meer op den normale gelijkjt. Het groote bezwaar hiervan echter is het geboren worden van kinderen. In 1920 was er nog geen gelegenheid deze kinderen onmiddellijk na de geboorte buiten de lepreuse omgeving op te voeden.

POKKENCIJFERS UIT DE BESCHAAFDE WERELD. — In 1924 is in eenige landen een aanmerkelijke stijging van het aantal gevallen van pokken voorgekomen. Zoo had in Engeland de epidemie, die terstond na den oorlog langzaam ontstond, in 1924 met 3765 gevallen haar hoogtepunt nog niet bereikt. In 1925 werden tot eind October reeds 4249 gevallen aangemeld. De sterfte bedroeg in 1918—1919 10.4 pCt., in 1924 slechts 0.3 pCt.. Ook Spanje heeft een vermeerdering der pokken te boeken; in 1923 kwamen 529 gevallen en 1924 1214 voor, in de eerste helft van 1925 669. In Rusland en Polen bleef de ziekte binnen matige grenzen, in Duitschland werden in 1924 16 gevallen bekend, in Oostenrijk geen enkel. In Azië waren de pokken slechts in weinig streken talrijker dan anders. In Hongkong heerschte van 1923—1924 een ernstige epidemie, die met 413 sterfgevallen in Januari 1924 haar hoogtepunt bereikte; in het geheel stierven 1898 personen aan pokken. In Amerika zijn de pokken niet alleen sterk toegenomen, maar ook in verschillende plaatsen veel kwaadaardiger geworden. Van 47 bondstaten is de sterfte van 0.50 in 1923 tot 1.76 pCt. in 1924 gestegen. Dit wordt in hoofdzaak door de epidemieën van twee steden, n.l. Detroit en Minneapolis, veroorzaakt. *In Detroit kwamen op 795 ziektegevallen 105 sterfgevallen voor, in Minneapolis op 1260 ziektegevallen 350 sterfgevallen* (F. PRINZING, *Reichsgesundheitsblatt*, Jahrg. 1, no. 4).

NEEMT DE STERFTE AAN KANKER AF? — De vraag naar het voorkomen van kanker en of deze ziekte toeneemt, is niet alleen moeilijk te beantwoorden, omdat gegevens van vroegere jaren ontbreken, maar ook, omdat de diagnose dikwijls niet gesteld wordt. Volgens een onderzoek van LUBARSCH werden in 1920 en 1921 in de Deutsche ziekenhuizen 13 pCt. kankergevallen minder herkend, dan in werkelijkheid voorkwamen. De kankercijfers van hospitalen zijn zeer ongeschikt voor het vaststellen van het voorkomen der ziekte, daar deze cijfers van veel verschillende factoren afhankelijk zijn, zooals de leeftijd van het ziekenhuis-materiaal enz.. In ieder land zijn streken, waar de kanker meer voorkomt, dan in andere. In Duitschland geldt het Beiersche deel, dat aan Zwitserland grenst, voor rijker aan kanker het noorden. In het oude Oostenrijk kwamen in de Alpenstreken driemaal meer gevallen van kanker voor, dan in de Karpathen. Het meer ontwikkelde noorden van Italië heeft een hooger sterftecijfer, dan het minder ontwikkelde zuiden. Een dergelijk onderscheid vindt men ook in de steden en het platteland. In groote steden is gewoonlijk de kankersterfte grooter, dan in