

van de angstneurose enz. duidelijk aantoon, en daarmee aan de behandeling een weg wijst. Er rest mij nu nog te verklaren, dat de vertaling zich aangenaam laat lezen. Zij is met veel zorg en toewijding door de bewerkers verricht.

A. VAN DER CHIJS.

S. L. BRUG, *Die parasitologische Diagnostik der menschlichen Fäzes*. In het Hoogduitsch vertaald en opnieuw uitgegeven door G. H. KLÖVERKORN, 8°. 64 bldz. en 43 teekeningen op 8 platen. Leipzig, J. A. BARTH, 1926. Prijs: .

In de inleiding tot de Hoogduitsche vertaling van BRUG's bekend werkje zegt de bewerker, dat zulk een korte, voor de praktijk in de klinieken geschikte, handleiding bij het onderzoek van de protozoën en helminthen, die in de menschelijke ontlasting kunnen voorkomen, in het Duitsch niet bestaat en dat hij het vertaald heeft, omdat behoefte er aan bestond. Deze uitspraak is op zich zelf reeds een zeer goede aanbeveling, die het boekje overigens bij ons, die het reeds in zijn oorspronkelijken vorm zoo goed kennen, zoowel hier als in Indië, volstrekt niet noodig heeft. Het is dan ook minder ter aankondiging van het boekje zelf, als van het goede onthaal, dat het ook in het buitenland geniet, dat deze uitgave hier wordt vermeld.

SWELLENGREBEL.

M. LUCIEN, J. PARISOT et G. RICHARD, *Traité d'Endocrinologie, La Thyroïde*. Parijs. GASTON DOIN, 1925. Prijs: 70 frs.

Dit boek is de eerste van een reeks verhandelingen, welke de schrijvers zich voorstellen te houden over de klieren met inwendige afscheiding. Het boek, dat 626 bladzijden telt, is vlot en prettig in de eerste persoon meervoud geschreven. Het bevat alles, wat van de schildklier en haar werking proefondervindelijk, normaal en pathologisch bekend is en eveneens haar verhouding zoowel tot het geheele organisme als tot deelen ervan en wel in het bijzonder de andere endocrine klieren. Aan het eind van elk hoofdstuk vindt men uitgebreide literatuuropgaven, samen meer dan 40 bladzijden. Het myxoedeem en de ziekte van BASEDOW worden na elkaar beschreven als de gevolgen van de verkeerde werking van de schildklier. Uitvoerig worden voornamelijk ook de gedeeltelijke, verzwakte of monosymptomatische en de samengestelde vormen nagegaan. Behalve het bekende drietal der klassieke BASEDOW-verschijnselen, wordt nog een vierde, zeer belangrijk genoemd en vele secundaire, waardoor de afwijkende vormen beter erkend kunnen worden. Aan de bepaling van het „metabolisme basal" wordt een zeer groote waarde gehecht. Wat de behandeling betreft, die met orgaanpraeparaten wordt als de belangrijkste beschouwd, waarbij aan het droge extract, door den mond toegediend, de beste werking wordt toegekend, veel algemeener dan van een der jodiumproducten. Aangezien langdurige toediening, zelfs van kleine hoeveelheden van het schildklierextract groote uitwerking kan hebben op het organisme zoowel ten goede als ten kwade, is nauwkeurig nagaan der lijders