

ongunstige maatschappelijke positie van de vrouw hiervan de oorzaak. Hierop wijst ook de Hamburgsche statistiek; vóór den oorlog lag de top van zelfmoord bij vrouwen in het 20ste tot 25ste levensjaar, gedurende den oorlog was het verhoudingscijfer van 70-jarige vrouwen en na den oorlog van 80-jarige vrouwen bijna het dubbele. In het algemeen is slechts in 10 tot 30 pCt. der gevallen de zelfmoordenaar zielsziek. De verschijnselen van uitputting op nerveus gebied komen vooral bij vrouwen voor, maar gaan bijna nooit over in eigenlijke zielsziekte. WEICHWRODT heeft opgemerkt, dat de zelfmoord bij vrouwen toeneemt bij meer deelnemen der vrouwen aan het beroepsleven. Van verschillende kanten is ook de verminderde godsdienstigheid als oorzaak voor den stijgenden zelfmoord aangewezen. In de noordelijke landen, Zweden en Denemarken, en in Hamburg en Zwitserland heeft men een top van het aantal zelfmoordgevallen in het voorjaar en den herfst vastgesteld. In de meer zuidelijke landen, Frankrijk, Italië en Saksen is de voorjaars-top overheerschend (M. GRÜNEWALD, *Reichsgesundheitsblatt*, Jahrg. 1, No. 11).

AMERIKAANSCHER STERFTESTATISTIEK AAN DIPHTHERIE. — Het derde rapport van de jaarlijksche sterfte aan diphtherie in eenige Amerikaansche steden met een bevolking van meer dan 100000 inwoners is verschenen. Van enkele der voornaamste steden volgt een tabel van de sterftcijfers van verschillende jaren.

per 100000 inw.	1920-	1915-	1910-	1905-	1900-	1895-	1890-	
1925	1924	1919	1914	1909	1904	1899	1894	
Boston . . . . .	12.7	20.2	26.3	20.0	26.2	53.7	83.9	112.3
Pittsburg . . . .	9.2	20.1	22.3	29.3	20.4	36.9	32.9	86.4
New-York . . . .	10.8	14.0	21.8	28.0	40.0	58.0	85.8	134.4
Philadelphia . .	15.9	16.7	22.7	24.6	34.1	50.0	100.6	119.4
Baltimore . . . .	6.0	11.4	13.5	14.2	16.1	33.0	68.1	70.0
Washington . .	7.4	10.5	11.9	6.9	11.2	23.5	50.9	77.9
Chicago . . . . .	8.0	17.5	31.2	37.9	27.0	33.9	69.7	117.3
St.-Louis . . . .	11.2	16.1	24.4	23.7	19.4	43.3	62.9	67.7
New-Orleans . .	6.8	6.5	11.6	19.6	10.2	11.5	17.1	51.3
San-Francisco .	6.6	23.0	17.0	9.2	15.3	35.3	27.9	82.8

Baltimore, Cincinnati, New-York en Philadelphia vertoonen in de 5-jarige tijdperken een voortdurende afnemning van de sterfte aan diphtherie. De totale diphtheriesterfte (van 70 steden) bedroeg op 100000 inwoners in 1923 13.12, in 1924 11.05 en in 1925 9.74 (*Journ. Amer. Med. Ass.* Vol. 86, No. 14).

HET VOORKOMEN VAN KRANKZINNIGHEID. — Het juiste inzicht over de oorzaak van geestesstoornissen heeft men slechts langzaam verworven. Men weet thans, dat de oorzaak van eenige der meest voorkomende vormen van krankzinnigheid geheel onbekend is. Is echter de oorzaak wel bekend, dan doet de vraag zich voor, of deze te vermijden is of niet. Beperkt men zich tot de meer nauwkeurig onderzochte oorzaken, dan moet de vraag, zonder meer, bevestigd worden. KRAEPELIN meent, dat hij binnen afzienbaren tijd het aantal krankzinnigen tot  $\frac{1}{3}$  zou kunnen verminderen, indien hij het recht had onbeperkt in de wetgeving in te grijpen. Het behoeft geen betoog, dat het volledige doen verdwijnen van het alcoholisme in de hand der menschen zelf ligt. Wanneer wij geen volken van millioenen zielen kenden, die zich tengevolge van godsdienstige gebruiken geheel van alcohol onthouden, dan zouden toch de ervaringen van den oorlog geleerd hebben, dat een reeks wettelijke maatregelen voldoende is, om het alcoholisme bijna geheel te doen verdwijnen. In de psychiatrische kliniek te München is het aantal krankzinnigen tengevolge van misbruik van alcohol van 199 in 1914 gedaald tot 19 in 1918. Veel moeilijker dan de bestrijding van het alcoholisme is die der syphilis. Sinds men echter met behulp van de reactie van WASSERMANN alle gevaar dreigende gevallen van lues kan herkennen, is het slechts een vraag van uitbreiding van deze methode van onderzoek om een inzicht te krijgen, in welke schuilhoeken deze volksgeesel zich nestelt. De