

# LITERATUUR-OVERZICHTEN.

## WEEKBLADEN.

### Münchener medizinische Wochenschrift. 1926, No. 22.

O. MOOG und K. BUCHHEISTER. *Ueber die Schweisssekretion des Menschen. Mikrobeobachtungen unter Kontrastfärbung.* — Schrijvers konden aan handen en voeten met de methode van JURGENSEN vaststellen, dat een voortdurende insensibele zweetsecretie bestaat. Zij bestudeerden voorts de zweetklieren en hun functie na inwerking van pilocarpine, adrenaline, histamine, atropine, ijs, veneuse stuwung enz..

HILGERMANN. *Die Wertung der spezifischen Vakzinetherapie in der Behandlung der Infektionskrankheiten.* — Uitvoerig bespreekt HILGERMANN zijn vijfjarige, zeer gunstige ervaringen bij allerlei door bacteriën veroorzaakte ziekten. Door tijdige vaccinbehandeling kan de uitbreiding der infectie van een plaatselijken haard worden voorkomen; in het bijzonder bij de gonorrhoe der vrouw is dit het geval, zooals aan verschillende voorbeelden wordt aangetoond.

REYE. *Das klinische Bild der SIMMONDSSchen Krankheit (hypophysäre Kachexie) in ihrem Anfangsstadium und ihre Behandlung.* — In alle drie beschreven gevallen begon de ziekte in aansluiting aan een met groot bloedverlies gepaard gaande bevalling. Hierna bleef de menstruatie weg, verminderde het lichamelijk en geestelijk arbeidsvermogen, vielen haren en tanden uit; de huid werd wasbleek, glanzend, de libido verdween, de geslachtsdeelen werden atrophisch, bloeddruk en lichaamstemperatuur verlaagd enz., in het bloed eosinophilie. Eerst in een later tijdperk ontwikkelde zich de kachexie. De ziekte berust, volgens REYE, op thromboses in en atrophie van de voorkwab van de hypophysis. Met praephyson, onderhuids en per os, verkreeg hij uitstekende uitkomsten, zoolang dit middel werd toegepast, des te beter, naarmate men het vroeger aanwendt, doch ook in oude gevallen.

H. LENHARTZ. *Ueber postanginöse Sepsis.* — De behandeling bij uitnemendheid dezer sepsis, bij welke steeds een thrombophlebitis der vena jugularis gevonden wordt, is de onderbinding dezer aderen. Het gewichtigste verschijnsel dezer ontwikkeling zijn koude rillingen; verdere verschijnselen zijn de tegenstelling tusschen den ernstigen algemeenen toestand en de geringe afwijkingen in de keel, pijn bij druk en zwelling bij den kaakhoek, zich uitstrekkend naar beneden; voorts metastases in de longen (deze zijn geen tegenaanwijzing voor de operatie). Meestal vindt men in het bloed anaërobe streptokokken.

STEINTHAL. *Ueber Chlorzinkätzungen bei inoperablen Karzinomen.* — STEINTHAL herinnert aan deze door CZERNY aanbevolen en nagenoeg weder vergeten behandeling. Jaren lang kan hierdoor een verloren patiënt van zijn klachten worden bevrijd, zooals door de geschiedenis van een aldus behandelde lijderes aan rectumkanker aangetoond wordt. Beschrijving der techniek.

M. M. GUBERGRITZ. *Zur Symptomatologie des Sanduhrmagens.* — GUBERGRITZ maakt op het volgende verschijnsel van zandloopermaag, dat hij bij 9 gevallen aanwezig vond, opmerkzaam: bepaalt men de ondergrens der maag volgens OBRASZOFF door de ondergrens van het plasgeruisch te bepalen, dan vindt men bij zandloopermaag na een half uur deze ondergrens veel lager en meer naar rechts. De vloeistof, die eerst de cardiale maaghelft vult, beweegt zich door het nauwe verbindingsstuk slechts langzamerhand naar het distale stuk, dat na een half uur is gevuld.

K. CLASSEN. *Ueber das Seltenerwerden der Chlorose. Ein Beitrag aus der Landpraxis.* — CLASSEN nam vroeger in een dorp in Holstein, waar reeds de boerenkinderen een nauw corset droegen, veel chlorose waar. Sedert deze dracht is afgeschaft, is ook de chlorose zeldzaam geworden.

H. SCHMIDT. *Nochmals die Behandlung des Puerperalfiebers.* — Gunstige ervaringen met electrocollargol-HEYDEN.

F. MEYERBACH. *Augenärztliche Erfahrungen mit Targesin.* — Gunstige ervaringen bij acute en chronische, gewone en etterige conjunctivitiden, blenorrhoe en conjunctivitis follicularis.

R. BUROW. *Thiosanol*. — Thiosanol gelijkt in samenstelling eenigszins op ichthyol, doch het wordt beter geresorbeerd en werkt meer in de diepte; het bevat een standvastig, optimaal gehalte aan colloïdaal zwavel. Het werkt antiparasitair, gaat ontsteking tegen, bevordert de vorming van granulaties, beperkt de secretie, bespoedigt de resorptie, vermindert jeuk en pijn. BUROW paste het met goed gevolg toe bij allerlei acute en chronische ontstekingen van gewrichten, spieren, pezen, zenuwen, aderen, bij ex- en transsudaten, beenzweren, varices, brandwonden, erysipelas, pernioles enz..

I. SCHÜKRY und F. KERIM. *Schutzpockenimpfung und Paralyse*. — Schrijvers namen dementia paralytica waar bij patiënten, die nooit waren ingeënt, en deelen een geval mede van deze ziekte bij een vroegeren pokkenlijder.

VON EICKSTEDT. *Die Masstafel. Eine Erleichterung bei Rassen- und Körperbauuntersuchungen*.

H. WESKOTT. *Balneo- und Klimatherapeutische Indikationen*. — Overzicht.

W. GRASSMANN. *Neuere Ergebnisse und Ansichten in der Eiweisschemie*. — Overzicht.

### La Presse médicale. 1926, No. 42.

LEGUEU, FEY et TRUCHOT. *L'examen radiologique de l'appareil pyelo-urétéral*. — Uitvoerig wordt de techniek van de vulling van het nierbekken met het contrastmiddel (liefst 30 pCt. natriumjodide), het beeld en de lediging van het nierbekken in normalen toestand en bij verschillende afwijkingen beschreven.

C. ZOELLER. *La vaccination antidiphthérique par l'anatoxine*. — Voordracht. ZOELLER acht het de plicht van ieder arts de omgeving van elken lijder aan diphtherie als voorbehoedmiddel met anatoxine te behandelen. Hij bespreekt uitvoerig de ontdekking van het anatoxine en zijn praktische toepassing.

G. ICHOK, *L'insuline dans la cure de suralimentation chez les non diabétiques*. — Literatuuroverzicht.

### La Presse médicale. 1926, No. 43.

CH. LENORMANT. *L'arthroplastie des membres*. — Voordracht. Geschiedenis, techniek, aanwijzingen en aan verschillende leden verkregen uitkomsten.

L. BINET. *La soif*. — BINET zet uiteen, dat de dorst voortkomt uit verschillende oorzaken: 1. droogte van den mond, te lang spreken; 2. waterverlies (overmatige diurese, overmatig zweeten); 3. abnormale beweging van het water in het organisme (dorst door stoornis in de hersencentra); 4. een psychische oorzaak.

P. SMIT.

### Dermatologische Wochenschrift. No. 20 (Bd. 82), 1926.

WICHMANN. *Ueber Versuche mit Alt-tuberkulinpflaster und Tuberkulin-säure-esterpflaster zum Zwecke der Diagnose und Therapie*. — In samenwerking met de „Höchster Farbwerke" en de firma BEIERSDORF en Co. werd een guttaplast uit alt-tuberculinum Kochi en een met tuberculinezure ester (juiste recept aangegeven) bereid. Bij 35 lijdens aan tuberculose der huid werden deze twee pleisters, benevens een contrôlepleister, welke bijv. chinine, gonargine en dergelijke bevatte, op de gezonde huid van den bovenarm geplaatst. Beide pleisters, en wel de esterpleisters het meest duidelijk, verwekken op de onderliggende huid streng specifieke reactie-verschijnselen, welke hoogtepunt na ongeveer een week is bereikt. Om een haardreactie te verkrijgen is het noodig verscheidene, hooger gedoseerde pleisters op het lichaam te bevestigen en de huid er onder oppervlakkig te scarificeren. Langs de hier aangeduide lijn moet een ongevaarlijke, doseerbare wijze van behandeling met tuberculine op te bouwen zijn.

F. SIMON. *Ueber Wundbehandlung mit Rohparaffinölpaste (Granugenpaste)*. — De uit ruwe vloeibare paraffine bereide Granugeenpasta (KNOLL A. G.) voldeed uitstekend bij beenzweren en lupus vulgaris. Zij prikkelt tot nieuwvorming van bindweefsel, en doet stevige, cosmetisch bevredigende litteekens ontstaan.

H. SCHLESINGER. *Zur Lehre von der Lebersyphilis der Erwachsenen*. — Samen-vattend overzicht.

**Dermatologische Wochenschrift. No. 21 (Bd. 82), 1926.**

F. DUFKE. *Zur psychischen Urticaria*. — Het bewustzijn, of zelfs reeds de meening, dat haar huid met fluweel of zijde in aanraking kwam, was voldoende om bij de patiënte een urticaria te voorschijn te roepen.

A. ALEXANDER. *Lichen nitidus generalisatus*. — Ongewone uitbreiding, vooral op de benedenarmen, van deze op zichzelf reeds zeldzame aandoening. In de familie waren geen tuberculeusen en ook bij den patiënt zelf waren verschijnselen van tuberculose niet te vinden, maar de reactie van VON PIRQUET was opmerkelijk sterk positief. Bij het microscopisch onderzoek der papeltjes werden de reeds door vroegere onderzoekers beschreven tuberkels gevonden, opgebouwd uit epitheloïde en reuscellen en met een rand van lymphoïde „Rundzellen”. Maar aangezien dit alles niet bewijst, dat de ziekte verband houdt met tuberculose, kan de schrijver voor dit vraagpunt ook niet de oplossing brengen.

LUCKE. *Prophylaxe und Therapie von Gingivitiden und Stomatiden unter besonderer Berücksichtigung des chlorsäuren Kalis*. — Chloras kalicus moet als voorbehoedmiddel en geneesmiddel bij gingivitides en stomatitides, naast de verder gebruikelijke middelen, als onontbeerlijk beschouwd worden. Men gebruike liefst een (niet sterker dan 10 op 100) tandpasta.

V. NOTTHAFFT. *Beitrag zur persönlichen Verhütung der Geschlechtskrankheiten*. — Dublosan (een 2.5 pCt. chininekwikbisulfaat bevattende, onschadelijke, in handige tubusjes verpakte zalf zonder vet der MERZ-werke, Frankfort a. M.) is, mits binnen twee uren na den coitus gebruikt, het meest aan te bevelen voorbehoedmiddel, hetwelk zoowel voor besmetting met gonorrhoe en ulcus molle, als met syphilis behoedt.

**Dermatologische Wochenschrift. No. 22 (Bd. 82), 1926.**

O. KIESS. *Eine eigenartige Form von Hauttumoren in der weiblichen Genitalregion*. (*Angiofibroma circumscriptum symmetricum multiplex*). — In de literatuur werden slechts twee analoge gevallen van dezen vorm van hamartomen beschreven gevonden. Histologisch onderzoek, waarbij een abnormale vermeerdering van het bindweefsel zoowel als van de vaten werd aangetroffen, is noodig ter onderscheiding van sarkoom.

O. DAHMEN. *Ueber Acroasphyxia chronica, RAYNAUDSche Krankheit und Sklerodermie*. — Overzicht dezer drie ziektebeelden, welke op vele punten overeenkomst kunnen vertoonen en waartusschen vele overganggevallen bestaan. In het beschreven geval werd de diagnose op acroasphyxie gesteld, daar de vasomotorische verschijnselen op den voorgrond traden en deze geleidelijk, niet aanvalswijze ontstonden en niet met pijnen gepaard gingen. Trophische versohijnselen (met geringe veranderingen in het röntgenbeeld en met matige hyperpigmentatie) volgden eerst later.

L. W. SAUER. *Regionäre Hautempfindlichkeit des Säuglings auf chemische Reize*. — Bij een aantal zuigelingen werd een plekje der wang, der borst en der bil met een druppeltje 15—25 pCt. phenol aangestipt. Het bleek dat de wang gevoeliger was dan de bil en deze weer méer dan de borsthuid. De huid der pasgeborene was minder gevoelig dan die van oudere zuigelingen. Deze phenolproef heeft prognostische waarde, want twee pasgeborenen, bij welke de 25 pCt. phenoloplossing een sterke reactie gaf, gingen later aan eczeem lijden.

W. LICHTENBERG. *Ueber Nierenschädigung durch Wismut*. — De gedurende een Bi-kuur vaak ontstaande epithelurie bewijst, dat de nier door het geneesmiddel beschadigd wordt. Dat een ernstiger verschijnsel, de albuminurie, veel minder dikwijls is vast te stellen, komt waarschijnlijk, doordien de pauze tusschen de inspuitingen nog groot genoeg is om verergering van den prikkelingstoestand te voorkomen. Vóór elke Bi-inspuiting behoort het urinesediment onderzocht te worden; in ieder geval moet bij het verschijnen van epitheelcilinders met de toediening van het middel gestaakt worden. Tengevolge van dezen eisch zal het gebruik van Bi- op groote poliklinieken, als zijnde te tijdroovend, beperking moeten ondergaan.

M. GRZENKOWSKI. *Kolometrische Arsenbestimmung im Liquor cerebrospinalis und Blut.* — Het beginsel der methode berust op zoogenaamde mineraliseering van het arsenicum hetwelk door reductie met Zn. en zuur in arseenwaterstof wordt omgezet en dan een in sublimaat gedrenkt stukje filtreerpapier geel kleurt. Vergelijking heeft plaats met een standaardschaal.

L. GOERL und L. VOIGT. *Zum letzten male: Der Schwefel in der Gewebs- und Reiztherapie.* — Men spreke, zoo men wil, over de werking van een geneesmiddel in kleine of zeer kleine giften, maar niet van homöopathie, want de homöopathische onzin heeft met de geneeskunde niets te maken.

P. G. RINSEMA.

### Klinische Wochenschrift. 1926, No. 17.

KL. GOLLWITZER—MEIER. *Die Regulierung des Säurebasen-Gleichgewichts.* — Beschouwing.

L. HIRSZFELD und B. ZBOROWSKI. *Ueber die Grundlagen des serologischen Zusammenlebens zwischen Mutter und Frucht. II. Mitteilung.* — Te sterke serologische verschillen tusschen moeder en kind schijnen ongunstig te zijn voor de levensvatbaarheid der vrucht.

H. REITER und A. KUROKAWA. *Versuche über perorale und percutane Immunisierung.* — Proeven op dieren, met verschillend materiaal (muizentyphus, paratyphus, strepto- en staphylocokken) uitgevoerd, bewezen, dat op beide wijzen een zekere onvatbaarheid is te verkrijgen. Deze proeven o.a. bij muizentyphus zijn van veel belang met het oog op het bestaan van de zoogenaamde plaatselijke immuniteit van het darmslijmvlies.

P. GUÄRGY. *Weitere Erfahrungen über Behandlung und Verhütung der Rachitis mit bestrahlter Milch.* — Ook bestraald melkpoeder heeft zeer sterke antirachitische eigenschappen en behoudt deze langere tijd. Het krijgt een ranzigen smaak, maar wordt door kinderen goed verdragen en zonder bezwaren gegeven.

H. HERXHEIMER. *Dilatation, aktive Erweiterung oder Hypertrophie des Herzens im Sport?* — De hypertrophie van de hartspier is het essentieele voor het hart van den sportman, terwijl de actieve verwijding (ontspanning) een tweede plaats inneemt en sterk wisselen kan. Zuivere dilatatie beteekent een ziekelijke verandering van de hartspier en brengt onherroepelijk minder prestatievermogen mede.

ST. HEDIGER. *Experimentelle Untersuchungen über die physiologische Wirkung natürlicher Kohlensäurebäder.* — Het indifferente natuurlijke koolzuurbad veroorzaakt een min of meer belangrijke vaatverwijding der armarteriën. Bij de natuurlijke koolzuurbaden is de warmteuitwerking werkzamer dan de prikkeling van het gas, het eerste is afhankelijk van de concentratie van het opgeloste koolzuur. Daarnaast komt de toestand der stofwisseling, die voor de reactie der vasomotoren van zeer veel belang is.

K. HERXHEIMER und C. M. HASSELMANN. *Ueber das Vorkommen eigenartiger Fasern im zähen Sputum.* — Deze draden komen voor in het zeer weinige taaie sputum van sommige personen, die zonder bepaalde oorzaken (rooken, alcohol, veel spreken, chronische bronchitis) dikwijls van hun jeugd af 's morgens ophoesten.

H. A. GINS. *Ueber den Wert prophylaktischer Masnahmen bei Masern.* — Voorbeeld van een geval, waarin het mogelijk was een geheelen kring van kameraadjes te behoeden voor mazelen door op tijd het kind, dat in het begin van den incubatietijd was, uit den kring verwijderd te houden.

R. STAHL. *Jodreaktion der Blutplättchen, Spindelzellen, Knochenmarksgebilde.* — Opmerkingen bij een artikel van GY. VON ROKAY met antwoord van VON ROKAY.

*Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.*

M. ADLER. *Zur Methodik der Blutzuckerbestimmung.*

P. MORETTI. *Komplementablenkungsversuche mit menschlichen Blutseris und Cholesterin.*

H. BERNHARDT. *Die funktionelle Diagnostik der endokrinen Erkrankungen. B. Prüfung der vegetativen Funktionen.* — Voor de praktijk.

**Klinische Wochenschrift. 1926, No. 18.**

M. BÜRGER. *Ueber die Bedeutung des intrapulmonalen Drucks für den Kreislauf und Mechanismus des Kollapses bei akuten Anstrengungen.* — Beschouwing.

H. EPPINGER, FR. KISCH und H. SCHWARZ. *Experimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung des Herzschlagvolumens und der Herzgröße durch „Kurzschluss“ zwischen der arteriellen und der venösen Strombahn.* — Naar aanleiding van een klinisch geval van aneurysma arteriovenosum, waarbij de hartverwijding na de operatie verbeterde, namen schrijvers proeven op dieren met een kunstmatige kortsluiting in den grooten bloedsomloop (verbinding van aorta met vena cava inferior).

E. FRIEDBERGER. *Unsichtbare und unzuchtbare Formen (krygtantigene vira) bei pathogenen Bakterien.* — Bij vele ziekteverwekkende bacteriën moet men aannemen, dat zij kunnen overgaan in een onzichtbaren en onkweekbaren vorm d.i. het karakter van een „virus“ kunnen aannemen. Schrijver nam als voorbeeld den typhusbacil.

E. G. DRESEL. *Wachstumhemmende Veränderung der Nährbouillon durch Adsorbentien.* — Waarschijnlijk maken adsorbeerende stoffen den darminhoud tot een minder geschikten en groeiremmenden voedingsbodem voor bacterieele verwekkers van darmziekten.

W. STOYE. *Ueber histochemischen Nachweis von Phosphaten und anderen Ionen im wachsenden Knochem.* — Niet kort weer te geven.

T. OKAMATO. *Epidemiologische Beobachtungen an Mäusen und Meerschweinchen.* — Ook door deze proeven kon de beteekenis van de grootte der besmettingsmogelijkheid voor het ontstaan van epidemieën worden aangetoond. Dieren, die eenigen tijd tevoren avirulente bacteriën hadden opgenomen zonder eenig ziekteverschijnsel, werden later onder invloed van secundair letsel ziek aan de eerste besmetting.

H. KLEESATTEL. *Schwangerschaftsdiagnose und Geschlechtsbestimmung mit Hilfe der Interferometrie.* — De practische beteekenis der serumdiagnostiek langs interferometrischen weg is zeer twijfelachtig, zoowel voor de vaststelling van zwangerschap als voor de bepaling van het geslacht van de vrucht.

FR. DÄRBECK. *Zur Ätiologie der Haffkrankheit.* — Opmerkingen bij het artikel van H. WIELAND.

*Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.*

E. SCHLESINGER. *Die Ermüdbarkeit des Pupillenreflexes bei der Einwirkung monochromatischer Reize.*

G. HÉTÉNGI. *Der Einfluss von Säure und Alkali auf die Insulinwirkung in Kaninchenversuchen.*

H. WACHTEL. *Ueber Depigmentation der Haut nach Röntgenbestrahlung.* — Caustiek.

R. LEUK. *Die Differentialdiagnose Tumor und Tuberkulose der Lunge.* — Voor de praktijk.

FR. WOHLWILL. *Die Bedeutung des Geburtstraumas für die Entstehung von Gehirnerkrankungen.* — Samenvattend overzicht.

**Klinische Wochenschrift. 1926, No. 19.**

M. BÜRGER. *Ueber die Bedeutung des intrapulmonalen Drucks für den Kreislauf und Mechanismus des Kollapses bei akuten Anstrengungen.* — Beschouwing.

O. WARBURG, FR. WIND und E. NEGELEIN. *Ueber den Stoffwechsel von Tumoren im Körper.* — Om gezwelcellen te doden door gebrek aan energie moet men zoowel de ademing als de gisting verhinderen; het gelukt dan in 4 uur de meeste gezwelcellen tot afsterven te brengen.

H. ARON. *Durstschäden im Kindesalter.* — De zoogen. dorstkoorts bij kinderen ontstaat door vermindering der waterafgifte en daardoor warmtestuwing. Deze koorts is vooral van beteekenis bij zuigelingen met heftig braken, daar de oorzaak voor de temperatuursverhooging dikwijls elders gezocht wordt. Bewijzend voor de diagnose is het gevolg der behandeling, die bestaat in ruimen vochttoevoer.

R. FRANCK und R. HERZGER. *Beitrag zur Untersuchung des Gasstoffwechsels beim Menschen.* — Proeven bij lijders aan verschillende ziekten.

K. VOLKMANN. *Serologische Spezifität und Diagnostik genitaler Tumoren der Frau.* — Door het invoeren van den interferometer zijn vele bronnen van fouten bij de reactie van ABDERHALDEN ondervangen, zoodat deze inderdaad bruikbaar is en specifiek voor verschillende gezwelsorten.

F. SCHEMINZKY. *Einige Bemerkungen über die Unterbrecher zur Herstellung LEDUCScher Mäanderströme.* — Aanwijzingen hoe de fouten bij onderbrekers van LEDUC te voorkomen.

A. VON SARBÓ. *Ueber Zisternenpunktion (AYER-ESKUCHEN).* — De punctie der cisterna is bijna niet pijnlijk. De onaangename verschijnselen na lumbale punctie komen bij de cisternapunctie niet voor (waarschijnlijk door den negatieven druk in de cisterna). Bij organische ziekten van het centrale zenuwstelsel vindt men in ongeveer 60 pCt. der gevallen in de cisterna een positieven druk.

H. MOMMSEN. *Ueber den Einfluss der Wasserstoffionenkonzentration auf die Färbung von Blutbildern.* — Mislukte kleuring van bloedpraeparaten berust zeer dikwijls op den wisselenden zuurgraad van het gebruikte gedestilleerde water.

M. M. GUBERGRITZ. *Zur Klinik der Herzstörungen als Folge des Fleckfiebers.* — Pijnen in de hartstreek als laat gevolg van doorstanen vlektyphus berusten op veranderingen in het begindeed der aorta of op periaortitis of veranderingen in de sympathische halsganglia.

*Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.*

D. ACKERMANN, *Ueber den Quotienten N. C. einiger harnfahiger Stoffe.*

L. PINCUSSEN and H. N. DIMITRYEVIC. *Ueber das Verhältnis Calcium-Magnesium im Blute bei der Narkose.*

M. LANDSBERGER. *Rechtsseitiger Zwerchfellhochstand als Entbindungslähmung.* — Casuïstiek.

O. SIMON. *Die diätetische Behandlung der chronische-functionelle Obstipation.* — Voor de praktijk.

FR. WOHLWILL. *Die Bedeutung des Geburtstraumas für die Entstehung von Gehirnkrankungen.* — Samenvattend overzicht.

J. VAN TILBURG.

### Wiener klinische Wochenschrift. 1926, No. 23.

*Klinische Vorträge.* EPSTEIN. *Das Wesen der für Syphilis charakteristischen kolloiden Reaktionen des Blutserums und des Liquor cerebrospinalis.*

*Originalabhandlungen.* ABELS. *Ueber den Kuppenweichschädel beim Neugeborenen (Druckweichschädel).* — Bij kinderen met onvoldoende beenvorming, dus met groote fontanellen en wijde beennaden, komt het niet zelden voor, dat ongeveer 3 cM. vóór de kleine fontanel in de sagittaalnaad of in de wandbeenderen weeke, onvoldoend verbeende plekken zijn. Deze plekken danken hun ontstaan aan druk van den kinderschedel tegen de linea innominata; vandaar dat zij nooit voorkomen bij goed verbeende bolvormige schedels of bij kinderen, die in stuitligging geboren worden, doch vooral bij eerst-geboren kinderen, in schedel-  
ligging in eerste positie aan het rechter wandbeen.

RUDOLF STIGLBAUER, *Gleichzeitige intra- und extrauterine Schwangerschaft mit Geburt am normalen Schwangerschaftsende.* — Een vrouw onderging voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap een laparotomie, waarbij tegelijkertijd een intrauterine zwangerschap werd waargenomen van drie maanden. Op normalen tijd volgde hierop de geboorte van een voldragen kind. Een samenloop, die slechts zeer zelden is waargenomen.

FRITZ HUTTER. *Ueber das Wesen und die Behandlung des Heufiebers.* — Een overzicht voor de verschillende theorieën betreffende hooikoorts en asthma, waarbij het constitutioneële moment niet verwaarloosd wordt, doch de klemtoon gelegd wordt op de verhoogde reflex-prikkelbaarheid van het neusslijmvlies. Daarmede overeenkomstig wordt aangeraden alcoholinspuiting onder het neusslijmvlies om de zenuwen uit te schakelen. Verschillende gevallen, waarbij de gevolgen bevredigend waren, worden medegedeeld.

KARL STERNBACH. *Ein neuer Weg der Behandlung der Harninfektion.* — Hoewel

eerst in den aanvang van zijn onderzoekingen is STERNBACH zoozeer getroffen door de gunstige werking van spirocid (stovarsol) bij gonocokken- en staphylocokkenbesmetting der urinewegen, dat hij verzoekt om zijn uitkomsten te controleren. Colibacillose en streptocokkenbesmetting is minder goed te bestrijden.

FRITZ FALTITSCHKE und HUGO KRASSO. *Zur Chromodiagnostik der Leberfunktion.* — Een zeer uitvoerig antwoord op de kritiek van R. BAUER (*W. kl. W.s.*, 1926, No. 16).

*Fürsorgewesen.* OTTO BURKARD. *Ueber die Tuberkulosefürsorge in Holland, Richtlinien für die Praxis.* H. FINSTERER. *Kann das im hohen Alter auftretende Ulkus des Magens bezw.: Duodenums vom Karzinom unterschieden werden?*

J. ED. ST.

### The Lancet. No. 5361, 29 Mei 1926.

SIR ARTHUR NEWSHOLME. *The present position of the tuberculois problems.* — Naar aanleiding van vergelijkende statistieken betreffende de tuberculose bij de beide geslachten, bij stad- en landbevoking op verschillende leeftijden en in verschillende jaren, alsmede onder den invloed van bepaalde maatregelen ter voorkoming van kinderbesmetting, wordt besproken aan welke maatregelen de vermindering der tuberculose is te danken en in hoeverre uitbreiding dier maatregelen noodig is.

J. G. ADAMI. *Advance in medicine.* — Na een overzicht van de wijze van ontwikkeling der geneeskunde in de laatste eeuw, waarbij tijdvakken van sprongsgewijze vooruitgang afwisselen met schijnbaar stille tijdperken, komt de schrijver tot het besluit, dat een nieuwe overwinning is ingeluid met de toepassing van CALMETTE's zuigelingen-enting met zijn verzwakten tuberkelbacillenstam B.C.G.

SETON PRINGLE. *Hour-glass stomach.* — Op grond van onvoldoende uitkomsten, verkregen met andere operaties, beschouwt de schrijver als de beste behandeling: resectie van den distalen zak met anastomose van den proximalen aan duodenum of jejunum; indien resectie door vergroeiing onmogelijk is, gastro-enterostomie van den proximalen zak; of, bij verwijding van den distalen resp. strictuur van den pylorus, bovendien anastomose van de distale helft met dezelfde of een andere darmlis.

F. PARKES WEBER. *On the causation of gynaecomastia.* — Deze aandoening kan ontstaan aan beide zijden na castratie, orchitis, prostatectomie. Twee gevallen worden beschreven bij kwaadaardig hypernephroom; ook bij teratoma testis komt zij voor. Ontstaan aan één kant wordt beschreven na aandoening van één der testes. De verklaring zou liggen in een storing van reflexwerking uitgaande van de testes. Veelal is geen oorzaak te vinden, o.a. een beschreven geval aan één kant.

PHILIP R. HAWE. *Recurrent intussusception.* — Invaginatie van den top van het coecum tot midden in het colon transversum bij een vrouw van 40 jaar, na 3 maanden gedurig terugkeeren met goed gevolg geopereerd.

A. H. DOUTHWAITE. *Pneumococcol meningitis: cisternal puncture.* — Nadat bij een meisje van 15 jaar gedurende twee weken herhaalde lumbale punctie met inspuiting van serum geen verbetering hadden gebracht, volgde op punctie en inspuiting in de cisterna magna na den eersten keer tijdelijke, na de tweede blijvende verbetering.

L. A. DINGLEY. *CCl<sub>4</sub> poisoning.* — Veroorzaakt door stuk gaan van een brandbluschoestel. Behandeling: kunstmatige ademhaling, sterke koffie. Getroffene niet op den vloer laten liggen, daar de damp omlaag zakt.

HAMILTON BAILEY. *Treatment of periurethral abscess.* — Beschrijving der techniek.

J. PINKHOF.