

6°. In geval wij met bloedende zweren hebben te maken en de zweer gemakkelijke toegankelijk is, is het beter tevens deze uittensnijden of uittebranden (BALFOUR) aangezien anders in 13 pCt. dezer gevallen de bloeding zich later herhaalt.

Een gastro-enterostomie voorkomt met zekerheid doorbraak der zweer, (BALFOUR).

De veelvuldigheid van een later ontstaande ulcus jejuni wordt tusschen 2 en 4 pCt. aangegeven, enkele van deze ontstaan nog later dan 2 jaren na de operatie. De afsluiting van de pylorus is algemeen verlaten geworden wegens de veelvuldigheid van ulcera jejuni na deze.

In tegenstelling met de bewering van LEWISOHN e.a., dat de hyperaciditeit na een gastro-enterostomie niet blijvend verminderd wordt, meent WOOLSEY dat dit meestal wel het geval is, indien een goede techniek toegepast wordt. Een blijvende hyperaciditeit na de operatie beteekent vrij zeker een voorbeschikkend moment voor het opnieuw optreden van een zweer (BALFOUR).

TH. SCHEFFELAAR KLOTS.

**Glucose en insuline tegen het braken van zwangere vrouwen.** — TITUS maakte in de laatste jaren (*Journ. Amer. Med. Ass.* 74, bldz. 777; 78, bldz. 92 en 85, bldz. 488) melding van een toenemend aantal gevallen, waarin het braken der zwangeren met goed gevolg werd bestreden met glucose. In lichte en middelmatige gevallen werden koolhydraten in onbepaalde hoeveelheden, doch in kleine maaltijden toegediend, zoo noodig met toevoeging van 10 pCt. glucose-oplossing alle 3 uren 30—60 cM<sup>3</sup>. Herstel volgde steeds, meestal spoedig. In ernstige gevallen, met aceton, cylinders, ernstige vermagering en veelal icterus, werd glucose in groote hoeveelheden (1 Liter 10 pCt. oplossing) onder de huid of in de bloedbaan ingespoten; in de meeste gevallen werd zonder abortus herstel bereikt. THALHIMER (*ibid.* 82, bldz. 696) meende de acidose en daarmee de vergiftiging sneller te kunnen overwinnen door toevoeging van insuline (3 maal 10 eenheden) aan de intraveneuse inspuiting. Van deze laatste methode beschrijft thans KING (*ibid.* 86, bldz. 1417) een aantal gevallen, waarin een zeer ernstige toestand bestond. Hij gebruikt nog iets meer insuline. Aan de snellere werking van deze methode is volgens hem ook het voordeel verbonden, dat men spoedig kan herkennen, of zij verbetering brengt, en, in geval deze uitblijft, zonder tijdverlies tot kunstmatige onderbreking der zwangerschap kan overgaan. In deze gevallen heeft het koolhydraatgebrek reeds tot ernstig organisch letsel van de parenchymateuse organen geleid.

J. PINKHOF.

**Chirurgische behandeling van asthma bronchiale.** — De chirurg ERICH HESSE te Leningrad geeft in de *Deutsche med. Wochenschr.* van 21 Mei een kort verslag van de uitkomsten van 22 sympathectomieën bij 17 lijdende van asthma bronchiale in zijn ergsten vorm. Bij vijf lijdende werd aan beide zijden geopereerd, bij zeven aan de rechter en bij vijf aan de linker zijde. De uitkomsten waren het best bij de laatste, het slechtst bij de eerste groep. In den laatsten tijd is HESSE er toe gekomen slechts in die gevallen te opereeren, waarbij verschijnselen van prikkeling van den n. sympa-