

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1926, No. 37.

E. VOGT. *Die intravenöse Hypophysinkochsalzinfusion zur Behandlung der post-operativen Darmlähmung.* — VOGT heeft deze methode van KLOTZ sedert 1913 bij 81 gevallen toegepast en acht de uitkomsten beter dan die van eenige conservatieve of operatieve behandeling; ook voor de prognose is zij van belang: reageert de darm in het geheel niet op haar, dan is de prognose slecht. Men spuit ongeveer 500 cM³ physiologische zoutoplossing of normosal met 4—5 ampullen hypophysine in, welke gift in 24 uren een- of tweemaal mag worden herhaald; zij wordt gevolgd door een druppelclysma van 10 pCt. calorose. De geheele infusie mag niet langer dan 48 uren duren. Hypophysine is boven adrenaline te verkiezen. Van de 81 gevallen zijn 18 hersteld.

M. HOCHREIN. *Ueber die Arterienelastizität bei der Tuberkulose.* — Voordracht. HOCHREIN heeft in 17 gevallen van tuberculose de bij lijkopening verkregen arteriën onderzocht en bij de 13 met cirrhotische processen een grotere rekbaarheid gevonden dan met den leeftijd overeenkwam. Hierin zoekt hij een factor ter verklaring van den lagen bloeddruk bij tuberculose. Bij de 4 gevallen van exsudatieve tuberculose werd een normale vaatelasticiteit gevonden: daar ook het hart normaal was, berustte hier de lage bloeddruk op wijziging van den periferen weerstand door toxinerwerking.

H. W. SIEMENS. *Die Vererbungs-pathologie der Akne.* — SIEMENS vond bij 36 eeneiïge tweelingen met acne opmerkelijke overeenstemming in de verbreiding enz., terwijl 12 twee-eiïge tweelingen hierin groote verschillen vertoonden. Hij acht hierdoor den invloed der erfelijkheid bij acne bewezen en neemt polyidie der erfelijke acnedispositie aan. Ook bij multipele miliën (miliosis) speelt de erfelijkheid een rol, terwijl dit bij enkele miliën minder het geval schijnt te zijn.

K. BECKMANN und EWIG. *Die Beeinflussung der Säure-Basenverhältnisse des Körpers durch Mineralstoffpräparate. I. Untersuchungen über das Mineralstoffpräparat. „Basica“.* — Een geheele wijziging naar den alcalischen kant kan men met basica niet bewerken, tenminste niet sterker dan door een groente-aardappel-diët; het diët kan basica dus niet vervangen. Wel maakt het de urine alcalisch, doch in het bloed veranderen reactie en alcalireserve niet, terwijl de alveolaire koolzuurspanning een standvastige daling in den loop van den dag vertoont.

M. A. RAKUSIN. *Ueber die Adsorption von Gasen und Dämpfen durch verschiedene Kohlenarten. (Ein Beitrag zur Toxikologie der Kohle).* — Tabellen van de adsorptie van anorganische gassen door verschillende soorten kool.

BONNEFON. *Die wabigen Synechien im vorderen Abschnitt des Auges.* — Anatomie, ontstaan en kliniek dezer synechieën.

H. HERXHEIMER. *Zur Sportarztfrage.*

R. BANDEL. *Die Erfahrungen mit der vertraulichen Sterbekarte nach Schweizer Muster in Nürnberg. Nach einjähriger Erfahrung.* — BANDEL bespreekt hier in hoofdzaak de gegevens omtrent het alcoholisme, die deze kaarten hebben versterkt.

C. M. HASSELMANN. *Die Meldepflicht der gewerblichen Berufskrankheiten vom Standpunkt des praktischen Dermatologen unter besonderer Berücksichtigung der Stellung der Gewerbe-ekzeme.*

STURSBERG. FRIEDRICH SCHULZE.

H. EGGERS. *Bemerkungen zum medizinischen Schrifttum der Gegenwart.*

La Presse médicale. 1926, No. 70.

A. LUMIÈRE. *Que vaut la théorie de l'anaphylaxie basée sur l'altération fonctionnelle de la sensibilité organique.* — LUMIÈRE bestrijdt uitvoerig deze theorie van VERNET en stelt daartegenover zijn colloïdale theorie der anaphylaxie.

S. MUTERMILCH. *L'application des réactions d'opacification au séro-diagnostic de la syphilis.* — Beschrijving en aanbeveling der reactie van MEINICKE. Met een door hemzelf bereid tolu-antigeen verkreeg MUTERMILCH dezelfde uitkomsten als met het oorspronkelijke van MEINICKE. Zij is de eenvoudigste, goedkoopste, steeds specifieke syphilisreactie, die niettemin de reactie van WASSERMANN niet overbodig maakt.

La Presse médicale. 1926, No. 71.

R. LERICHE et R. FONTAINE. *Etude des mécanismes d'action des opérations sympathiques. De l'influence des opérations sympathiques sur la leucocytose.* — Na operaties aan den halssympathicus ontstaat onmiddellijk in het gebied der vaatverwijding hyperleucocytose, beperkt tot de polynucleaire cellen, die eenige weken aanhoudt en evenwijdig loopt aan de bloeddrukverhooging. Na periarterieele sympathectomie wordt deze leucocytose voorafgegaan door een kort tijdperk van leucopenie (vaatvernauwing). Voor een deel verklaart deze wijziging in het bloedbeeld de werking der operatie (sterilisering van chronisch geïnfecteerde wonden enz.).

G. PAISSEAU et A. LAMBLING. *Athérome aortique tuberculeux.* — Bespreking en afbeelding van een praeparaat, verkregen bij lijkopening van een tuberculeusen neger.

R. WEGLOWSKI. *Les interventions opératoires sur le cholédoque.* — Naar aanleiding van eenige gevallen geeft WEGLOWSKI een overzicht van de verschillende cholechusoperaties, dat aantoont, hoezeer deze in den laatsten tijd zijn vereenvoudigd.

R. SCHRAPP et E. FOUQUET. *Le rouget de l'homme; la transmission à l'homme du rouget du porc; l'évolution du rouget de l'homme; sérothérapie (toposérothérapie et sérothérapie générale).* — Kleine monographie over dit onderwerp naar aanleiding van een geval. Het serum van LECLAICHE is bij den mensch even werkzaam als bij het varken. De besmetting geschiedt bij den mensch langs een huidwond, de plaatselijke afwijking ontwikkelt zich na een incubatie van 1—2 dagen, na ongeveer 10 dagen treedt de algemeene infectie op: de uitbreiding vindt plaats langs de lymphwegen.

A. RAVINA. *Une curieuse conception étiologique du nanisme congénital.* — Uitzetting der opvatting van JANSEN.

La Presse médicale. 1926, No. 72.

L. HUGOUNENQ et J. ENSELME. *Sur la teneur en chlorures des produits de l'expectoration.* — Door hart- en nierlijden en door verhoogden bloeddruk wordt het zoutgehalte van het sputum verlaagd. Terwijl men bij gewoon asthma, chronische bronchitis enz. ruim 0.6 gram zout op 100 gram sputum vindt, is dit gehalte bij hartasthma ongeveer 0.5 gram, bij nierlijden 0.4 gram, bij gemengde vormen tusschen 0.4 en 0.6 gram. Schrijvers zoeken de oorzaak van deze verschillen in de gewijzigde fysisch-chemische samenstelling van het bloed.

B. DESPLAS et J. JACOBSON. *L'éther benzyl-cinnamique dans le traitement de quelques formes de tuberculose chirurgicale.* — Schrijvers hebben bij een reeks lijders aan tuberculeuse zweren, fistels en klierzwellingen dezen aether intramusculair ingespoten: 14 dagen achtereen dagelijks 1 cM³, daarna 14 dagen pauze enz., na 3 maanden 1 maand pauze (zij geven daags 1/2 cM³, indien tevens de longen zijn aangedaan). Zij zijn over de uitkomsten zeer tevreden: de algemeene toestand verbetert, zweren en fistels sluiten spoedig, klieren verweken snel of schrompelen weg. Deze aether is het voornaamste bestanddeel van perubalsem.

F. BERTRAND, VILLEMUR et G. BAILLAT. *L'exploration radiologique du cul-de-sac de DOUGLAS par l'injection de l'opiodine.* — Naar aanleiding van 2 gevallen bespreken schrijvers de techniek en de waarde van dit onderzoek voor de herkenning van aandoeningen van het kleine bekken. Afbeeldingen van radiogrammen.

G. PIERI. *Énervation ou ramisection?* — Door doorsnijding van bepaalde rami communicantes van bepaalde wortels kan men het gevoel van borst- en buikorganen opheffen; deze operatie is veel minder ingrijpend dan de zenuwdoorsnijding, waarbij behalve sensibele ook secretorische, vasomotorische en trophische banen

worden onderbroken. PIERI geeft een overzicht van verschillende pijnlijke aandoeningen van buikorganen, bij welke hij de ramisectie met goed gevolg toepaste.

J. MOUZON. *Quelques faits nouveaux concernant l'histoire de l'hydarthrose périodique et sa pathogénie.* — Bespreking dezer aandoening naar aanleiding der nieuwere literatuur.

P. SMIT.

Il Policlinico. 1926, fasc. 26.

LORENZE PEZZOTTI. *Coesistenza di versamenti e di sfregamenti pleurici.* — Er wordt op gewezen, dat het samengaan van een pleuritisch exudaat met pleurische wrijvingsgeruischen zeer wel mogelijk is. Men kan dus soms met positieven uitslag een proefpunctie verrichten daar, waar men die geruischen hoort. Het hangt van verschillende omstandigheden af. In hoofdzaak van de elasticiteit van de long.

M. BOTTALIGA. *Su di un caso di febbre luetica terziaria.* — Bij zieken met koorts moet men ook aan de mogelijkheid van lues denken, wanneer men geen oorzaak voor de koorts kan vinden. Vooral wanneer de lever vergroot en pijnlijk is. De arsenobenzol-praeparaten doen in die gevallen de koorts verdwijnen. Een positieve reactie van WASSERMANN kan echter blijven.

ENRICO FRONTICELLI. *Contributoclinico alla patologia del diverticolo di MECKEL.* — De diverticulitis komt in verschillende vormen voor, waarvan die, waarbij diffuse peritonitis aanwezig is, het meest.

Il Policlinico. 1926, fasc. 27.

OLINTO SCIARRA. *Nuova sierodiagnosi della sifilide.* — De luetische sera in tegenstelling met andere, bekeken door een ultramicr. scoop zijn zeer rijk aan korrels, vrij of geagglutineerd, ongelijk van grootte en beweeglijkheid en aan vlokken, die misschien niet alle specifiek zijn, maar toch zeer kenmerkend. Zijn producten van lipoïede antigenen en antilichamen ook in het bloed evenals in vitro? Voegt men aan het serum absoluten alcohol (of ten minste van 95 pCt.) toe, dan scheiden zij zich snel af. Hierop is de nieuwe reactie, die zich niet in het kort laat weergeven, gebaseerd.

LUIGI PANSINI. *Sulla isterectomia precesarea subtotale addominale.* — Klinische mededeeling.

PIERO POLCENIZO. *Due casi di tumore policistico del mesentere.* — Klinische mededeeling.

EUGENIO CURTI. *Cura pneumotoracica e lavoro.* — Een krachtig pleidooi voor de behandeling van longtuberculose door kunstmatigen pneumothorax.

CAPONETTO GAETANO. *Resezioni e plastiche del coledoco.* — Polemiëk.

Il Policlinico. 1926, fasc. 28.

BERNARDINO MASCI. *Contributo alla conoscenza delle varietà di frattura dell'epifisi prossimale della tibia.* — Klinische mededeeling.

PAOLO PARA. *Una varietà di frattura complicata.* — Klinische mededeeling.

GIUSTO LUZZATTO-FEGIZ. *Contributo al trattamento delle emottisi tubercolari.* — Bij een haemoptoe bestaat het grootste gevaar in een mogelijke aspiratiepneumonie. Dood door verstikking of verbloeding of embolus is vrij zeldzaam. Die is toch wel niet te voorkomen. Maar de aspiratiepneumonie is dat in de meerderheid der gevallen wel.

Il Policlinico. 1926, fasc. 29.

ENRICO TRENTI. *L'ultrafiltrazione come mezzo d'isolamento e di studio delle globuline specifiche per la reazione di WASSERMANN.* — De ultrafiltratie door middel van colloïede membranen werd toegepast op hersen-ruggemergvloeistof. Daarbij kan worden bewezen, dat de eigenschap van de complementafwijking bij de reactie van WASSERMANN gebonden is aan de globulinen en dat alleen bij lues dit het geval is. Toevoeging van trypsine bij hersenvloeistof met positieve reactie van WASSERMANN vernietigt volkomen de eigenschap van complementafwijking der globulinen.

MATTEO BONANNO. *Un caso di linfogranulomatosi accompagnata da elevata eosinofilia.* — Klinische mededeeling.

E. CAPECCHI. *Ancora sulla cura della tubercolosi osteo articolare aperta alla solieri.* — In hoofdzaak bestaat de methode in het immobiliseeren van een gewricht met open tuberculose. De uitkomsten zijn bijzonder goed.

Il Policlinico. 1926, fasc. 30.

CARLO SECCO. *L'indice emotonico e la resistenza dei globuli rossi nella tubercolosi polmonare.* — Onder haemotonischen index verstaat men de verhouding tusschen bloeddruk, haemoglobine een aantal roode bloedlichaampjes. DECLAIRFAYT schreef daaraan groote waarde toe met het oog op de prognose van longtuberculose. Volgens SECCO heeft hi^{er} die echter niet. Evenmin heeft de globulaire weerstand dat.

FERDINANDO MATERO^U. *Osservazioni statistiche sopra un decennio di cure anti-tetaniche.* — Samenvattend overzicht.

S. OLIVIERO. *Contributo clinico allo studio della cirrosi atrofica.*

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Wiener klinische Wochenschrift. 1926, No. 31.

Klinische Vorträge. HITZENBERGER. *Die klinische Bedeutung der Röntgenuntersuchung des Magens.*

Originalabhandlungen. V. RUSS und C. SUCHANEK. *Experimentelles zum Tonsillenproblem.* — Versch verkregen amandelen (en adenoïde woekeringen) werden aseptisch fijn gewreven, verdund met de dubbele hoeveelheid zoutoplossing en bij konijnen intraveneus ingespoten. Hoeveelheden van 1 cM³ werkten regelmatig doodelijk. Geringe hoeveelheden gaven geen opmerkelijke verschijnselen, doch het aantal witte bloedlichaampjes daalde daarbij belangrijk; de polynucleaire cellen vermeerderden relatief, terwijl de lymphocyten verminderden en de bloedplaatjes verdwenen.

JOSEF VON LUKAES. *Proteinkörpertherapie und vegetatives Nervensystem.* — De veranderingen in bloeddruk, pols, verhouding der bloedlichaampjes, temperatuur enz., welke ontstaan na een parenterale opneming van eiwitstoffen, worden beschouwd als gevolg van een wijziging in het vegetatieve zenuwstelsel; een verklaring van de opvolgende wijzigingen is dan mogelijk door aan te nemen, dat na de insputing eerst een stijging in tonus van den parasymphathicus ontstaat en dat deze gevolgd wordt door een langduriger tonus-verhooging van het symphathische stelsel.

F. DONATH und A. PERLSTEIN. *Ueber medikamentöse Beeinflussung der Blutzusammensetzung (Salvarsan, Trypaflavin, Scharlachrot).* — Nagegaan werd bij mensch en dier, welken invloed insputing van deze stoffen had op de bloedsamenstelling. Regelmatig werd een vermeerdering der monocytën waargenomen en daarna een daling van de lymphocyten. De bedoeling is om bij zieken dezelfde contrôle uit te oefenen en uit afwijkingen in deze reacties besluiten te trekken over het weerstandsvermogen van het betreffende individu.

K. TOLDT. *Ein typischer Herd von Menschen befallenden leptosartigen Milbenlarven in Niederösterreich.* — Als vervolg op zijn mededeeling in de *W. kl. W.s.* 1925 No. 1 wordt nu door TOLDT een tweede plaats in Oostenrijk aangewezen, waar op de planten insecten voorkomen, wier larven mensch en hond bijten en een jeukende huidziekte veroorzaken; de wantsen worden nu gevonden in het gebied van Fischau. Zij zijn gedetermineerd als: *Microtrobidium farenholzi*.

HANS FINSTERER. *Ueber chronische Obstipation und ihre chirurgische Behandlung.* — Vervolg.

Richtlinien für die Praxis. PAUL SAXL. *Wie behandelt man eine akute Nephritis.*

D. ADELSBERG. *Zur Diagnostik und internen Therapie der Gallensteinkrankheit.*

Wiener klinische Wochenschrift. 1926, No. 32.

Originalabhandlungen. KARL SCHUBERTH. *Ueber komplizierende Pneumothoraxzwischenfälle.* — De gevaren, zooals luchtembolie en pleura-shock, welke aanvankelijk bij het aanleggen van een kunstmatigen pneumothorax dreigden, zijn,

dank zij de verbeterde methode, vrijwel uitgeschakeld, doch daardoor is deze behandelingsmethode nog niet geheel zonder gevaar. Ten bewijze hiervan worden enkele gevallen medegedeeld, waarbij op de z.g.n. gezonde zijde een spontane pneumothorax ontstond of waarbij een afgekapseld onbereikbaar empyeem aan de zieke zijde tot doodsoorzaak werd.

L. SCHÖNBAUER und R. FRIEDEL. *Ueber einige besonders lange Dauerheilungen nach Magenresektion wegen auch histologisch nachgewiesenen Carcinoma ventriculi.* — Nagegaan worden de uitkomsten der chirurgische behandeling van maagkanker aan de kliniek van VON EISELSBERG. Veertig gevallen, welke gevolgd konden worden, gaven 15 genezingen d.i. 37 pCt. gedurende meer dan 5 jaar en nog 25 pCt. na tien jaar. (De cijfers zijn heel wat minder gunstig, indien men in aanmerking neemt, dat deze veertig gevallen de goed nagegane gevallen zijn van 141 hersteld ontslagen lijdens. Ref.).

PAUL BLATT. *Ueber die konstitutionelle Disposition zur Prostatahypertrophie.* — Een honderd en veertien lijdens werden nagegaan op hun constitutioneele kenmerken; daaruit blijkt, dat zij voor het meerendeel behooren tot de cyclothyemen van KRETSCHMER of tot de musculair-digestiven van SIGAUD.

FAHREDDIN KERIM. *Die Paralyse und die prophylaktische Rolle der Malaria bei syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems in der Türkei.* — De geneeskundige statistiek van Turkije is zeer onvolledig; om hieraan eenigszins tegemoet te komen geeft KERIM een statistisch overzicht van de lijdens aan paralyse in de jaren 1920 tot en met 1925 opgenomen in het groote krankzinnigengesticht Top-Taschi. De paralyse komt betrekkelijk weinig voor; of dit in verband staat met het endemisch voorkomen van malaria, kan hij niet uitmaken.

C. WIDMER. *Makroskopisches und mikroskopisches Schicksal.* — Eenige min of meer fantastische beschouwingen naar aanleiding van de nu vijftig jaar gehouden sterftestatistiek in Zwitserland.

W. SCHAUENSTEIN. *Zur Behandlung der Fluor und entzündlichen Erkrankungen der Adnexe mit Oriol.* — Oriol is een uit plantenextracten bereid praeparaat. Het wordt aanbevolen tegen fluor albus en adnex-ontstekingen.

HANS FINSTERER. *Ueber chronische Obstipation und ihre chirurgische Behandlung.* — Slot.

Richlinien für die Praxis. OSKAR BECK. *Diagnose und Therapie der akuten eitrigen Mittelohrentzündung.*

Wiener klinische Wochenschrift. 1926, No. 33.

Originalabhandlungen. W. BERGER. *Chinin bei kruppöser Pneumonie.* — BERGER heeft de reeds in 1895 door AUFRECHT aanbevolen behandeling van de croupeuse pneumonie weder opgevat. Hij geeft intramusculair 0.5 chinine (chinine-urethaanoplossing) en in deze eerste mededeeling wijst hij er op, dat hij in 34 gevallen één en twintigmaal een vroegtijdig onderbreken van het ziektebeloop verkreeg. Wordt vervolgd.

E. SUCHANEK. *Zur Technik der Bronchographie.* — Na eerst den ingang van het strottenhoofd door cocaine ongevoelig gemaakt te hebben, brengt SUCHANEK, onder controle van het röntgenschermbild, een duodenumsonde in de luchtwegen en schuift deze in den bronchus van het deel van de longen, dat onderzocht moet worden om eerst daarna lipiodol in te spuiten. Het voordeel is, dat een kleine hoeveelheid lipiodol noodig is en alleen één deel van de longen met het middel gevuld wordt.

OSKAR KIRSCH. *Zur Frage der Hypothyreosus. Der Ernährungsfaktor in der Aetiologie des Kropfes.* — KIRSCH ontwikkelt in een zeventiental gevolgtrekkingen de stelling, dat in de meeste gevallen de krop niet is een primaire ziekte doch een gevolg van de insufficiëntie van andere organen met inwendige afscheiding (b.v. nier en geslachtsklier) en dat deze eerst lijdende organen ziek worden door onvoldoende voeding n.l. in het bijzonder onvoldoende vleesch-, ei- of kaasvoeding.

TH. B. WEISZ. *Neue Wege auf dem Gebiete der Elektrotherapie.* — In de *W.kl.Ws.* 1925, no. 40 heeft WEISZ reeds gewezen op de mogelijkheid om door den electrischen stroom colloïdaal zilver in beenderen te brengen. Om een zóó groote hoeveelheid te

impregneeren, dat daarvan een krachtige werking is te verwachten, raadt hij: 1°. het gebruik van sterke stroomen na vooraf de weefsels gevoelloos gemaakt te hebben; 2°. uitschakeling van huid en spieren door de electrode in fistels te brengen of een zilverdraad door het been te boren.

GEZA PAWCHLY. *Durch essigsäures Thallium hervorgerufen Alopecie an der kindlichen Kopfhaut.* — Door inwendig gebruik van 8 mgr. thalliumacetaat wordt na ongeveer 3 weken een volledige alopecia verkregen (ter behandeling van microsporrie, favus trichophytie), zonder dat overigens eenige schade werd toegebracht.

R. REITLER. *Ueber die Behandlung der Malaria mit Cadmiumpräparaten.* — Intraveneuse inspuiting veroorzaakt belangrijke algemeene stoornissen, werd daarom na 3 proeven niet meer herhaald. Intramusculaire inspuiting van een salicylzuur-cadmiumverbinding veroorzaakt in den regel plotseling daling van temperatuur, waarna de koortsaanval niet terugkeert, maar de plasmodiën wel in het bloed blijven. De inspuiting is zeer pijnlijk, dus niet dikwijls te herhalen, mogelijk is de samenvoeging van chinine en cadmiumbehandeling beter.

Richtlijnen für die Praxis. F. MRAS. *Liquor-Diagnostik bei Syphilis.*

Wiener klinische Wochenschrift. 1926. No. 34.

Originalabhandlungen. G. MORITSCH. *Ueber den Wert der Blutgruppenbestimmung in der Paternitätsfrage.* — In den laatsten tijd wordt aan de kliniek van von EISELSBERG herhaaldelijk de vraag voorgelegd om uit de groepsbepaling van moederlijk en (verondersteld) vaderlijk bloed na te gaan, of met inachtneming van de erfelijkheidsmogelijkheid dit overeenkomt met het kinderbloed. In vele gevallen is de vraag onoplosbaar, maar in enkele gevallen is een zeker antwoord te geven n.l. als een van de factoren, die de groepsbepaling van het kind beheerscht, zoowel bij de moeder als bij den verdachten vader ontbreekt.

J. MEHES. *Studien über den Angriffspunkt von Schlafmitteln.* — Door vergelijking van de werking bij katten, waarbij de groote hersenen verwijderd worden, tegenover ongeopereerde is aan te toonen, dat morphine zoowel als scopolamine in het bijzonder op de middenhersenen werken.

JOSEF GÜDEMANN. *Ueber eine seltene Komplikation bei Insulinbehandlung.* — Bij een diabeteslijder, die reeds geruimen tijd met insuline behandeld werd (en die bovendien aan longtuberculose leed), ontstond na de insuline-inspuiting haematurie; viermaal herhaalde zich dit, toen men noodgedwongen trachtte de suikerziekte weder met insuline te behandelen. Na den dood werd alleen een hyperaemie in de nieren gevonden.

G. PICHLER. *Ueber Cardiozol.* — Het cardiozol wordt (in hoeveelheden van 0.1 gr.) geacht als een uitstekend analepticum bij acute en chronische hartzwakte.

FRITZ REUTER. *Was hat JULIUS KRATTER für die Lehrkanzel und das Institut für gerichtliche Medizin in Graz geleistet.* — Een herinneringsrede bij den dood van prof. KRATTER.

W. BERGER. *Chinin bei kruppöser Pneumonie II.* — Behalve verkorting van het proces werd op de tweede plaats een ernstig beloop gezien bij zeer ernstige gevallen. Eindelijk wordt verslag gedaan over gevallen, waarbij de chininebehandeling mislukte, omdat te laat begonnen werd, of andere onbekende oorzaken hiervoor moeten aangenomen worden. Slot volgt.

J. SCHNITZLER. *Bemerkungen zu Dozent C. PERNKOPFS „Kritik der morphologischen Analyse eines Falles von angeblicher Inversion des Duodenum“.*

A. SPITZER. *Antwort auf Dozent C. PERNKOPFS „Kritik der morphologischen Analyse eines Falles von angeblicher Inversion des Duodenum“.*

Richtlijnen für die Praxis. K. WITZENBERGER. *Wie lassen sich Erkrankungen die zu Dämpfung an der Lungenbasis führen im Röntgenbilde erkennen.*