

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1926, No. 45.

H. SELLHEIM. *Versuche zur Vereinfachung der Serumdiagnostik.* — Voordracht. SELLHEIM heeft de reeds door LÜTTGE en VON MERTZ met hun alcoholmethode verbeterde zwangerschapsreactie van ABDERHALDEN nog verfijnd en vereenvoudigd door zijn uitvoerig beschreven alcoholextractreactie. Hij knoopt hieraan vast breedvoorige beschouwingen over het wezen dezer serumreacties.

J. KAUP und A. GROSSE. *Kreislauf, Sauerstoffausnützung und Erholungsquotient menschlicher Arbeit nach teilweise neuer Methodik.* (Schluss folgt).

F. JAHNEL und J. LANGE. *Zur Syphilisimmunität der Paralytiker.* — In de hoop een spirochaetenstam te vinden, voor welken lijders aan dementia paralytica niet ongevoelig waren en die dus voor actieve immunisering te gebruiken zou zijn, hebben schrijvers paralyselijders met verschillende stammen geënt (die van TRUFFI, van NICHOLS), evenwel met negatieven uitslag: bij den paralyselijder blijkt panimmunitet tegenover de spirochaete pallida te bestaan.

G. SINGER. *Ueber das Geltungsgebiet der Reizkörperbehandlung des Diabetes.* — De gunstige invloed van de behandeling met eiwitlichamen volgens SINGER (protasineïnspuitingen) blijkt niet alleen uit de verhooging der tolerantie voor koolhydraten, doch ook door het gunstig beloop van chirurgische verwikkelingen van diabetes, waarvan SINGER een geval mededeelt.

R. SCHELLER. *Ueber den Milchsäuregehalt pathologischer Ergüsse.* — In pleura-transsudaten is het melkzuur- en suikergehalte gelijk aan dat van het bloed. In steriele lympho- en leucocytaire exsudaten vindt men een melkzuurspiegel van 17—32 mgr. pCt.. Bij tuberculose en etterige infecties der pleura wordt evenals in gezwelexsudaat geen suiker en veel melkzuur gevonden. In ascitesvloeistof bij gezwellen is eveneens het melkzuurgehalte verhoogd, doch het suikergehalte niet verlaagd. Transsudaten, exsudaten van de pleura en ascitesvloeistof vertoonen geen glycolyse, indien zij niet etterig zijn.

J. S. GALANT. *Der HIRSCHSPRUNG-GALANTSche Infantilismus.* — Een geval van megacolon congenitum, gepaard met elevatio uteri en hypoplasie der vrouwelijke geslachtsorganen met haar gevolgen. GALANT stelt zich voor, dat deze afwijking berust op een ontwikkelingstoornis van het embryo, waarbij het rectum in het kleine bekken is gebleven en daar ook den dikken darm terughoudt: deze vullen het geheele kleine bekken, verhinderen den descensus uteri en bewerken de hypoplasie der geslachtsorganen.

F. NIKLAS. *Ueber eine Schnellmethode zur funktionellen motorischen Prüfung des Dickdarms.* — De methode berust hierop, dat men na een contrastlavement de op een intraveneuse inspuiting van pituitrine of pituglandol volgende groote colonbewegingen voor het Röntgenschermbestudeert.

J. VONKENNEL. *Forcierte intravenöse Kalziumbehandlung der Adnexitis gonorrhoeica.* — Kalk gaat exsudatie tegen en bevordert de bloedstolling. Met het oog op deze eigenschappen heeft VONKENNEL zich ontwikkelende adnexitis behalve met de gebruikelijke antiphlogistische middelen met intraveneuse afeñilinspuitingen behandeld. Zijn ervaringen zijn voortreffelijk, het acute en subacute tijdperk laat zich op deze wijze tot 8—12 dagen verkorten; vroegtijdig toegepast kunnen vaak 2 maal daags uitgevoerde inspuitingen een acute adnexitis in 2—3 dagen genezen. Kalk werkt hierbij duidelijk antipyretisch. Toepassing bij den chronischen vorm heeft geen zin. Geen ongewenschte bijwerkingen.

G. DÜTTMANN. *Weitere Erfahrungen mit Tutocain.* — Zeer gunstige beoordeeling.

W. STEINMANN. *Die Reposition der Paraphimose.* — Met afbeelding van den handgreep.

H. MALTEN. *Physikalische Behandlung der Angina.* — Aanbeveling van een plaatselijke behandeling met heete lucht, waarvoor MALTEN den „Wechselatmer” van BRETSCHNEIDER gebruikt.

P. GRAF. *Einiges über den Milzbrand der letzten 25 Jahre.*

H. SEPP. *Zwei Jahre Vollsatz.* — Sinds Juli 1924 wordt in het gedeelte van Allgäu, waar SEPP werkzaam is, zout gebruikt, waaraan JK is toegevoegd. Het aantal strumalijders, dat hij in zijn fondspractijk waarnam, is in den loop van 1925 en 1926 gedaald van 22 tot 3 pCt. van het geheele aantal zieken. Schadelijke invloed werd niet opgemerkt.

CH. M. VAN ALLEN. *Ein neuer Hämatokrit.* — Afgebeeld.

KARL TURBAN. (*Zum 70 Geburtstag.*)

V. SCHMIEDEN und W. SEBENING. *Wann sollen wir bei Icterus infolge von Gallensteinleiden operieren?* — Overzicht.

La Presse médicale. 1926, No. 85.

H. VAQUEZ et E. DONZELOT. *Les crises d'hypertension artérielle paroxystique* — Een 37-jarige, overigens gezonde man vertoonde sinds eenige maanden in menigvuldigheid toenemende, eenige minuten durende aanvallen van vasoconstrictie, beginnende aan de onderbenen en zich snel onder hevige pijnen naar het hoofd uitbreidend. De bloeddruk was normaal, doch werd telkens gedurende den aanval zeer verhoogd; er bestond geen nephritis, doch bij de aanvallen een voorbijgaande albuminurie. Eenmaal ging de aanval gepaard met longoedeem, eenmaal met netvliesbloeding. Schrijvers sommen de verschillende mogelijke oorzaken van deze verschijnselen op, doch zijn niet in staat aan te geven, welke in dit geval geldt.

S. DRAGANESCO. *Hyperpnée et réflexes cérébro-spinaux; son importance dans la recherche des réflexes douteux.* — DRAGANESCO bespreekt verschillende methodes om verzwakte, onduidelijk aanwezige huid- en peesreflexen te versterken, in het bijzonder de toepassing der hyperpnoe, waardoor inderdaad, zooals hij door tien ziektegeschiedenissen aantoonde, schijnbaar opgeheven peesreflexen weer duidelijk zichtbaar worden. Werkelijk geheel opgeheven reflexen blijven echter negatief.

XXVIe Congrès français d'urologie (suite et fin).

La Presse médicale. 1926, No. 86.

A. BRESEDKA. *L'immunisation locale et ses applications pratiques.* — Uitvoerig overzicht, toegelicht door vele ziektegeschiedenissen, over de gunstige uitkomsten die reeds verkregen zijn met de vaccinatie per os tegen typhus en dysenterie, met de cutivaccinatie ter voorbehoeding tegen miltvuur, met omslagen, inspuitingen, indruppeling van vaccins, toegepast op huid en slijmvliezen bij steenpuisten, anthrax, panaritria, mammitis, otitis, sycosis, pyodermiden, impetigo, ozaena, besmette wonden, verbrandingen, blepharitis, puerperale infecties, pyelonephritis enz..

A. TRIUMPHOFF. *Une forme particulière de l'hyperhidrose locale de la face.* — TRIUMPHOFF nam 14 maal na parotitis een eigenaardige roodheid en verhoogde zweetafscheiding van het gelaat waar in het gebied van den nervus auriculotemporalis van den derden trigeminustak en van den ramus auricularis van den plexus cervicalis, welke beide door de oorspeekselklier-loopen. Het zweeten treedt in het bijzonder na kauwen, gepaard met speekselafscheiding, op. Het is vermoedelijk gevolg van druk op deze zenuwen door de functioneerende, eenigszins cirrhotische klier. Het gebied der zenuwen is ook wat hyperaesthetisch. Slechts zelden komt op den duur eenige verbetering van het verschijnsel tot stand.

J. SENEQUE. *Résultats éloignés des résections du coude.* — Overzicht.

P. SMIT.

Paris médical. 1926, No. 41.

Ch. AUDRY. *Sur la fréquence et l'importance de la syphilis utérine.* — Volgens de ervaringen van den schrijver is syphilis van baarmoeder en eierstok een veel voorkomende ziekte. De helft van zijn lijderezen aan baarmoederkanker had een positieve reactie van WASSERMANN. Bij ieder verschijnsel, dat wijst op een aandoening van het baarmoederslijmvlies is aan syphilis te denken.

R. SAVIGNAC, A. MATHIEU DE FOSSEY et R. SARLES. *Réactions nerveuses des colites.* — Beschrijving van een reeks verschijnselen, die voorkomen bij dikke-darmontsteking. Het zijn vooral de verschijnselen van den kant van het vegetatieve zenuw-

stelsel, veroorzaakt door de abnormale gisting van den darminhoud, welke op den voorgrond treden. Ook psychische afwijkingen, in den vorm van angsttoestanden en algemeene zwakte komen veelvuldig voor.

H. BORDIER. *Traitement de l'hydarthrose du genou par la diathermie.* — Gunstig gevolg van de behandeling van vochtophooping in een kniegewricht met diathermie. Volgens proeven stijgt de temperatuur in het gewricht tot omstreeks 45°. Iederen dag behandeling gedurende een half uur, stroomsterkte 1200 tot 1500 milliampères.

KRIKORIAN. *Le traitement du chancre mou et de ses complications par le vaccin de NICOLLE.* — Hij behandelde 7 lijders aan weke sjanker met inspuitingen in een ader van een vaccin van de bacil van DUCREY. De reactie na iedere inspuiting is zeer hevig, (o.a. koorts tot 40°), maar de gevolgen zijn uitnemend.

Paris médical. 1926, No. 42.

BAUDOIN et N. PERON. *La psychiatrie en 1926.* — Literatuur overzicht.

H. CLAUDE, R. TARGOWLA et R. LIGNIERES. *Sur le traitement des affections neuro-psychiques par la fièvre récurrente américaine.* — Lijders aan dementia paralytica, dementia praecox, multiple sklerose en maniacale psychose entten zij met spirochaete venezuelense, welke aanvallen van koorts veroorzaakt. Na drie koortsperiodes volgde een neosalvarsaankuur, om de besmetting te doen ophouden. De gevolgen dezer geneeswijze zijn maar matig te noemen. Zij is bovendien gevaarlijk, enten met malariaplasmodiën verdient de voorkeur.

L. MARCHAND. *De l'épilepsie cardiaque.* — Echte epilepsie en hartaandoeningen zijn onafhankelijk van elkaar. Bij de laatstgenoemde ziekte komen echter epileptiforme aanvallen voor, die op epilepsie lijken. Vooral bij de zgn. ziekte van STOKES—ADAM door hersenanaemie, maar ook bij andere ziekten van hartspier of kleppen. Uitvoerige bespreking over de pathogenese van deze aanvallen. Uraemie, onvolgende leverwerking, vaatverkalking moeten eerst uitgesloten worden, alvorens van hartepilepsie te mogen spreken.

G. HALBERSTADT. *Rémissions, intermittences et évolution circulaire au cours de la démence précoce.* — Uitvoerig wordt de vraag besproken of de geestesziekten, welke lijken op dementia praecox, maar remissies vertoonen in haar beloop met meestal maniakale verschijnselen, een ziekte op zich zelf zijn, of dat zij behooren tot de groep der schizofrenieën. Vooral in het begin is de diagnose en classificatie van deze intermitterend verloopende psychoses dikwijls zeer moeilijk.

Paris médical. 1926, No. 43.

R. GRÉGOIRE. *Le diverticule du duodénum; anatomie pathologique et traitement.* — Anatomische beschrijving van en verschillende theorieën over het ontstaan van een divertikel in den twaalfvingerigen darm. Ziektegeschiedenis van een lijderes aan deze ziekte, welke genas na operatie. Een adhaesieve peritonitis komt dikwijls gelijktijdig voor. De diagnose is alleen Röntgenologisch mogelijk.

SPIRO LIVIERATO. *L'autovaccinothérapie mixte dans l'abcès pulmonaire.* — Beschrijving van een ziektegeval bij een man van veertig jaar, lijdende aan een longabsces, ontstaan in aansluiting aan een longontsteking. Volkomen genezing volgde na herhaalde inspuitingen van een autovaccin, bereid uit den absces-etter, waarin streptocokken, staphylocokken en GRAM-negatieve bacteriën.

A. PORCHERON et M. DAUFRESNE. *Anémie et cure marine.* — Korte ziektegeschiedenis van een meisje, oud 16 jaar, met belangrijken graad van bloedarmoede. De gewone geneesmiddelen hadden geen gevolg. Na een flinke zeereis steeg het haemoglobine echter snel en verdwenen alle klachten.

MORTIER HIJMANS.

Hospitalstidende. 1926, No. 33.

KAJ BAAGØE og P. C. T. BARFOD. *Danske Praeparater til Kutanreaktioner.* — Voor de onderzoekingen omtrent overgevoeligheid van de huid bij sommige idiosyncrasieziekten (voornamelijk asthma) werden in het Rijkshospitaal te Kopenhagen Amerikaansche proteïnestoffen gebruikt. Toen deze minder goed verkrijgbaar

waren, werden die zelf gemaakt van visch, melk, koren, rijst, katoen, groenten enz.. De Deensche producten voldeden beter.

VIGGO SCHMIDT. *Over Labyrinthdem ved acute Mellemøresuppurationer.* — Onder 748 gevallen van otitis media sup. acuta waren 83 gevallen met oedeem van het labyrinth. Slechts twee patiënten waren jonger dan 8 jaar. Slechts in de helft der gevallen bestond er duizeligheid. De spontane nystagmus, die na de operatie ontstaat, doet dat meestal terstond er na. Later ontstaande nystagmus is meestal het teeken, dat er een verwickeling in den schedel is. Waarschijnlijk ondervinden de otholieten door het oedeem invloed.

Hospitalstidende. 1926, No. 34.

HENNING KRIEGER LASSEN. *Et Tilfælde af intraabominal Blødning fra en bristet Corpus luteum. Cyste.* — Klinische mededeeling.

ERIK J. LARSEN. *Undersøgelser over Urobilinuri hos et større Antal neurologiske Patienter.* — Bij geen enkelen patiënt met neurologisch lijden werd urobilinurie gevonden. Echter steeds bij de pas ingekomen alcoholisten. Die urobilinurie verdween steeds gedurende het verblijf in het ziekenhuis, om terstond terug te keeren als de patiënt weer alcohol gebruikt. Een enkele alcoholvergiftiging roept nog geen urobilinurie te voorschijn.

Hospitalstidende. 1926, No. 35.

STEFAN JØRGENSEN OG ERIK WARBURG. *Om erythrocyteres Indices og Diametre og om det bedste haematologiske Kriterium paa det perniciøse Anaemie.* — Wordt vervolgd.

H. C. HAGEDOM. *Bidrag til Stofskiftens Patologie hos Fede.* — Bij normale en zwaarlijvige personen werd het respiratiequotient bepaald door middel van een zelfregistreerend toestel en nadat zij gedurende twee dagen hadden geleefd van een kost voornamelijk bestaande uit koolhydraten. Hierbij werd een zeker verschil gevonden van het gemiddelde quotient bij normale en vetlijvigen. Er is een bepaalde verhouding tusschen het gewicht en dat quotiënt. Menschen met een zeer groot lichaamsgewicht hebben een zeer laag ademhalingsquotient.

Hospitalstidende, 1926, No. 36.

STEFAN JØRGENSEN OG ERIK WARBURG. *Over Erythrocyternes Indices o.s.v.* — Wordt voortgezet.

OTTO BEYERHOLM. *Neuritis og sanocrysinbehandling.* — Een geval, waarbij na sanocrysin-inspuiting hevige pijnen ontstonden.

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Klinische Wochenschrift. 1926, No. 40.

P. MARTINI und A. PIERACH. *Der niedere Blutdruck und der Symptomenkomplex der Hypotonie.* — Beschouwing.

H. ZONDEK und H. ÜCKO. *Weiterer Beitrag zur Frage der Variabilität der Hormonwirkung. Elektrodialyse und Insulin.* — Het gelukt door electro-dialyse insuline volkomen onwerkzaam te maken evenals door het hormoon in bepaalde verhouding te mengen met een electrolyt. Geringe afwijkingen in den colloïdalen toestand der cellen kunnen eveneens de werkzaamheden van een hormoon opheffen.

E. MISTOWITZER. *Zur Messung des Ph von Plasma, Serum und Blut mit der Chinhydrone methode.* — Deze werkwijze is zonder fouten, mits terstond onderzocht wordt.

R. PRIESEL und R. WAGNER. *Erfahrungen über die poliklinische Behandlung zuckerkranker Kinder.* — Zeer gunstige ervaringen met de loopende behandeling van kinderen, lijdende aan suikerziekte, die allen 20 tot 80 eenheden insuline per dag noodig hadden. De kinderen gaan naar de school en op lateren leeftijd in allerlei beroepen. Nooit werd een hypoglykaemische toestand gezien. Allen hadden vetrijk, eiwitarm diëet en 40 tot 60 gram koolhydraten per dag. Het is waarschijnlijk beter vroeg met de insulinebehandeling te beginnen.

W. LÖWENBERG. *Ueber bactericide Wirkung des Salzsäurefreien Magensaftes.* — Maagsap kan, onafhankelijk van de aanwezigheid van zoutzuur, bactericide eigen-

schappen hebben. Over den aard dezer bactericide stoffen is weinig te zeggen: pepsine schijnt het niet te zijn.

ST. KWASNIEWSKI und N. HENNING. *Experimentelle und klinische Untersuchung über die Streptokokken-Infektion. II. Mitteilung: Die Streptokokkeninfektion der Gallenwege.* — De gal is bij proefdieren na streptocokkenbesmetting steeds steriel, in tegenstelling met de bevindingen na besmetting met staphylocokken. Ook bij menschen heeft de gal doodende werking op streptocokken, echter niet op enterocokken.

M. ROSENBERG und G. WOLF. *Erfahrungen mit der kombinierten Diät-Schildrüsen-Hypertherman-Therapie bei Fettsucht.* — In vele gevallen van endogene vetzucht kan de vereeniging van diëet, schildklier en hyperthermaaninspuitingen gevolg hebben, waar op andere wijze alle pogingen tot gewichtsvermindering mislukten. Gevaren zijn er niet aan verbonden, temeer daar men de hoeveelheid schildklier niet groot behoeft te nemen, daar de werking van het hyperthermaan mogelijk berust op een sensibiliseering van het lichaam voor schildklier.

J. ROSENSTERN. *Ueber Wachstumshemmungen im Kindesalter.* — Onderscheiden worden de primaire endogene groeistoornissen en de secundaire exogene: de eerste zijn meest sterk en niet te herstellen (microsomie, dwerggroei, hypotrophie).

W. ISRAEL. *Harnleitermündung und Blasenkontraktion.* — Waarschijnlijk blijft de blaas zich tijdens de ontleding samentrekken, zoodat gedurende dien tijd de uretermonden worden afgesloten.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

P. REYHER. *Herzvergrößerung und degenerative Veränderungen am Sympathicus bei Spasmophilie.*

H. SIMON. *Ueber die Wirkung von Sauerstoffinhalationen und ihre Verwertbarkeit in der Herztherapie.*

H. WICHERN. *Ein klinischer Beitrag zur Frage der Ovarial-Hormone.* — Casuïstiek.

A. ESCH. *Was wissen wir über die Entstehung und den Beginn der Kehlkopftuberkulose?* — Voor de praktijk.

MARTINECK. *Ueber den gegenwärtigen Stand der Kriegsbeschädigten-Versorgung.* — Beschouwing.

Klinische Wochenschrift. 1926, No. 41.

O. BUMKE. *Hoffnungen und Sorgen der klinischen Psychiatrie.* — Beschouwing.

H. STEUDEL. *Neue Untersuchungen über den Stoffwechsel normaler Säuglinge.* — De stofwisseling van den zuigeling onderscheidt zich alleen in een licht verhoogde urinezuuruitscheiding van die van den volwassene.

A. LIECHTI. *Ueber Reaktionsänderungen im Röntgenbestrahlten Gewebe.* — Na bestraling volgt een stroom van zuurwaarden uit het bestraalde weefsel naar het bloed, hetgeen verklaard wordt uit een veranderde doorlaatbaarheid van de celmembranen.

BR. LANGE. *Neue Forschungsergebnisse über die Verbreitung der Tuberkulose und ihre Bedeutung für die Tuberkuloseverhütung in der Praxis.* — Ernstig besmettingsgevaar ligt alleen in veel bacillenhoudend sputum; niet alleen in de zoogenaamde druppeltjes van FLÜGGE, maar vooral in uitgedroogd sputum bevattend stof.

W. NÖLKE. *Die Röntgendiagnostik des Ulcus Duodeni unter besonderer Berücksichtigung der direkten Symptome und Schilderung der im städtischen Röntgeninstitut gehandhabten Untersuchungstechnik.* — De verhouding maagzweer: darmzweer is in deze statistiek als 1 : 1.8; het aandeel der mannen is zeer groot tegenover dat der vrouwen. Alleen wat betreft de vergroeiingen om en nabij den pylorus komen deze veelvuldiger bij vrouwen voor. Bij een zweer van den twaalfvingerigen darm moet men directe verschijnselen in het Röntgenbeeld eischen evenals bij maagzweer: indirecte verschijnselen, zooals de sterke duodenale beweeglijkheid, de pylorusfixatie, de karteling van de groote curvatuur, de „Dauerbulbus” enz., worden van weinig beteekenis geacht voor de diagnose. De versche slijmvlieszweer geeft Röntgenologisch weinig objectief waarneembare veranderingen. Een echte bulbus ziet men zoo zelden, daar de zweer meestal op den achterwand

van den bulbus zit. Directe verschijnselen van bulbuszweer zijn: bulbustasch, spasmi, waardoor opmerkelijke bulbusverandering (bulbusraffing, klaverblad-vorming), leegblijven van den bulbus bij vulling van het duodenum verderop, onregelmatig gevulde bulbus. Serieopnamen vullen het bij de doorlichting opgemerkte aan.

P. MULZER. *Zur Serumbehandlung der Syphilis*. — De serumbehandeling van syphilis heeft tot nu toe goed gevolg gehad. Ook het lamaserum van JAINEGUI en LANCELLOTTI heeft geen waarde en kan gevaarlijk zijn.

H. HIRSCH-KAUFFMANN und A. HEIMANN-FROSIEN. *Bakterienwachstum auf dem Blut diabetischer Kinder*. — Door bloed van comateuse kinderen wordt de groei van bacteriën sterk bevorderd, niet door bloed van niet-comateuse kinderen, die lijdende zijn aan suikerziekte.

H. ZOESCHKE und H. LEHMANN-FACIUS. *Untersuchungen über Wesen und Grundlagen des ABDERHALDENprinzips und die Möglichkeit seines Nachweises durch eine Präzipitinreaktion*. — Door proeven op dieren werd het beginsel van de reactie van ABDERHALDEN door middel van praecipitinen volkomen vastgesteld. Deze methode is specifiek. Men moet over een zuiver specifiek antigeen beschikken.

W. HEUBNER. *Das individuelle Verhalten der Zelle und das „Grundgesetz der allgemeinen Therapie“*. — Opmerkingen bij artikel van LEHMANN.

E. MEINICKE. *Serodiagnose der Syphilis an der Leiche*. — Opmerkingen bij een artikel van KRAMPE.

Kurze wissenschaftliche Mitteilungen.

G. FRICHE. *Glykosurie durch Insulin*.

W. BERGER und O. GALEHR. *Zum intermediären Wasserhaushalt im Fieber*.

H. KÄHLER. *Zur Kasuistik der subchronischen Leberatrophy*. — Casuïstiek.

A. BÖTTNER. *Die Therapie der croupösen Pneumonie*. — Voor de praktijk.

BIJLSMA. *Opium und Morphium*. — Samenvattend overzicht.

J. VAN TILBURG.

The Lancet. No. 5383, 30 October 1926.

JAMES MC. INTOSH. *The modern trend of prophylactic and therapeutic immunisation*. — Van de vaccins ter voorbehoeding is het levend verzwakt virus het minst veilige, daar dit weer virulent kan worden (koepok-encephalitis); daarom verdient B-C.G. enting tegen tuberculose geen aanbeveling. De vervanging van specifieke vaccins door niet-specifieke prikkels in de therapie is geen vooruitgang: uit vermelde proeven blijkt, dat door niet-specifiek eiwit wel de leucocytenwerking doch niet de vorming van antistoffen wordt vermeerderd.

Sir ARTHUR NEWSHOLME. *Private medical practice and preventive medicine*. — Beschouwingen.

Sir GEORGE LENTHAL CHEATLE. *The natural formation of acquired adhesions*. — Bij onderzoek van verwijderde ontstoken bursae bleken de lange vergroeiingen tusschen de sereuse oppervlakten ontstaan door organisatie van draden gestolde fibrine, de korte door directe aanraking tusschen twee ontstoken oppervlakten.

ANTONY DELMEGE. *Afebrile tachycardia in early phthisis*. — Met eenige voorbeelden wordt aangetoond, hoe bij longtuberculose zonder koorts een periode van versnelden pols of vergrootte dagelijksche schommeling in het polsgetal overeenkomt met vermeerderde activiteit van het proces. Meer aandacht wordt gevraagd voor den pols als maatstaf voor den toestand en de vereischte behandeling bij tuberculose.

F. D. SANER. *Transcondylar fractures of the humerus in children*. — Nauwkeurige repositie, onder Röntgen-contrôle, geschiede door trekken aan den gestrekten onderarm, waarna deze voorzichtig in maximaal gebogen stand wordt gebracht en daarin door kleefpleisters gehouden. Na 7 tot 10 dagen komt de onderarm in rechten hoek in mitella en worden actieve bewegingen aangemoedigd. Massage en passieve beweging zijn af te raden ter voorkoming van te veel callus. Lukt de repositie niet terstond, dan operatieve behandeling; eveneens bij gevaar voor de circulatie door weefselspanning.

ALEX E. ROCHE. *Vesical calculus with paraffin nucleus.* — Afkomstig van was, waarmede een bougie voor het oprekken was ingevet.

GEOFFREY T. BAKER. *A case of general paralysis with benign tertian malaria.* — Ongunstig beloop niettegenstaande de patiënt spontane malaria had.

J. PINKHOF.

Wiener klinische Wochenschrift. 1926, No. 45.

Klinische Vorträge. Z. HABERLANDT. *Das Hormon der Herzbewegung.*

Originalabhandlungen. F. M. GROEDEL und G. HUBERT. *Der Wert der interferometrischen Blutuntersuchung für die Differenzierung der endogenen Fettsucht.* — Indien men door bloedonderzoek nagaat, welke endocrine klieren een verhoogde ontleding ondergaan, kan men hieruit tot een hypofunctie van die klier besluiten. Toediening van het zoo gevonden orgaanpraeparaat is dan dikwijls voldoende tot bestrijding der endogene vetzucht.

CARLA ZAWISCH-OSSENITZ. *Ueber Förderung des Knochenwachstums durch Injektion von Knochenextrakt.* — Extract van jong groeiend beenweefsel werd ingespoten bij jonge konijnen en daarna nagegaan, of de beengroei bevorderd werd. Indien de voedingsverhoudingen gelijk waren, was het been volstrekt en betrekkelijk grooter en zwaarder, doch het kalkgehalte daarmede niet evenredig gestegen. De mogelijkheid, dat dit laatste een fout was van de inrichting der proeven (het been werd onmiddellijk na den dood in formalalcohol gefixeerd), wordt opengelaten.

E. W. VIOLIN. *Die Prognose des Coma diabeticum in der Vor-Insulinzeit und bei Insulintherapie.* — Een statistische vergelijking tusschen de jaren 1921 en 1913 tegenover 1924 en 1925, wat betreft de comateuse diabeteslijders in de kliniek van WENCKEBACH, waaruit het gunstig gevolg van de behandeling met insuline duidelijk blijkt. Het welslagen was bij mannen veel grooter dan bij vrouwen.

W. SCHLOSS. *Ueber einen Fall von Massenblutung ins Nierenlager.* — Een vrouw met niertuberculose kreeg onder hevige pijn en temperatuurstijging een intracapsulair renaal haematoom en kon door nier-exstirpatie gered worden. Het ziektebeeld is bekend als perirenale apoplexie (WUNDERLICH), maar komt zeer zelden voor, nog het minst bij tuberculose.

TH. MIRONESCIER und E. FARKAS. *Erfahrungen bei einer Masernepidemie.* — Bij de beschrijving van deze epidemie, welke voornamelijk volwassenen betrof, treft ons in het bijzonder, dat de leucopenie geenszins regelmatig aanwezig was en dat ook de diazoreactie zeer dikwijls negatief was.

G. LUDEWIG. *Beiträge zur prämaturnen Schädelnathsynostose.* — Door röntgenologisch onderzoek is nagegaan, of bij jeugdigen een te vroege verbeening van de naden bestond. Het meest werd dat gevonden bij congenitale lues en vooral bij juveniele paralyse, bij genuïne epilepsie kwam het weinig voor. Intracraniale ontstekingen kunnen de vroegtijdige verbeening veroorzaken, vandaar het dikwijls voorkomen na encephalitis.

M. HIRSCH. *Ist die künstliche Thrombosierung varikös entarteter Beinvenen ohne vorherige hohe Ligatur der Vena saphena zulässig?* — Een waarschuwing tegen deze behandeling wegens het gevaar voor embolie.

G. NOBL. *Entgegnung zu obiger Darstellung.*

Richtlinien für die Praxis. M. OPPENHEIM. *Behandlung (Schnellkur) bei Skabies.*

H. KOCH. *Welche Bedeutung haben die neueren Forschungen auf dem Gebiete der spezifischen Hautdiagnostik und spezifischen Prophylaxe der Masern für die Praxis?*

WAGNER JAUREGG. *Necrologie.* EMIL KRAEPELIN. — Een herinneringswoord aan den Duitschen psychiater.

FINGER. *Necrologie* SAMUEL EHRMANN. — ERHMANN 1854—1926 was titulair hoogleraar in de huidziekten, hoofd van de afdeeling van het ziekenhuis Wieden.

J. ED, ST,