

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

La Presse médicale. 1927, No. 26.

J. L. FAURE. *Le MIKULICZ en chirurgie intestinale.* — Bij gynaecologische operaties wordt het nut van het gebruik van den tamponzak volgens MIKULICZ algemeen erkend; FAURE zou dezen echter ook bij andere buikoperaties, in het bijzonder die aan den darm, bij welke steeds infectie is te duchten, niet meer willen missen. Met getallen toont hij aan, hoezeer ook hier de sterfte is gedaald, sinds hij deze tamponnade toepast.

P. F. ARMAND—DELILLE et J. VIBERT. *Le diagnostic bactériologique de la tuberculose pulmonaire des jeunes enfants par l'examen du contenu gastrique.* — Hoewel MEUNIER haar reeds in 1898 beschreef, wordt deze methode nog weinig toegepast. De resultaten zijn sedert dien tijd nog aanmerkelijk verbeterd, sinds men voor het onderzoek den maaginhoud homogeen maakt; de techniek hiervan en van het geheele onderzoek wordt door de schrijvers uiteengezet. Zij verkregen bij 30.9 pCt. van de onderzochte, van tuberculose verdachte zuigelingen positieve uitkomst, somtijds ook, waar het klinisch en radioscopisch onderzoek negatief uitviel; slechts bij 20 pCt. van de negatieve gevallen werden radioscopisch tuberculeuse afwijkingen gevonden. Deze methode geeft betere resultaten dan het onderzoek van de faeces en het pharynxslim op tuberkelbacillen.

P. E. MORHARDT. *Les aliments, l'insuffisance de boisson et l'agitation physique comme cause de fièvre chez le nourrisson.* — Literatuuroverzicht.

La Presse médicale. 1927, No. 27.

CH. FOIX et J. MARIE. *La sclérose cérébrale centro-lobaire à tendance symétrique et l'encéphalite péri-axiale diffuse.* — Naar aanleiding van 3 nieuwe gevallen bespreken schrijvers uitvoerig het klinisch en anatomisch beeld dezer het eerst door PIERRE MARIE beschreven centrolobaire sclerose, waarvan zij twee typen onderscheiden: een chronisch verlopend type met defecten en een subacuut doodelijk verlopend type. Vele afbeeldingen.

V. HINAULT. *Pleurésie hémorragique au cours d'un pneumothorax artificiel.* — Een geval.

La Presse médicale. 1927, No. 28.

E. APERT et P. ROBIN. *La progeria (nanisme sénile de VARIOT); ses variétés cliniques.* — Aan de hand van een geval wordt deze vorm van dwerggroei uitvoerig besproken. Vele afbeeldingen.

J. GÉNÉVRIER et H. DESCOMPS. *A propos des faux tuberculeux: deux cas d'anévrisme de l'aorte considérés comme des tuberculoses scléreuses du poumon.* — Het klinische beeld geleek veel op dat van tuberculose, het radioscopische beeld bracht de werkelijke afwijking aan het licht.

A. RAVINA. *Le rôle du rein et de la surrénale dans l'intoxication diphthérique.* — Literatuuroverzicht. Zonder de rol van de hartspier te onderschatten schrijven vele onderzoekers het kwaadaardig beloop van diphtherie toe aan den toestand van nieren en bijnieren.

La Presse médicale. 1927, No. 29.

A. COURCOUX et R. GODEL. *Les colites acides des tuberculeux pulmonaires et leurs traitements.* — Na een uitvoerige bespreking dezer veelvuldig bij longtuberculose onder verschillend beeld voorkomenden vorm van colitis, haar verschijnselen, pathogenese en diagnostiek, wordt in bijzonderheden de behandeling uiteengezet: in de eerste plaats het bekende diët, voorts tegen de fermentaties carbonas calcicus, tegen de stase en constipatie hydras magnesiae, tegen de spasmen en pijnen belladonna, tegen de colitis adsorbeerende poeders (kool, kaoline, talk), bij dysenteriforme verschijnselen zetpillen met belladonna en cocaïne, lavementen met agar-agar enz..

G. LEVEN. *L'attitude, sa valeur diagnostique et sa valeur thérapeutique.* — LEVEN bespreekt de beteekenis van de houding voor de herkenning en behandeling van de maagverwijding en haar gevolgen.

J. SÉNÈQUE. *Résultats de la surrénalectomie dans les gangrènes spontanées des membres.* — Literatuuroverzicht. De operatie van OPPEL heeft niet aan de verwachtingen beantwoord en wordt zelfs in Rusland nauwelijks meer uitgevoerd.

P. SMIT.

Dermatologische Wochenschrift, No. 14 (Bd. 84) 1927.

E. RADNAI. *Primaire Hauttuberculose mit metastatischen periphlebitischer Herden.* — Een in de polsstreek gelegen primaire haard van exogeen ontstane verrucueuse huid-tuberculose was vermoedelijk de bron van waaruit langs haematogenen weg secundaire, periplebitishaarden op armen en beenen ontstonden.

STÜMPKE. *Ueber Erythema annulare centrifugum acutum multiplex.* — Hoewel het geval een acuut verloop had en van het begrip „multiplex” niet gesproken kon worden, behoort het beschreven ziektebeeld toch bij het erythema centrifugum annulare en DARIERIS Erythèmes papillo-circineus migrateurs of chroniques ondergebracht te worden.

BROSE. *Neue Taetowierungsphaenomene.* — Tatouages reageeren op mechanische, actinische en chemische prikkels met oedemateuse opzwellung der huid waardoor de plastiek der figuren duidelijk wordt. De invloed van gelijksoortige prikkels was op de blauwe en op de roode deelen der teekening ongelijk.

H. MUEHLFORDT. *Gleitzeitiges Vorkommen von spitzen Kondylomen und Warzen im Gesicht nebst Keloidbildung.* — Al naar den bouw van het voedingsgebied waar het vasten voet krijgt, ontstaan uit het virus der wratten verschillende woekeringen. Op de slijmvliezen ontstaan in den regel condylomata acuminata; of nabij op de normale huid verucae vulgares, terwijl vooral bij jongere personen bijv. op de dunnere huid der handruggen verrucae plan. juven. ontstaan.

A. HAIM. *Ueber die Verwertung des Retroplazentarblutes für die Serodiagnose der Syphilis.* — Bij alle bevallingen dient eenig retroplacentairbloed in steriele droge buisjes opgevangen te worden en binnen 48 uren met een uitvlokkingsmethode en volgens WASSERMANN onderzocht te worden. Bestaat totale of eigen remming dan herhale men de reactie met aderbloed, tegen het einde van het normale kraambed, wanneer niet reeds eerder klinisch de diagnose lues gesteld kon worden. Was de complementbindingsreactie twijfelachtig maar de uitvlokkingsreactie geheel negatief, dan is herhaling niet noodig.

Dermatologische Wochenschrift, No. 16 (Bd. 84), 1927.

E. GOLDHAMMER. *Ratanhiasalbe als Ueberhäutungsmittel.* — Voor de epitheliëering van allerlei niet-geïnfecteerde torpide slecht genezende vlakke zweren gebruikt de schrijver gaarne de volgende zalf, waarmee de wonden 3 keer per dag worden verbonden: Entr. Ratanh 10. Thymol 1. Ungt. simpl. ad 100 gr..

H. G. ROTTMANN. *Die Teerbehandlung mit „flüssiger Kohle“.* — Tengevolge van de toepassing van het Bergiusprocédé (bereiding van petroleum, benzine enz. uit steenkool) kan binnenkort een teersoort van vrijwel constante samenstelling voor de dermatologen beschikbaar komen. Proeven toonden reeds de goede bruikbaarheid van het product aan in de eczeembehandeling, en zijn waarde als jeukstillend middel.

A. DOMBROWSKI. *Lichen ruber planus im Anschluss an Thalliumbehandlung.* — De lichenuitslag trad 6 d. na het innemen van 0.19 acet. thall. op. Op de mogelijkheid dat het thallium, waarvan aangenomen wordt dat het het sympathische zenuwstelsel prikkelt, de oorzaak is van het optreden dezer lichen wordt gewezen.

L. v. ZUMBUSCH. *Bemerkung zu dem Aufsatz van WRESZYNSKI über Impetigo herpetiformis beim Manne, mit schweren Gelenk- und Nagelveränderungen.*

E. WRESZYNSKI. *Schlusswort zur Mitteilung eines Falles von Impetigo herpetiformis.* — v. Z. twijfelt er niet aan of het als impetigo herpetiformis beschreven geval betrof in werkelijkheid een lijder aan psoriasis pustulosa. W. erkent de diagnose psoriasis ook even te hebben overwogen, maar een collega welke gevallen van

impetigo herpetiformis herhaaldelijk (!) had gezien, vond dit het juiste etiket.

GRSCHEBIN. *Illustration der Sittensyphilis (syphilis insontium) im Gouvernement Smolensk.* — Mededeeling van zich door kwaadaardig tertiarius kenmerkende gevallen van lang over het hoofd geziene syphilis insontium, benevens gevallen van gezinssyphilis welke in sommige russische gebieden vrij alledaagsch schijnen te zijn.

Dermatologische Wochenschrift. No. 17 (Bd. 84), 1927.

E. HARTMANN. *Kasuistischer Beitrag zum Granuloma teleangiectodes sive pediculatum.* — Mededeeling over vier gevallen. Afbeeldingen van den anatomischen bouw.
N. MELCZER und O. DAHMEN. *Ueber die Wirkung des Neosalvarsans auf die Bildung der Immunkörper.* — De verrichte onderzoeken toonen aan dat het in de ader gespoten neosalvarsaan slechts een actiotrope, primaire werking bezit. In gevallen van manifeste syphilis met haardreacties en het optreden van koorts als gevolg der inspuiting, speelt de hypothetische ictus immunisatorius intusschen wellicht ook een zekere rol.

P. G. RINSEMA.

Wiener klinische Wochenschrift. 1927, No. 16.

Originalabhandlungen. P. SAXL. *Das Sepsisproblem.* — Een bespreking van de mogelijke oorzaken van sepsis waarbij de grootste waarde toegekend wordt aan de opgeheven verdediging van het lichaam door insufficiëntie van het reticuloendotheliale systeem.

S. WASSERMANN. *Der aortale Hochdruck und sein Mechanismus.* — De gevallen van hypertensie, welke met afwijkingen in de aorta gepaard gaan, worden verklaard als een gevolg van een aorta bulbair vaatreflex waarbij de opstijgende prikkel langs den n. sympathicus centripetaal geleid wordt en over den bulbus tot vaatcontractie reflecteert.

EMMY REICH und J. TEICHMANN. *Zur Frage der Prophylaxe des Scharlachs.* — Laat men een roodvonklijder hoesten tegen een bloedagar plaat, dan gelukt het regelmatig om op deze plaat kolonies van streptococcus haemolyticus te kweken. Tijdens de reconvalescentie neemt dit aantal kolonies geregeld af. Mogelijk is op deze wijze na te gaan wanneer de genezende niet meer besmettelijk is.

F. MANDL. *Zur Pathologie und Therapie der Schaden der Kniegelenks-Zwischenknorpel.* — Gesteund door een ervaring op 62 geopereerde lijdens wordt een overzicht gegeven van de traumatische en niet-traumatische afwijkingen van het kraakbeen in het kniegewricht.

K. P. EISELSBERG. *Plasmochinvergiftung.* — Mededeeling van een geval waarbij na kleine hoeveelheden plasmochine (0.2 gr. in verloop van 5 dagen) een ernstige haemolyse ontstond met methaemoglobine in serum en urine, lever- en miltzwellings, galkleurstof in serum, urobiline in urine. Genezing na bloedtransfusie.

A. Löw und R. PFEILER. *Ueber den Einfluss des Chinins auf den diabetischen Stoffwechsel.* — Door kleine hoeveelheden chinine kan men in geringe mate bij gezonden, doch krachtiger bij diabeteslijders het bloedsuikergehalte verminderen; bij diabetici daalt tevens het gehalte aan ketonstoffen. In de dierproef wordt door groote hoeveelheden chinine het suikergehalte verhoogt.

E. MEISELS. *Kreuzschmerzen bei Frauen.* — Totaanvulling van het artikel van KERMAUNER (*W. kl. Ws.*, 1927, No. 1) wijst MEISELS op de lendenpijnen bij het spondylolisthetische bekken, waarbij dus de lendenwervels in voorwaartsche richting op het heiligbeen verschoven zijn.

Richtlinien für die Praxis. A. MAYHOFER. *Therapeutische Grundlagen der Rezeptur vom Standpunkte pharmazeutisch-technischer Arbeitsweise.*

J. ED. ST.

Medizinische Klinik. 1927, No. 16.

H. CURSCHMANN. *Zur Diagnose unklarer Kachexien.* — Voordracht. Naar aanleiding van een geval van cachexie na een bevalling, worden de verschillende oorzaken, vooral die, welke in het gebied der inwendige afscheiding liggen, van cachexie besproken.

FINSTERER. *Früh- und Spätresultate der operativen Behandlung des Magen- und Duodenalgeschwürs.* — Slot.

W. WIECHOWSKI. *Die Bedeutung der schweiztreibenden Tees.* — Schrijver bereidde werkzame glycosiden uit de flores Chamomillae, Sambuci en Tiliae. De vermindering in gewicht der patiënten, nadat zij eenigen tijd in een zweetkast hadden vertoefd, bleek duidelijk grooter te zijn, wanneer tevoren deze glycosiden waren toegediend, dan wanneer het zweeten alleen door de warme lucht werd opgewekt.

R. FISCHL. *Eindrücke von der diesjährigen Grippeepidemie.*

G. ROSENFELD. *Zur Harnverhaltung bei Nierensteineinklemmung.* — Nadat de anurie, die 3 dagen had bestaan, door atropine was opgeheven, trad er sterke wateren stikstofuitscheiding op. Daarentegen bleek de NaCl-uitscheiding sterk gestoord. Daarbij waren er massa's nierepitheliën in de urine. Deze ontblooting van epitheel (met goede glomerulus- en gestoorde tubuli-functie) is te vergelijken met de proefondervindelijke uraanephrose. Vermeldenswaard is nog de slechte phenol-sulfophtaleïne-uitscheiding (slechts 22 pCt.), die dus een tubuli-functie is.

N. ORTNER. *Plötzlicher Atemstillstand bei tabes dorsalis.* — Naar aanleiding van de door KRÜSKEMPER medegedeelde gevallen (*Med. Klin.* 1927, No. 12) wijst ORTNER erop, dat hij in zijn „Symptomatologie innerer Krankheiten” reeds twee soortgelijke gevallen beschreef.

K. TROMMER und W. HEBENSTREIT. *Klinischer Beitrag zur Trichinose.* — Beschrijving van de waargenomen ziektegevallen in de epidemie van Mei 1926 in Vogtland.

H. METZGER. *Ueber Nierenbefunde beim Coma diabeticum.* — In de 17 onderzochte gevallen werd slechts tweemaal een pathologisch-anatomische afwijking gevonden, die voldoende verklaring gaf voor de uraemische verschijnselen, die bij comā diabeticum worden gevonden (verhooging van de Rest-N. in het bloed e.d.). Deze afwijkingen waren dan nog ontstekingen door andere oorzaken (acute nephritis bij tonsillairabsces en nierabscessen bij etterige cystopyelitis en cholecystitis). In de andere gevallen zag men alleen de typische glycaemische en lipaemische nephrose met hier en daar bloedingen.

E. SAALFELD. *Zur Syphilisbehandlung.* — Schrijver waarschuwt er voor geen plaatselijke behandeling (ook niet met zoogenaamd indifferente zalven) toe te passen, alvorens de spirochaeten gevonden zijn.

P. UHLENHUTH und E. HERMANN. *Neue Untersuchungen über die Umwandlung der Spirochaeta pseudoicterogenes (Wasserspirochaete) in die Spirochaeta icterogenes (Erreger der Weilschen Krankheit).* — Ook zonder bemiddeling van de rat is deze variatie mogelijk.

L. FREUND. *Weitere Unterschiede zwischen Kopf- und Kleiderlaus.* — Door afbeeldingen toegelicht.

B. GLESINGER. *Erfahrungen mit Yatren-Casein bei Neuralgien und Neuritiden.* — Deze luiden zeer gunstig.

P. HERSZKY. *Erfahrungen mit Oevelin.* — Dit is een aanbevelenswaardig wrijfmiddel.

A. HARTUNG. *Ueber das Thyroxin als Entfettungsmittel.* — Dit middel is zeer nauwkeurig te doseeren en gelijkmatig in werkzaamheid.

Aus dem Arbeitsgebiet des Schularztes.

I. HOFFA. *Pädiatrische Gesichtspunkte bei der schulärztlichen Begutachtung.* — Antwoord op het artikel van KARGER in *Med. Klin.* 1927, No. 4.

P. KARGER. *Bemerkungen zu den Vorstehenden Ausführungen.*

Aus dem Arbeitsgebiet des Sportarztes.

W. BAETZNER. *Ueber Sportschaden am Bewegungsapparat.* — Over beschadiging van den meniscus.

F. HAUROWITZ. *Neuere Ergebnisse der Vitaminforschung.* — Overzichtsreferaat.

P. VAN PAASSEN.

The Lancet. No. 5407, 16 April 1927.

A. H. SOUTHAM and E. R. A. COOPER. *Pathology and treatment of the retained testis in childhood.* — Anatomisch onderzoek van achtergebleven testes toonde

aan, dat vóór de puberteit geen andere afwijkingen bestaan dan een vermindering der hoeveelheid parenchym tegenover stroma; het parenchym is uit gezonde cellen opgebouwd. De verandering is sterker naarmate de bal dichter bij de buikholte zit. Na de puberteit gaat parenchym afwijken door ontbreken der spermatogenese en degeneratie der buisjes. De afwijkingen moeten als secundair gevolg van het achterblijven worden opgevat. Operatie moet daarom vroeg geschieden; verlenging der zaadstreng wordt verkregen door klieven van spieren en fascia met behoud der vaten. Van 50 operaties 36 geheel gelukt.

L. B. COLE. *The use of Lugol's iodine in exophthalmic goitre.* — Werking onderzocht in 19 gevallen. Bij 16 daalde de grondstofwisseling tot normaal in enkele weken, bij een deel volgde daarna langzame stijging, doch minder snel dan na ophouden met jodium; gewichtstoename en subjectieve verbetering hielden aan. De 3 welke slecht reageerden hadden vaste, nodeuse schildklieren. Hierbij, en indien het gewicht niet spoedig gaat stijgen, bestaat tegenaanwijzing. De gift is 3 maal daags 5 druppels der oplossing (5 pCt. jodium en 10 pCt. joodkali).

S. RUSS and G. M. SCOTT. *The growth of tumour in tissues exposed to x-rays and radium.* — In bestraalde huid groeit ratten-sarcoom langzamer dan in normale. Bestraalde huidgedeelten in de nabijheid van de inplantingsplaats van het gezwel worden door het voortgroeïende gezwel vermeden.

W. R. WISEMAN. *Outbreak of enteritis near Glasgow.* — Beschrijving van de kweek- en serologische proeven, waardoor de oorzaak van een kleine dysenterie-epidemie bij Glasgow werd vastgesteld als de SONNE-dysenteriebacil.

J. BAMFORTH. *Two cases of undulant fever occurring in England.* — Van beide patiënten, die leden aan langdurige koorts met golvende kromme, agglutineerde het bloed bacillus abortus, waarvan de besmetting door koemelk wordt aangenomen.

GEOFFREY BEWLEY and ERIC S. HORGAN. *Meningitis associated with B. Proteus.*

MATTHEW MASSER. *Iodism.* — Halsklierzwellling met oedeem van keel en conjunctiva na drie dagen gebruik van 0.6 gr. joodkali dagelijks door een nierlijder.

I. R. ROSIN, *Post-mortem caesarian section.* — Levend kind, asphyctisch ter wereld gebracht 15 minuten na dood der moeder aan eclamptische hersenbloeding.

The Lancet. No. 5408, 23 April 1927.

SIR CHARLTON BRISCOE. *The muscular mechanism of respiration and its disorders, III.* — Behandelt de klinische gevolgen van veranderd adëmhalingstype en hun behandeling. Wordt afzonderlijk gerefereerd.

H. GARDINER-HILL and J. FOREST SMITH. *Menorrhagia as a symptom of myxoedema.* — Van 59 myxoedeem-patiënten hadden 33 deze ziekte vóór de menopause, en deze leden bijna alle aan menorrhagie. Daar de ziekte na de natuurlijke menopause ontstond, ging geen menorrhagie vooraf. Na kunstmatige menopause wegens menorrhagie ontstond in veel gevallen myxoedeem.

ALAN H. TODD. *The possibilities of operation in infantile paralysis.* — In de eerste drie jaar moet mogelijk herstel der getroffen spieren worden afgewacht, waarbij rekking dezer spieren moet worden voorkomen door spalken. Aanwijzingen der operaties (peesverplanting, arthrodesse, tenotomie, myo-, capsulotomie).

LAMBERT ROGERS. *Suppurative thyroiditis.* — Beschrijving van het ziektebeeld en twee gevallen.

BEATRICE TURNER *Two cases of advanced carcinoma of the stomach* — Grote gezwellen die geen klachten hadden veroorzaakt.

DONALD PATERSON. *Cream in infant feeding.* — Room geeft, indien het al wordt verdragen, bij de geringste stoornis tot ernstige darmaandoeningen aanleiding. Toevoeging aan het voedsel is nooit noodig.

H. MERRICK BOSTON. *Two cases of bubonic plague.* — In Liverpool. Eerste diagnose post mortem.