

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1927, No. 24.

O. v. VERSCHUER. *Aufgaben und Ziele der menschlichen Erblchkeitslehre.* — Inaugureele rede.

J. KAUP, P. GOTTHARDT, E. HOFERER und H. SPATZ. *Aerztlich-hygienische Untersuchungen anlässlich der deutschen Skimeisterschaft 1927.* — Niet kort samen te vatten waarnemingen bij de deelnemers van dit jaar vóór en na den wedstrijd.

R. VON DEN STEINEN. *Zur Behandlung der kindlichen Lues mit Spirocid.* — Het stovarsol van LEVADITI is door de Höchster Farbwerke onder den naam spirocid in tabletten in den handel gebracht; het bevat 27 pCt. arsenicum. VON DEN STEINEN beveelt het warm aan voor de behandeling van luetische zuigelingen en kinderen; hij begint met $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ tablet van 250 mgr. een half uur vóór het eerste fleschje, telkens 7 dagen achtereen, 7 dagen pauze enz., drie maanden lang; bij zuigelingen stijgt hij snel tot 1 tablet, bij kinderen van 3 jaar tot 2 tabletten. Hij nam geen ongewenschte bijwerkingen waar, de algemeene toestand verbetert snel, de verschijnselen verdwijnen snel, bij 8 van de 9 gevallen waren na 3—4 maanden de seroreacties negatief. In elk geval herhaalt hij na 1—3 maanden de kuur, zoonoodig nog een derde maal. Hij beveelt aan alle kinderen van luetische ouders ook zonder verschijnselen dadelijk na de geboorte te behandelen.

H. BECKER. *Erfahrungen mit Saproviton.* — Dit praeparaat, dat naar het heet onschadelijke levende saprophyten bevat, werd door BECKER bij 15 patiënten aan tabes, paralyse enz. als koortswekkend middel intraveneus toegepast. Het verwekt inderdaad een koortsaanval met koude rilling en oefende bij eenige patiënten een gunstigen invloed uit; BECKER heeft echter het gebruik gestaakt, sinds hij een patiënt aan acute saprophytensepsis verloor.

E. HOFMANN. *Klinische Erfahrungen mit Myosalvarsan.* — Myosalvarsan is een salvarsaanpraeparaat, dat intramusculair, desnoods onderhuids kan worden toegediend. De inspuiting veroorzaakt wel eenige, doch geen belangrijke pijn; necrosen enz. nam HOFMANN op 480 inspuitingen niet waar, de onmiddellijke invloed op de spirochaeten en de syphilitische verschijnselen komt ongeveer overeen met dien van de intraveneuse neosalvarsaaninspuiting, over den invloed op den duur heeft HOFMANN nog geen ervaring. Hoewel het de intraveneus toegediende salvarsaanpraeparaten niet verdringen zal, is myosalvarsan het praeparaat bij uitstek, waar de intraveneuse inspuiting bemoeilijkt of tegenaangewezen is.

K. CSÉPAI und S. VON PINTER-KOVÁTS. *Ueber den Einfluss des Insulins auf die Blutdruckwirkung des Ephedrins beim Menschen.* — Insuline wijzigt den invloed op den bloeddruk van ephedrine niet (dit is voor de bloeddrukwerking van adrenaline wel het geval).

SCHNITTER. *Zur Epidemiologie und Klinik der Bacillus-suipestifer-Erkrankungen des Menschen.* — Onderzoekingen gedurende de epidemie te Offenbach.

F. SCHMITZ. *Perityphlitis oder Typhus? Ein Beitrag zur Differentialdiagnose.* — Een geval van typheuse pseudoappendicitis, waarbij operatief een gezonde appendix verwijderd werd. De agglutinatieproef viel toen nog negatief uit, het koortsverloop was door antipyretische middelen atypisch geworden, er bestond echter een sterke leucopenie. In twijfelachtige gevallen lette men dus zorgvuldig op het bloedbeeld en geve men geen antipyretica.

S. BÉN SCHABETAI. *Scharlachheilserum bei Erysipel.* — Bij 11 gevallen van erysipelas werd het nieuwe roodvonkserum der BEHRING-werke toegepast. Den dag na de inspuiting van 20 cM³ waren bij alle op één na de temperatuur bijna normaal, de algemeene toestand veel verbeterd en herstelden ook de plaatselijke verschijnselen snel.

H. U. KALLIUS. *Ein Hämolympfangioma cavernosum mixtum der Mamma.* — Afgebeeld.

A. HEYN. *Ueber Säuremessungen im Scheidensekret bei zervikaler Gonorrhoe und den diagnostischen Wert der Gonotestreaktion.* — HEYN vond de zuurverhoudingen in het secreet der vagina bij gonorrhoe in geen opzicht verschillend van die bij andere niet-gonorrhoeïsche ziekten. Het heeft dus geen zin dit onderzoek voor de herkenning van chronische gonorrhoe te gebruiken.

THEDERING. *Röntgendosierung in äer Hautpraxis.*

G. FREY. *Die Verwendung der Klebrobinde bei der Behandlung des kongenitalen Klumpfusses im Säuglingsalter.* — De methode wordt door afbeeldingen verduidelijkt.

W. KAUPE. *Grippe, Veitstanz und Luminal.* — Bij een 9-jarig meisje volgde op een griepaanval een ernstige chorea, die snel verbeterde na het gebruik van 4—6 luminaltabletten van 15 mgr. daags.

La Presse médicale. 1927, No. 46.

L. BERNARD et NÉLIS. *Les travaux français sur la filtrabilité du virus tuberculeux et le problème de l'hérédité tuberculeuse.* — Uitvoerig literatuuroverzicht.

P. HARTENBERG. *Les mécanismes possibles des accidents épileptiques.* — Het wezenlijke van den epileptischen aanval acht HARTENBERG de bewustzijnsstoornis, gevolg van een remming van de functie van de hersenschors. Ter verklaring van het mechanisme van deze bestaan drie theorieën (de toxische, de circulatorische en de dynamische), van welke HARTENBERG het voor en tegen uiteenzet. Volgens hem zijn voor de laatste de beste argumenten aan te voeren.

TH. KUCHARSKI. *L'influence diurétique de l'extrait de lobe postérieur d'hypophyse chez l'homme.* — Volgens de onderzoekingen van KUCHARSKI beperkt dit extract de urinesecretie en verhoogt het de concentratie. Dit is het sterkst het geval, indien men het des ochtends onderhuids inspuut, minder, indien men het des avonds onderhuids inspuut, het minst, indien men het intraveneus inspuut.

La Presse médicale. 1927, No. 47.

PASTEUR VALLERY-RADOT, P. A. CARRIÉ, P. BLAMOUTIER en M. LAUDAT. *Urticaire et phénomènes de choc déclenchés par l'effort musculaire; étude pathogénique et thérapeutique.* — Een patiënte vertoonde na elke spierinspanning van eenig belang een crise hémoclasique, gevolgd door urticaria, somtijds asthma, en begeleid door ernstige schokverschijnselen. Deze lieten zich voorkomen door een intraveneuse inspuiting van bicarbonas natricus. Toch was de oorzaak niet in de acidose te zoeken, daar toediening per os van dit zout in een hoeveelheid, die het bloed meer alcalisch maakt dan de intraveneuse inspuiting, dezen invloed niet had; hier is de anticlasische werking van bicarbonas natricus in spel, welke ook hyposulfis natricus bezit. Door de intraveneuse inspuiting van 100 cM³ van een 4 pCt. oplossing van hyposulfis natricus konden de aanvallen maanden lang onderdrukt worden.

P. L. VIOLLE et P. DUFOURT. *Action des eaux minérales sur les colloïdes cellulaires et le mécanisme de la diurèse.* — Schrijvers hebben in vitro den invloed bestudeerd van diuretische en niet-diuretische bronwateren op de kikkerspier en trachten uit hun uitkomsten de werking dezer wateren op de diurese te verklaren.

J. MOUZON. *La sérothérapie de la scarlatine.* — Literatuuroverzicht.

P. SMIT.

Medizinische Klinik. No. 24, 1927.

I. SNAPPER. *Niere und Coma diabeticum.* — Afbraak der ketonlichamen geschiedt in de nieren en de ledematen, gedeeltelijk in de spieren. De nieren scheiden niet alleen uit, oxydeeren ook. Is deze werking der nieren gestoord, dan ontstaat er coma diabeticum met ongunstige prognose voor de insulinebehandeling.

GOLDSCHIEDER. *Arhythmie und Pulsresonator.* — Het tijdverloop tusschen twee opeenvolgende polsslagen is, althans na beweging, zelden precies gelijk (proeven van MOSLER). Daarom is van de polsresonator van KRAUS-GOLDSCHMIDT weinig te verwachten, omdat daarbij een slinger, die op een zeker polsrhythme afgestemd is, in beweging moet worden gebracht.

K. OCHSENIUS. *Ueber milchlose Kost darmempfindlicher Säuglinge in der Praxis.* —

Het is mogelijk de voeding bij zuigelingen zoo te regelen dat er geen melk wordt gebruikt en toch het voedsel aan alle eischen voldoet.

A. TAGESSON MÖLLER. *Ueber die heilgymnastische Behandlung der spinalen Kinderlähmung.* — Vroegtijdig begonnen, zeer ijverig en lang voortgezette behandeling met heilgymnastiek onder volledige medewerking van den patiënt is in staat zeer goede resultaten te geven.

E. SAALFELD. *Zur Behandlung des Haarausfalles.* — Aanprijzing van het Humag-solan.

G. H. SCHNEIDER. *Völlige Resorption von Frucht und Placenta nach kriminellern Abort infolge eitriger Einschmelzung innerhalb der Gebärmutter.* — Goed verloop na opening van het groote intra-uterine absces.

K. FAHRENKAMP und H. NOCKE. *Zur Kenntnis der Kreislaufwirkung bei der kombinierten Digitalis-Cardiazol-Coramin-Behandlung.* — In doorstromingsproeven met kikkerpooten kon vaatvernauwenden en verwijdenden invloed van cardiazol en coramine in verschillende verdunningen worden vastgesteld. Dat deze middelen de digitaliswerking versterken wordt niet alleen veroorzaakt door een invloed op het hart zelf, maar evenzeer door een vaatwerking.

F. JOACHIM. *Kombinationstherapie mit Coramin.* — Aanprijzing van het volgende recept in gevallen van griep e.d.: R) Codein. phosphor. o.i. Infus. Ipecac. 0.6/160.0 Natr. jodat. 2.0—3.0 Coramini liq. 8.0—10.0. Syr. simpl. ad 200.0 MDS. o. b. h. c.

LITTAUR. *Ueber Brothyralpräparate.* — D.i. moutextract, met herba thymi, radix primulae en ipecacuanhae, zoo noodig met codeïne of bromoform. Bij hoesten door allerlei oorzaak gebruikte schrijver deze middelen met genoegen.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete des Versicherungswesens.

W. BRANDIS. *Kopfschmerzen nach 2 Jahren nicht Folgen einer Wangenverletzung.* — Er bleek een voortschrijdende luetische infectie te bestaan, met verschijnselen van tabes dorsalis.

P. VAN PAASSEN.

The Lancet. No. 5416, 18 Juni 1927.

BECKWITH WHITEHOUSE. *Some problems of the menstrual function.* — Uit vergelijking met zoogdieren blijkt dat de menstruatie bestaat in het door necrose verloren gaan van de decidua der op onbevruchte ovulatie volgende „pseudogaviditeit”; gelijktijdig bestaat congestie overeenkomende met het pro-oestrum. De groei en instandhouding dezer decidua is gebonden aan de functie van het stratum granulose der follikels, dat na ovulatie doorgroeit tot het corpus luteum, dat bij den dood van het onbevruchte ei degenereert (en eerst dan geel wordt). Volgens operatie-waarnemingen treedt, terstond na verwijderen van rijpende follikel of corpus luteum, menstruatie in. Een goed hormoon-product ter regeling van gestoorde menstruatie moet uit rijpende corpora lutea worden bereid. Bij menstruatiestoornis worden doorgaans gedegeneerde corpora lutea of ongebarsten follikels gevonden.

J. B. DAVEY and L. E. H. WHITBY. *Some difficulties in the diagnosis of acute leukaemia.* — Uit de beschreven gevallen wordt opgemaakt, dat onderscheid tusschen myeloblasten en lymfocyten niet steeds mogelijk is, doch dat voor acute myelose pleit een sterke verandering in het roode bloedbeeld (megaloblasten); bij volwassenen pleit een hoog leucocyten getal (boven 30000) en een zeer groote milt in acute gevallen voor het voorafgegaan zijn van een latent chronisch tijdperk, dat bijna alleen bij lymphatische leucaemie wordt gevonden. Bij myelose komen hooge cijfers ook bij primair acute gevallen voor.

A. P. CAWADIAS. *Sulphur metabolism in arthritis deformans.* — Overzicht van wat bekend is omtrent zwavel-stofwisseling. Bij arthritis blijkt de hoeveelheid zwavel in de urine ten opzichte van stikstof verhoogd; de verhouding van ongeoxydeerde zwavel tot de totale is vrijwel normaal, de hoeveelheid aetherzwavelzuren iets verhoogd. Een en ander wijst op de storing in de stofwisseling der zwavelhoudende eiwitstoffen (in kraakbeen en bindweefsel sterk vertegenwoordigd); bij genezing onder behandeling met colloïdale zwavel bleken de genoemde afwijkingen verdwenen.

H. MORELAND Mc. CREA. *Retinal petechiasis, a curable condition causing blindness.* — Een vorm van bloeditstorting in het netvlies, niet het gevolg van vaatverande-

ringen, hypertensie of thrombose, waarbij de vaten intact blijven. Steeds worden septische haarden gevonden, (gebit, tonsillen, urinewegen), na welker verwijdering de aandoening doorgaans geneest. Soortgelijke bloedingen per diapedesin komen voor in urinewegen, maag en duodenum alwaar zweervorming het gevolg kan zijn.

W. STORM VAN LEEUWEN, W. EINTHOVEN and W. KREMER. *The allergenproof chamber in the treatment of bronchial asthma and other respiratory diseases.* — De beschrijving en theorie, welke den Hollandschen lezer bekend mogen worden geacht.

JOHN MACQUEEN. *Four cases of tetanus following intramuscular injection of quinine.* — De eenige mogelijke bron voor de sporen moet de huid op de inspuitingsplaats zijn geweest. De schrijver weet geen middel om deze kans te ontgaan, en waarschuwt daarom tegen dezen weg van toediening.

E. E. LASLETT. *Auricular fibrillation of fifteen years duration.* — Bij mitralisgebrek.

F. R. CURTIS. *Epilation by thallium acetate.* — Het zout blijft even werkzaam bij bewaren in oplossing. Waarschuwing tegen herhaling der inspuiting binnen drie maanden, daar de eerste inspuiting gevoeliger maakt voor een volgende.

J. PINKHOF.

Wiener klinische Wochenschrift. 1927, No. 24.

Originalabhandlungen. E. EPSTEIN. *Beitrag zum Antivirusproblem.* — Niet-tegenstaande vrij veel voorkomende mislukkingen wordt de geneeskrachtige werking der cultuurfiltraten niet ontkend. De opgaven van BESREDKA eischen verbetering in zooverre, dat de belemmering van den groei in de filtraten niet typisch is en in de tweede plaats moet een antigeenwerking aangenomen worden, daar men met de filtraten actief kan immuniseeren (typhus).

E. PRISAK. *Neue Untersuchungen über die Halogenlösung nach ALBRECHT ULZER.* — De jood-chloor-fluorium-oplossing is slechts werkzaam zoo lang zij nog bruin gekleurd is; zij is een goed steriliseermiddel voor gummiartikelem, onbruikbaar voor intraveneuse inspuiting (thrombose) maar overigens weinig schade toebrengend aan de weefsel. Tuberculeuse zweren worden slechts tijdelijk verbeterd maar niet specifieke zweren genezen snel.

T. KOCH. *Zum Vorkommen der Mischgeschwülste am weichen Gaumen.* — Beschrijving van een geval en overzicht van de gepubliceerde gezwellen.

A. WOLFF-EISNER. *Aphoristische Bemerkungen über Kavernen.* — Naar aanleiding van een geval waarbij zeer vroeg een caverne ontstond, welke door de onmiddellijk aangelegde pneumothorax in ongeveer 6 weken genas, wordt aangeraden om bij cavernen zeer vroegtijdig de pneumothoraxbehandeling toe te passen. Naar aanleiding van de discussie in Berlijn, toen dit stuk werd voorgedragen, wordt gewezen op de overschatting van de röntgendiagnostiek voor longtuberculose!

G. ARANY. *Gehört der Diabetes in das Bereich der Balneotherapie.* — ARANY betoogt, dat de moderne therapie van de diabetis bij velen ten onrechte de meening verwekt heeft, dat men de balneotherapie nu wel kan missen. Enkele ziektegeschiedenissen moeten bewijzen, dat men in Karlsbad nog wel verbetering kan verkrijgen als de huis of sanatoriumkuur mislukt.

K. LINDNER. *Einiges über den Unterricht und die Forschung in der Augenheilkunde.* — Slot.

F. SCHÜRER WALDHEIM. *Untersuchungen über ante- und postoperative Jodbehandlung bei Morbus-Basedowii.* — De krop van de dertien geopereerde gevallen werd histologisch onderzocht en men gelooft uit dit onderzoek te mogen besluiten, dat door de voorafgaande jodiumbehandeling het proces in een meer inactieven vorm is overgegaan.

L. LURZ. *Beitrag zur Behandlung der Oesophagusstrikturen.* — Opmerkingen op de verhandeling van KISS (*W. kl. Wsch.* 1926, no. 47) betreffende het inbrengen van een draad langs de vernauwing.

Richtlinien für die Praxis. J. SCHUTZLER. *Wann Soll man Haemorrhoiden operieren.*

O. PORGES. *Die diagnostische Bedeutung der Magenausheberung nach Probenahmezeit.*

J. ED. ST.