

# LITERATUUR-OVERZICHTEN.

## WEEKBLADEN.

### **Dermatologische Wochenschrift No. 29 (Bd. 85), 1927.**

C. STERN und P. GREVEL. *Ueber Erfahrungen mit der Epilation durch Thallium aceticum nach BUSCHKE.* — Gunstige ervaringen met deze methode welke de schrijvers thans bij kinderen boven de epilatie door middel van Röntgenstralen verkiezen.

O. THIES. *Schädigungen des Auges durch Licht.* — Twee artsen en een scheikundige leden bij herhaling aan een hardnekkige conjunctivitis, metlichtschuwheid, blepharospasmus enz.. Bij nauwkeurige inspectie bleken op de cornea talrijke blaasjes voor te komen. Oorzaak was de stralende energie, bij de artsen van de Röntgenbuis, bij de scheikundige van een gewone gloeilamp uitgaande, welke op het onbeschermd oog had ingewerkt.

H. BEHDJET. *Die Trichophytie der Augenbrauen und der Wimpern und die seltenen Formen der Trichophytie.* — Casuïstische mededeeling omtrent deze schimmelziekte welke in de oogharen en de wenkbrauwen voorkwam. Verder vermeldt BEHDJET nog dat hij eens een ichthyosiforme en een psoriatische trichophytie heeft waargenomen.

E. KADISCH. *Zur Kenntnis der Serologie der Gonorrhoe.* — Nu hier en daar redelijk gunstige berichten verschijnen over de toepassing der complementbindingsreactie bij gonorrhoe, heeft KADISCH geprobeerd of wellicht door gebruik te maken van actief serum en van het antigeen van SCHERING de uitkomsten verbeterd konden worden. De uitkomsten waren in elk opzicht teleurstellend.

L. TAINGOLD und N. KALSADA. *Persönliche Prophylaxe venerischer Krankheiten nach zweijährigen Erfahrungen in der Prophylaxestation in Odessa.* — In twee jaren tijds bezochten 2800 mannen en 50 vrouwen deze van 8 u. n.m.—8 u. v.m. geopende inrichting. De joodsche bevolking maakte er meer gebruik van dan de overige. De uitkomsten waren bemoedigend. De vrees dat het geslachtsverkeer der jeugdige personen er door bevorderd zou worden vindt in de statistieken geen bevestiging.

### **Dermatologische Wochenschrift. No. 30 (Bd. 85), 1927.**

S. GRSCHEBIN. *Ein Fall von tiefer primärer Blastomykosis der Haut.* — (BUSSE—BUSCHKE). — Uitvoerige ziektegeschiedenis. De patiënt kwam met uitgebreide zweeren op het hoofd in behandeling en stierf later aan een pneumonie en pleuritis. In het tijdens het leven steriel verkregen pleuravocht werden door cultuur blastomyceten gevonden in reinkweek. Sectieverslag.

STÜMPKE. *Ueber Thallium aceticum-Epilation bezw. ihre Kombination mit Röntgenstrahlen.* — Deze gemengde methode waarbij dus zoowel de dosis van het thallium als die van de stralen ieder voor zich zeer verminderd kunnen worden, dient op een grooter materiaal nader beproefd te worden, maar zal dan wel de meest gevaarlooze en zekerste methode van epileering blijken te zijn.

C. A. HOFFMANN. *Eine einfache Elektrode zur Diathermiebehandlung der weiblichen Zervix.* — Afbeelding en beschrijving van het gebruik van het eenigszins lepelvormige instrument dat bij de liggende vrouw in de scheede gebracht wordt en onder de portio komt te liggen. De andere electrode wordt boven de bovenrand der schaamharen geplaatst.

Z. A. OSSIPOVA. *Intradermalreaktion bei Gonorrhoe.* — Onderzocht aan een materiaal van 86 vrouwen komt de schrijver tot het besluit dat de reactie met versch en goed getoetst gonococcenantigeen van BORSI en SCHERISCHORINA van groote waarde is voor de diagnose en de contrôle op het verloop der behandeling.

### **Dermatologische Wochenschrift. No. 31 (Bd. 85), 1927.**

A. BUSCHKA. *Verringerung bzw. Mangel an freier Salzsäure bei Sklerodermie.* — Bij vijf daarop onderzochte gevallen van sklerodermie, bleek vrij zoutzuur te ont-

breken of zeer verminderd te zijn. Ook de totale aciditeit was zeer afgenomen. Schrijver spoort andere onderzoekers aan om hierop in den vervolge te onderzoeken want het aantal gevallen dat één specialist te zien krijgt is te gering om gevolgtrekkingen te durven maken.

PH. KUHN und F. V. GRUNDHERR. *Nissotax ein neues Ungeziefervernichtungsmittel*. — Bericht over zeer gunstige ervaringen met dit door de firma HEIJDEN in Radebeul-Dresden in den handel gebrachte middel. Het is onschadelijk; de neten laten spoedig gemakkelijk los zoodat de ontluizing vlugger dan met andere middelen kan geschieden. Het praeparaat is reukloos, kleurloos en onbrandbaar.

S. V. SZENTKIRALYE. *Sekundäre Anämie nach einer Thallium-aceticum-Epilation*. — Bij een dertienjarigen jongen trad na toediening van het ontharingsmiddel na korten tijd een zeer duidelijke anaemie op. Pathologische vormen traden weliswaar in het bloedbeeld niet op, maar het geval is een aansporing om systematisch onderzoekingen van het bloed te doen bij de op deze wijze behandelde patiënten. De patiënt herstelde.

L. I. LITWAK. *Ein Fall von Epididymitis idiopathischen Ursprungs*. — De oorzaak van de epididymitis bij dezen patiënt die nooit gonorrhoe gehad heeft, kon niet gevonden worden. Kort overzicht van de betreffende literatuur.

H. LIPPERT. *Die Quellstäbchenbehandlung der weiblichen Gonorrhoe, ein technischer Fortschritt*. — De zich over twee jaren uitstrekkende ervaringen van den schrijver, met de partagonstaafjes (SANDCZ) luiden zeer gunstig.

A. LOMMEN. *Bemerkungen zu der Arbeit: „Schwere Nekrose nach HgCl<sub>2</sub>-Injektion“*. — Het bedoelde artikel is te vinden in no. 20, Bd. 84 en afkomstig van L. STEIN. LOMMEN brengt een mededeeling van NICOLAU (*Annal d. Malad. Vener.*) in herinnering en deelt zelf een soortgelijk maar minder ernstig verlopend geval mede. Het ziektebeeld treedt op wanneer de inspuiting in een arterie terecht is gekomen. Ook bij het inspuiten van oplosbare middelen passe men daarom de handgreep van LESSER toe.

P. G. RINSEMA.

### Medizinische Klinik. 1927, No. 32.

A. BUZELLO. *Ueber die Behandlung der septischen Allgemeininfektion*. — Voor- dracht.

S. WESTMANN. *Die Frauengymnastik und ihre Beziehungen zur Heilkunde*. — Schrijver is een groot voorstander van vrouwengymnastiek, ook in de zwangerschap en kort na de bevalling. De vaak geuite meening, dat door sterke oefening van de buik- en bekkenpijeren de weerstand der weeke deelen bij de bevalling grooter zou worden, is in strijd met schrijver's ervaring.

W. JAROSCHY. *Zur Frage der operativen Behandlung der chronischen nichtspezifischen Gelenkerkrankungen*. — In enkele met zorg uitgekozen gevallen is door operatie veel verbetering te verkrijgen.

J. FRIST. *Die Nabelschnurumschlingung als geburtshilfliche Komplikation*. — Pijnlijke weeën zonder dat de geboorte vordert, teekenen van asphyxie van het kind moeten een omstrengeling van de navelstreng doen vermoeden. Tijdig ingrijpen kan dan het kind nog redden. Beschrijving van een geval.

A. ADAM. *Ueber Insulin-Ersatz durch Synthalin bei schwererem Diabetes*. — Korte mededeeling van 8 ziektegevallen. Bij 7 patiënten gelukte het synthaline in de plaats van insuline te stellen. Weliswaar werd lang niet altijd suikervrije urine verkregen en ook de bloedsuiker werd weinig beïnvloed. Gunstig was de uitwerking op de ketonurie.

E. STEIN. *Gelenkkrankheiten und Bad Teplitz-Schönau*. — Lovende beschouwing over de badkuren in Teplitz-Schönau.

A. LUGER und E. SILBERSTEIN. *Die Untersuchung des menschlichen Stuhles im polarisierten Lichte*. — Verschillende plantenresten, parasieteneieren e.d. zijn soms door het polarisatiemicroscop goed te onderscheiden.

W. GROSZMANN. *Zehnjährige Erfahrungen mit der Radium-Therapie in der täglichen allgemeinen Praxis*. — Gunstige ervaringen bij gewrichtsaandoeningen, myalgieën en neuralgieën.

W. OSTERWEIL. *Ueber Behandlung der Hämorrhoiden mit Anusol-Suppositorien.* — Deze bekende zetpillen worden zeer aanbevolen.

W. BAETZNER. *Ueber Sportschäden am Bewegungsapparat.* — Vervolg uit no. 16. Ditmaal over veranderingen aan hand-, vinger-, voet- en teengewrichten. Met Röntgenfoto's toegelicht.

*Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete des Versicherungswesens.*

W. BRANDIS. *Wirbelsäulenerkrankung (KÜMMELSche Krankheit) als Unfallfolge.*

H. GERHARTZ. *Fortschritte auf dem Gebiete der Lungentuberkulose.* — Overzichtsreferaat.

P. VAN PAASSEN.

### **The Lancet. No. 5421, 13 Augustus 1927.**

R. ST. LEGER BROCKMAN. *Toxaemia of acute intestinal obstruction.* — Uit dierproeven wordt besloten dat darmafsluiting alleen dan de bekende, snel dodelijke vergiftigingsverschijnselen teweegbrengt, indien de gal geen toegang heeft tot het distale stuk. Op grond hiervan werden 13 patiënten, bij wie reeds faecaal braken was begonnen, behandeld met rectale giften gal. Bij een deel bestond mechanische afsluiting. Bij allen verdwenen de ileus-verschijnselen snel, 9 herstelden, 4 stierven aan complicaties. Bij totale afsluiting kon tot 16 dagen toe een toestand vrij van ileus-verschijnselen worden onderhouden, waarbij de toestand voldoende verbeterde om operatie toe te laten. Ossengal werkt minder zeker dan menselijke (desnoods gebraakte) gal en veroorzaakt pijn.

ISABELLA ROBERTSON. *Studies in the acid-base equilibrium in psychoses.* — Gefractionneerd onderzoek van maaginhoud en van koolzuur-uitademing wees bij de meeste krankzinnigen op afwijkingen in de zoutzuur-afscheiding, en wel bij depressieve toestanden op vermindering, bij opgewonden (en de meeste beginnende schizofrenen) op vermeerdering met vertraagde maaglediging.

S. H. G. ROBINSON, W. RUSSELL BRAIN and H. D. KAY. *The association of low blood cholesterol with the occurrence of fits in epileptics.* — Overzicht van het verrichte scheikundig onderzoek van het bloed bij epilepsie en het tot dusver negatief resultaat. Bij lijders aan epilepsie werd een lager cholesterine-gehalte gevonden, vooral in het plasma; deze verlaging bleek aanzienlijk verergerd vlak vóór het begin van de toevallen.

ARTHUR COMPTON. *Experimental cancer: studies on the action of glycerine on tissue cells.* — Verblijf van een stukje van ulcererend gezwel in glycerine gedurende  $\frac{1}{2}$  uur bleek het vermogen om met goed gevolg te worden overgeplant niet te verminderen (wellicht te verhoogen), doch voldoende om de bacteriën zoodanig te beschadigen dat ettering bij overplanting werd voorkomen.

ARTHUR WHITFIELD. *Treatment of sarcomatosis cutis and mycosis fungoides by X-rays.* — Beide aandoeningen, over de geheele huid verspreid, van elk één geval, werden over een beperkt huidgedeelte krachtig bestraald. De niet-bestraalde gezwellen antwoordden op de resorptie der bestraalde met reactie en daaropvolgende verdwijning, bij de mycosis zonder dat verdere bestralingen noodig waren.

F. PEARCE STURM. *Toxic neurolabyrinthitis.* — Oorsuizen en duizelingen, begonnen en blijvend na opwekken van weeën met kinine.

### **The Lancet. No. 5425, 20 Augustus 1927.**

KENNETH M. WALKER. *Treatment of genital tuberculosis in the male.* — Bij tbc. epididymitis is bijna steeds ook tbc. van prostaat en zaadblaasjes te vinden. De bijbal wordt waarschijnlijk langs de lymphwegen van de prostaat uit besmet, het vas deferens dan weer van de bijbal uit. Resectie van bijbal en het aangedane stuk vas doet de aandoening der overige organen doorgaans voldoende teruggaan, mits de algemeene afweer voldoende wordt bevorderd (lucht, diëet, licht- en Röntgenbehandeling). Bij slechten weerstand en groote uitbreiding kan de totale verwijdering der zieke zaadwegen noodig zijn, doch steeds moet de bal worden behouden. De perineale weg is voor deze operatie de beste, doch een moeilijke en ernstige ingreep.

H. HAXTHAUSEN. *Streptococcal pityriasis*. — Een veel voorkomende huidaandoening, vooral aan neus- en mondhoeken, gelijkend op eczema seborrhoicum en ringworm, doch veroorzaakt door streptococcen, die op kristalviolet-bloed-agar daaruit worden gekweekt. Verdwijnt snel onder zinkzalf, zoo noodig met wat teer.

A. LOUISE Mc ILROY. *A method for the induction of respiration in the new-born*. — Bij asphyxia alba wordt kunstmatige ademhaling nadeelig geacht, daar shock en afkoeling er eerder door toenemen. Het kind wordt, zoo noodig na uitzuigen der luchtwegen en inspuiting van excitantia in een kleine couveuse gelegd en een maskertje, verbonden aan een cylinder met 95 pCt. zuurstof en 5 pCt. koolzuur, onder lichten overdruk uitgelaten, wordt 17 maal per minuut op neus en mond geplaatst tot spontane ademhaling volgt. Hierop wordt het naast het gezicht van het kind neergelegd. De aanwezigheid van ademhaling kan aan een met het masker verbonden manometer worden bemerkt.

THOMAS LUMSDEN and JOHN GOWER STEPHENS. *Treatment of JENSEN'S rat sarcoma by antiserum and adrenalin*. — Evenals het gelukte het antiserum op het gezwel te doen inwerken door het serum door afbinden der bloedstroom ter plaatse te houden, gelukt dit door omspuiten van het gezwel met adrenaline. Op de regressie, die overigens ook, in geringer percentage, te bereiken is door inspuiten van het gezwel met adrenaline plus normaal serum, adrenaline plus gedestilleerd water en met formaline, volgt immuniteit, ook tegen andere, mits minder virulente, gezwellen. De gunstige uitkomst is afhankelijk van het vermogen van het dier tot vorming van antistoffen, hetwelk afhangt van kleur, leeftijd en soort.

ALICE C. KOHN-SPEYER. *The comparative lability of antisera cytotoxic to cancer-cells*. — Schapensera tegen menschenkanker en rattensarcoom verliezen snel hun cytolytisch vermogen tegen muizenkanker (bij 56° resp. in 6 en in 21 uur, bij 0° in 28 dagen); konijnenserum tegen M. 63 muizenkanker werkt na langer tijd op M. 63 in. De afweerstoffen tegen de soortvreemde cellen blijven derhalve langer goed dan die tegen kwaadaardige gezwellen in het algemeen.

H. D. LIVINGSTONE SPENCE. *Preventive treatment of syphilis*. — Uitwendige kwikbehandeling ter plaatse voldoet slecht. Met één inspuiting van 0.6 gr. novarsenobenzol 1 à 2 dagen na een zeker besmettelijk contact bleven bij alle behandelde (11) verdere verschijnselen uit.

M. SALMOND. *Two cases of functional paralysis of the legs following labour*.

J. PINKHOF.