

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1928, No. 3.

P. CLAIRMONT. *Zur Diagnose der akuten Appendizitis.* — CLAIRMONT bespreekt de gevallen, bij welke clinisch de diagnose acute appendicitis werd gesteld en deze door den anatoom niet werd bevestigd (20 pCt. van zijn materiaal). Bij de meeste vond deze een chronische appendicitis of een neurinoma; hij kan deze bevinding niet verklaren, daar clinisch de typische verschijnselen der acute aandoening werden gevonden.

J. SCHÜLLER. *Unsere Erfahrungen mit der SAUERBRUCH-HERRMANNSDORFER-GERSONSchen Tuberkulosediet.* — Bericht over 7 gevallen van chirurgische tuberculose en twee van lupus, met dit diët behandeld. Bij alle nam het gewicht toe, van de chirurgische tuberculosen verbeterden 5 aanmerkelijk, 2 niet, van de lupusgevallen genas een, verbeterde de andere duidelijk. SCHÜLLER is overtuigd van den gunstigen invloed van de behandeling.

K. BRUCKE. *Ueber hypoglykaemische Reaktionen. I. Mitteilung.* — Beschrijving van 7 hypoglycaemische reacties bij een met insuline behandeld diabetisch kind. BRUCKE schrijft deze evenals de acetonurie voornamelijk toe aan de sterke labiliteit in het geheele vegetatieve systeem, tot welke ook de koolhydraatstofwisseling behoort, van de zieke.

E. FREUDE. *Omni- und unisegmentäre Wurzelunterbrechung in ihrer Wirkung am Magen.* — FREUDE bespreekt de verschillende reacties, welke men aan de maag na deze onderbreking waarneemt.

K. KÖTSCHAU und A. SIMON. *Zur Frage der „Eisenaktivität“ und ihrer praktischen Bedeutung. I. Mitteilung. Allgemeines über die Beziehung des Fe-Ions zur katalytischen „Eisenaktivität“. II. Mitteilung. Ueber die katalytische Aktivität der deutschen Eisenmineralversandwässer und ihre Brauchbarkeit. III. Mitteilung. Die Eisenmineralbäder in Stuttgart-Cannstatt.* — Niet kort samen te vatten. Schrijvers besluiten, dat in de baden van Stuttgart-Cannstatt gelegenheid gegeven is voor de uit- en inwendige toepassing van catalytisch actief ferroijzer; alleen daar is het mogelijk in zulk catalytisch actief water te zwemmen.

H. NAGELL. *Ueber eine Sepsis, hervorgerufen durch Micrococcus catarrhalis.* — Een geval.

G. LUTZ. *Die Brauchbarkeit der Antivirusbouillon nach BESREDKA.* — LUTZ verkreeg met den bouillon van BESREDKA, uitwendig toegepast als verband, taponnade, spoeling enz., zeer goede uitkomsten bij huidinfecties door streptococci en staphylococci (panaritia, phlegmonen, abscessen) en bij cystitis; waar echter de besmetting niet langs de huid plaats vond, bijv. bij osteomyelitis, was het middel werkeloos. Geheel onschuldig is het niet: eenige malen nam hij bij conjunctivitis en tuberculeuse cystitis, waarbij hij het tegenaangewezen acht, verergering waar.

R. GOEPEL. *Der Verschluss von Nabel- und Bauchwandhernien unter Verwendung gegliederter Silberdrahtnetze.* — Door een reeks afbeeldingen wordt de methode verduidelijkt.

L. PAUL. *Die Schleifennaht, eine von Aussen entfernbare tiefe Naht.* — Voordracht. Vele afbeeldingen.

M. KRÜGER-FRANKE. *Ueber Uterusrupturen.* — Bericht over 7 gevallen.

P. ZIEGELROTH. *Zur diätetischen Therapie der Hämophilie.* — Bij twee gevallen nam ZIEGELROTH een duidelijk gunstigen invloed waar van een diët, zeer rijk aan vitamines en minerale stoffen in den best mogelijk assimileerbaren vorm. Het diët is voornamelijk lactovegetabilisch en zooveel mogelijk rauw en rijk aan tomaten, radijs, knollen, augurken, versch fruit, saladen en groenten, citroensap, versche boter, honig, rauwe eieren enz..

H. KALISCH. *Ueber die Anwendung von Neuramag bei Alterskrankheiten.* — Neuramag is ook voor ouden van dagen een onschadelijk en zeer werkzaam analgeticum en antipyreticum.

O. MUCK. *Nachweis von vorübergehenden, durch kalorische Vestibularisreizung erzeugten Tonusstörungen der Gehirngefässinnervation mit dem Adrenalin-Sondenversuch.*

K. L. ELSNER. *Eine Sehhilfe für Presbyopen.* — Een presbyoop, die zijn bril niet bij de hand heeft, kan zich gemakkelijk helpen door te zien door de nauwe spleet tusschen zijn voor het oog gehouden wijs- en middenvingers.

H. ALEXANDER. *Was muss der praktische Arzt von der chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose wissen? (Schluss folgt).*

La Presse médicale. 1928, No. 4.

P. LECÈNE et CH. AUBERTIN. *La splénectomie dans la leucémie myéloïde.* — De splenectomie is bij dezen vorm van leucaemie ongevaarlijk, indien men haar laat voorafgaan door bestraling, waardoor de milt kleiner en het bloed bijna normaal wordt; ook indien de uitslag der bestraling incompleet is, kan men haar uitvoeren, doch zonder voorafgaande bestraling is zij gevaarlijk. Het nut der operatie is beperkt: het aantal leucocyten wordt kleiner dan vóór de operatie en correspondeert met de vorming van myeloïd weefsel buiten de milt, doch de bloedformule blijft kwalitatief leucaemisch, de ziekte zelf blijft voortbestaan; de invloed van bestraling is grooter.

J. CATSARAS. *Sur la pathogénie des hémorragies intestinales typhoidiques.* — Bij een patiënt, gestorven ten gevolge van darm- en maagbloedingen, werden in den darm ter verklaring der bloedingen geen zweren gevonden, doch de haarvaten der follikels van den dikken darm waren sterk uitgezet, overvuld met bloed, en vertoonden uitgebreide diapedese van erythrocyten en vette ontaarding van hun wand. CATSARAS beschouwt deze afwijking als de uiting eener door de typhusinfectie verworven haemorrhagische diathese, die ook de voornaamste oorzaak der bloedingen is.

P. E. MORHARDT. *La pancréatite hémorragique et son mécanisme d'après les travaux récents.* — Literatuuroverzicht.

La Presse médicale. 1928, No. 5.

C. LEVADITI. *A propos de l'étiologie de l'érythème polymorphe infectieux, contagieux et épidémique.* — PARKER en HUDSON hebben bij een epidemie van deze ziekte in 62 pCt. der gevallen een bacil kunnen isoleeren, dien zij haverhillia multiformis noemen. LEVADITI toont aan, dat de bacil, dien hij 10 maanden eerder als den verwekker der ziekte onder den naam streptobacillus moniliformis beschreef, volkomen met dien der Amerikaansche onderzoekers overeenkomt.

J. MEIJER. *La perspiration de l'eau en clinique.* — Uitvoerig worden de klinische beteekenis der perspiratie en haar meting uiteengezet voor koortsige ziekten, voedingsstoornissen (hierbij wisselt de perspiratie parallel aan het basaalmetabolisme), eczemen, oedemen van hart- en nierlijders enz..

J. MOUZON. *De quelques essais de malarithérapie précoce dans les méningites syphilitiques.* — Literatuuroverzicht.

P. SMIT.

The Lancet, No. 5447, 21 Januari 1928.

Lord DAWSON OF PENN. *Pernicious anaemia.* — Referaat.

ANDREW BALFOUR. *The education of medical officers for service in the tropics.* II. — Voordracht.

C. H. FAGGE. *On the complications of fractures of the long bones.* — De meeste blijvende gebreken van been, spieren en gewrichten zouden kunnen worden voorkomen door zeer nauwkeurige correctie, waartoe repositie voor het Röntgenscherm onmisbaar is; indien dit niet lukt moet zoo vroeg mogelijk bloedige repositie ge-

schieden, welke meestal zonder meer voldoende is; losse stukjes, vooral bij of in gewrichten worden verwijderd; bij onvoldoende stevigheid der fixatie voldoet vereeniging met een metalen plaat en schroeven het best; beenspalk is bij pseudarthrose aangewezen. Uitblijven van consolidatie is doorgaans gevolg van interpositie en moet dan operatief verholpen worden.

J. A. SCOTT. *The serum treatment of scarlet fever.* — Vergelijking tusschen 150, meestal ernstige gevallen met serum behandeld en 240, meestal lichte, zonder serum doet de eerstgenoemde gunstig uitkomen, vooral wat betreft temperatuurdaling en subjectieve verbetering. De eerste inspuiting na den 4den dag brengt geen voordeelen meer.

E. WARD. *Minor tuberculosis.* — Hieronder verstaat schrijver die infecties, welke, onder diverse verschijnselen van zwakte, dyspepsie of neurasthenie verlopend, bij personen met voldoende weerstand spontaan en zelfs zonder kuur genezen, doch welke bewijzen, dat besmetting, ook op lateren leeftijd, zeer frequent is.

A. G. MILLOT SEVERN and EWART W. EVANS. *A localised outbreak of bacillary dysentery in Smethwick.* — Uit open drinkwaterreservoir ten huize van bacillen-dragenden oud-soldaat.

P. LAZARUS-BARLOW. *The effect of intravenous and intramuscular inoculations of novasurol in rabbits.* — Normale giften per K.G. gewicht veroorzaakten hyperaemie en troebele swelling van lever en nieren, grootere giften ook necrose. Ter plaatse van de intramusculaire inspuiting degeneratie. Vermindering der giften is gewenscht.

JAMES A. KERR. *Spasmodic auricular fibrillation and bronchopneumonia complicating sepsis in the puerperium.* — Snel herstel van het polsrythme na één massieve digitalis-gift van 16 gram (? ref.) tinctuur.

NATHAN WALSH. *A case of nerve palsy.* — Door spierverscheuring der extensoren aan het onderbeen.

J. SILVERSTONE. *Cystic pneumatosis of the bowel.* — Verspreide luchthoudende verwijdingen der lymphspleten van den darmwand, vermoedelijk door mechanische drukstoringen ontstaan. Komt vooral voor bij andere functiestoornissen van het darmkanaal (maagzweer). De ziekte geneest spontaan. Beschreven geval ontdekt tijdens operatie wegens maagperforatie, bij latere operatie werd de genezing geconstateerd.

F. GOWLAN HOPKINS and HARRIETTE CHICK. *Estimation of vitamin A in cod-liver oil.* — De colorimetrische methode van ROSENHEIM en DRUMMOND geeft voor levertraan dezelfde uitkomsten als de biologische.

J. PINKHOF.

Wiener klinische Wochenschrift. 1928, No. 3.

Originalabhandlungen. B. BREITNER. *Praktische Fragen der Bluttransfusion.* — In de laatste jaren zijn meer dan 1000 bloedtransfusies gedaan op de kliniek van VON EISELSBERG; de techniek, die daar gevolgd wordt, is het onderwerp van bespreking in dit artikel.

R. MARESCH. *Ueber Herzklappenfehler.* — Een pathologisch-anatomische beschouwing van de klepgebreken, die aangeboren of verworven voorkomen, waarbij enkele beschreven worden, die op zeer bijzondere aetiologie berusten zooals traumatische en door schotwond veroorzaakte.

W. HAUPTMANN und J. BURTSCHER. *Ueber die diagnostische Verwendbarkeit der Tuberkelbazillenzüchtung nach der Methode von HOHN.* — HOHN doodt de begeleidende bacteriën met 10 pCt. zwavelzuur en kweekt daarna op een voedingsbodem van eierdoorenglycerine; in veel gevallen, waarbij de kleurmethode mislukt kan men op deze wijze tuberkelbacillen aantoonen.

J. URBANCK und D. SCHERF. *Kapillarmikroskopische Untersuchungen an der menschlichen Konjunktiva.* — Door gebruik te maken van ultraviolet licht is men er in geslaagd bij verschillende personen de arterio-veneuse verbindingsvaten aan te toonen. Deze verbindingsvaten zouden met omgaan van het capillairnet het bloed onmiddellijk van slagader in ader voeren en dienen om bij circulatiestoornissen de haarvaten te ontlasten.

E. NOBEL. *Ueber die Tuberkuloseschutzimpfung nach CALMETTE.* — In zijn polemiek met CALMETTE houdt NOBEL vol, dat hij met het vaccin C. G. bij dieren tuberculeuse, overentbare afwijkingen gevonden heeft en het dus onverantwoordelijk is deze methode bij kinderen toe te passen.

A. PHILADELPHY. *Eine bullöse Hauterkrankung hervorgerufen durch Achillea millifolium.* — Bij een aantal personen, die na een rivierbad zich ongekleed gelegd hadden op de aangrenzende weide, ontstond een bulleuse, jeukende dermatitis. Proeven met verschillende daar groeiende planten wezen uit, dat de prikkel geleverd werd door de Achillea millifolium.

J. MORGENSTERN. *Serumkrankheit und Eigenbluttherapie.* — Indien men na een seruminspuiting een exantheem ziet ontstaan geve men onmiddellijk een intramusculaire inspuiting van 10—20 cm³ eigen bloed, het uitslag, de temperatuursverhoging, jeuk en ziektegevoel verdwijnen dan snel.

A. WITTEK. *Heilbehandlung und Sozialversicherung.* — WITTEK staat aan het hoofd van een ziekenhuis, dat uitsluitend dient voor verzorging van ongevals-patiënten en wel niet alleen voor nabehandeling van ongunstig genezenden, maar ook van geheel versche gevallen. Hij is zeer gunstig gestemd over den arbeid, die hier verricht wordt, waarbij het functioneele herstel naast de psychische opvoeding op den voorgrond staan.

J. FRIST. *Ueber die Bedeutung der intrakraniellen Läsion der Neugeborenen für die Geburtshilfe.* — Verdediging van de mogelijkheid, dat de omstrengeling met de navelsnoer doodsoorzaak kan zijn, zonder dat daarbij hersenbelediging primair behoeft mede te werken.

H. HEIDLER. *Erwiderung auf obige Bemerkung des Herrn J. FRIST.*

E. ZELLNER. *Zur Leitungsgrenze elektrischer Schwellströme.* — Opmerking op het gelijkkluidende artikel van EBEL (*W. kl. Ws.* 1927, no. 52).

Richtlinien für die Praxis. E. FREUND. *Ueber die Behandlung chronischer Gelenkentzündungen mit abnehmbaren Blaubindenverbänden.*

O. SCHWARZ. *Ueber diagnostisch unklare Nierenschmerzen.*

J. ED. ST.

Dermatologische Wochenschrift. No. 50 (Bd. 85), 1927.

R. STAHL und G. SIMSCH. *Ueber einige bei dem Zustande kommen von Erythem- und Pigmentbildung mitwirkende Gesetzmässigkeiten.* — Het bleek, dat het na bestraling met ultraviolet licht ontstane erytheem, en de vorming van pigment toenamen, wanneer te voren hyperaemie in het bestraalde gebied was opgewekt. Bestond na afkoeling, anaemie, dan ontstond een zwakker erytheem, de vorming van pigment evenwel was duidelijker. De koude werkt vermoedelijk via den sympathicus op de pigmentvorming. Het innemen van het op de sympathicus werkende ephetonine, eenige dagen lang vóór de bestraling, zette ook de vorming van het pigment aan. Innemen van kalzan had een tegenovergesteld gevolg.

A. F. SLATMANN. *Ausgebreitete Pigmentation der Haut im Zusammenhang mit Amenorrhoe.* — Bij een 19-jarig meisje bestond minstens 5 maanden lang amenorrhoe. Van het begin dier periode af ontstonden, vooral aan de strekzijde der ledematen, pigmentaties, welke (ook histologisch onderzocht) een gevolg blijken te zijn van talrijke subcutane bloeditstortingen, wier optreden in verband wordt gebracht met het ontbreken in het bloed van ovariumhormoon. Behandeling met een ovarine praeparaat deed de pigmentvlekken verdwijnen en de menstruatie terugkeeren.

C. L. KARREBERG. *Ein neuer Kolben zur Züchtung und Aufbewahrung von Pilzkulturen.* — Op een schaal met geslepen opstaanden rand, past, ook met geslepen rand, een „Erlemeijer-kolf zonder bodem”. De twee deelen worden met trekveertjes bijeengeklemd.

G. DOCZY. *Ueber die Behandlung der Psoriasis vulgaris und des Lichen ruber planus mit innersekretorischen Präparaten.* — Met LUTTGE-MERK's ninhydrinereactie werd bij een aantal lijdens aan psoriasis een te geringe werking van een of meer klieren met inwendige afscheiding vastgesteld. Behandeling der patiënten met het

voor elk geval afzonderlijk wenschelijk geachte organotherapeutische praeparaat had zeer goed gevolg.

A. B. SELISKY. *Zur Klinik und Histologie des Granuloma annulare*. — Eigenaardig was, dat blaasjes en korstjes in het midden der papels voorkwamen, en dat de efflorescenties ook aan de handpalmen en in lineaire rangschikking werden aangetroffen.

Dermatologische Wochenschrift, No. 51 (Bd. 85), 1927.

O. KIESS. *Zur Kasuistik der Lentiginosis profusa*. — Het geval werd bij een slechts 7 maanden oud jongentje waargenomen. Literatuuroverzicht.

A. SCHOCH. *Lupussarkom*. — De op lupusweefsel zich soms ontwikkelende kwaadaardige gezwellen behooren bijna altijd tot de carcinomen. Het artikel bericht over een der zeldzame gevallen, waar men met een sarcoom te maken had.

H. MIERZECKI. *Symmetrische gummöse Erkrankung der Parotis- und Submaxillardrüsen. Orchitis luetica sinistra*. — Dat de bij den bof bekende gelijktijdige aandoening van bedoelde klieren ook door lues veroorzaakt kan worden leeren wij uit deze beschrijving. Door het histologisch onderzoek werd zoowel in de parotis als in de verwijderde testis gummaweefsel aangetoond.

E. DEUSSEN. *Beiträge zur Kenntnis der Bukkoblätter (Fol. Bucco)*. — Niet verkort weer te geven, geschiedkundige, botanische, chemische en physiologische bijzonderheden.

Dermatologische Wochenschrift, No. 52 (Bd. 85), 1927.

R. HABERMANN. *Paradoxe Wirkung spezifischer Syphilisbehandlung, ihre Beobachtung an der Haut und Bedeutung für die Einteilung und Prognostik der sogenannten Neurorezidive*. — In litteekenweefsel kan de bloedstroom min of meer traag zijn. Het ingespoten antilueticum, dat gedurende den tijd, dat het circuleert vermoedelijk snel van samenstelling verandert, zal in een zich in genezing bevindende lueshaard een relatief langeren tijd aanwezig zijn, dan in een overeenkomstig stuk normaal weefsel. Het zou dus denkbaar zijn, dat door deze bijzondere omstandigheden het geneesmiddel schadelijk ging werken, naarmate de behandeling voortgang nam. De waarneming dat, vooral bij de neurolues, soms verergering na een anti-luetische kuur intreedt, zal evenwel in hoofdzaak verklaard moeten worden uit den invloed, die het te snel gevormde, samensnoerende, de circulatie belemmerende, de zenuwelementen drukkende litteekenweefsel zelve uitoefent. Dat een soortgelijke voor de goede genezing nadeelige invloed van litteekenweefsel niet alleen bij het zenuwstelsel en aan de inwendige organen voorkomt, maar soms ook aan de huid is vast te stellen toont de door den schrijver gegeven ziektegeschiedenis van een vrouw met uitgebreide tubero-ulcereuse tertiaire syphiliden aan de onderbenen.

P. G. RINSEMA.