

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift. 1929, No. 1.

G. WINTER. *Aufruf zu einer allgemeinen deutschen Kaiserschnitt-Statistik für das Jahr 1928.*

H. DÖRFLER. *30 Jahre Schnittentbindung (Kaiserschnitt).* — DÖRFLER vat zijn uitvoerig toegelichte ervaringen aldus samen: de vaginale weg moet voor obstetrische operaties geheel en ten spoedigste vervangen worden door de buiksneede; deze is doeltreffender, ongevaarlijker, gemakkelijker en beter.

H. MUCH. *Lipoiden und Morphine.* — Voordracht. Voegt men bij een oplossing van cholesterine morphine, dan ontstaat een uitvlokking, hoofdzakelijk bestaande uit lipoiden, die na toevoeging van menselijk serum weer verdwijnt. Een lecithine-oplossing, waaraan morphine wordt toegevoegd, blijft helder, doch vertoont uitvlokking, indien men hierbij serum voegt. Uitvoerig bespreekt MUCH de beteekenis van deze bevinding en de uitkomsten van verdere onderzoekingen, die hij in verband hiermede uitvoerde.

R. KOCH. *Medizin und Philosophie.*

OLPP. *Die intravenöse Behandlung der Lepra mit Kalium jodatum und ihre Konsequenzen.* — OLPP geeft een overzicht van de voortreffelijke uitkomsten, in verschillende landen met de methode van MUIR verkregen; hij beschrijft de uitvoering der kuur, de voorzorgsmaatregelen, de reacties enz.. De voornaamste tegenaanwijzing is longtuberculose. Daar deze behandeling ook prophylactische waarde heeft, zou een internationale organisatie in eenige tientallen van jaren in staat kunnen zijn de ziekte geheel uit te roeien.

R. AMERSBACH. *Zur Behandlung der weiblichen Sterilität.* — Door nauwkeurige navorsching en grondige gynaecologische en psychologische kennis is menig geval van steriliteit van de vrouw voor doeltreffende behandeling geschikt. Door een reeks voorbeelden toont AMERSBACH dit aan.

A. TILGER. *Ueber die Verabreichung von Knoblauch zu Heilzwecken.* — In allisatine bezitten wij een praeparaat, dat de onaangename smaak van knoflook mist. Veel goedkooper is een knoflookextract, dat TILGER sinds jaren gebruikt en waarvan hij de bereidingswijze mededeelt. Door toevoeging van een weinig validol wordt ook van dit extract de smaak weinig hinderlijk gemaakt.

A. KRECKE. *Die Behandlung des Darmverschlusses.* — Overzicht.

G. BAER, A. HERRMANNSDORFER und H. KAUSCH. *Ergebnisse kochsalzfreier Ernährung bei Lungentuberkulose. (Schluss folgt).*

O. MUCK. *ALBRECHT DÜRERS Krankheit und die medizinische Umwelt seiner Zeit.*

Münchener medizinische Wochenschrift. 1929, No. 2.

G. GRUND. *Psychologische Grundlagen der Anamnese.* — Voordracht.

F. BÖHM. *Der Exophthalmus, seine Diagnose und Behandlung in der Chirurgie.* — Voordracht.

K. GEBHARDT. *Verletzungen und Spätschäden am Bewegungsapparat bei Skifahren.* — Niet kort samen te vatten. GEBHARDT geeft een overzicht der bij de skisport meest voorkomende verwondingen, in het bijzonder aan voet- en kniegewricht, hun behandeling, nabehandeling en gevolgen.

F. SCHNEK. *Die Schäden des Handbades bei offenen Hand- und Fingerverletzungen.* — Het gevaar bij handwonden is de progrediënte phlegmone. Deze wonden moeten daarom radicaal behandeld worden met ruime incisies en verder met volkomen rust in een spalkverband; SCHNEK geeft hiervoor verschillende technische wenken. De zoo vaak toegepaste warme handbaden zijn hierbij nadeelig; de in de wond dringende vloeistof sleept de ziektekiemen met zich in de diepte, door de zwelling der huid worden de zich hierin bevindende bacteriën gemobiliseerd en leiden tot telkens nieuwe infectie der wond, de incisieopening wordt door de zwelling afgesloten, de

volledige rust van het lid opgeheven. Het eenige voordeel, de hyperaemie, kan men beter door heete lucht en stuwing bewerken.

H. LAX und I. SZIRMAI. *Ein Verfahren zur Haltbarmachung des Blutes für die Blutzuckerbestimmung.* — Zoowel in normaal als in diabetisch bloed worden de glycolyse en de suikerontleding door bacteriën opgeheven door toevoeging van 1 pCt. fluornatrium en 0.1 pCt. sublimaat. Op deze wijze bleef de bloedsuiker 30 dagen onveranderd.

A. SCHLOSSMANN. *Der Scharlach vom Gesichtspunkt des Sozialhygienikers.* — Voor-dracht.

K. F. FUNK. *Erfahrungen in Berlin bei der Durchführung des Reichsgesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.*

M. DE CRINIS. *Syphilis des Nervensystems.* — Overzicht.

G. BAER. A. HERRMANNSDORFER und H. KAUSCH. *Ergebnisse Kochsalztreier Ernährung bei Lungentuberkulose. (Schluss).* — Schrijvers deelen een groot aantal ziektegeschiedenissen met radiogrammen mede van met hun bekende diëet behandelde longpatiënten. Zij hebben over deze behandeling nu ruim 3 jaren ervaring en hebben de overtuiging gekregen, dat dit diëet een gunstigen invloed op de ziekte uitoefent en hierdoor schijnbaar hopeloze gevallen nog gebaat kunnen worden. Men ziet bij ondervoede zieken het gewicht vaak opmerkelijk snel stijgen, de koorts verdwijnen, het sputum verminderen en de bacillen verdwijnen. De behandeling bevordert den overgang van exsudatieve processen in productief-fibreuse.

HAYMANN. ARTHUR HARTMANN *zum 80. Geburtstag.*

La Presse médicale. 1928, No. 104.

M. LABBÉ. *Les troubles du métabolisme azoté dans le diabète et leur correction par l'insuline.* — Bij zwaren diabetes vindt men een diepgaande stoornis in de stikstofstofwisseling, overeenkomend met die bij de ziekte van BASEDOW en infectieziekten, doch het eiwitverlies is veel grooter. Insuline blijkt tegen deze stoornis het middel bij uitnemendheid te zijn.

E. TOULOUSE, L. MARCHAND et J. PICARD. *De l'automatisme épileptique eupraxique* — Uitvoerig worden deze automatische handelingen, die men het meest in de periode na een epileptischen aanval, doch ook afgescheiden van een aanval waarneemt, besproken. Schrijvers verdeelen ze in 3 groepen: handelingen uit het dagelijksch leven (thee schenken bijv.), beroepshandelingen en voor den patiënt geheel ongewone handelingen. Een goede verklaring is nog niet gegeven.

A. FLORESCO. *Quelques considérations sur les ostéoporoses algiques post-traumati-ques.* — FLORESCO bespreekt deze naar aanleiding van een geval. Het is van belang de ziekte tijdig te herkennen, daar zij door een in het begin toegepaste peri-arterieele sympathectomie te genezen is, doch, onbehandeld, tot onherstelbare organische afwijkingen leidt.

La Presse médicale. 1929, No. 1.

A. SÉZARÉ et A. BARBE. *Résultats cliniques et biologiques de la stovarsolthérapie dans 125 cas de paralysie générale.* — Sedert schrijvers niet meer dan 3 onderhuidsche inspuitingen van 1 gram van het pentavalente arsenicumpraeparaat stovarsol per week toedienen, namen zij geen gezichtsstoornissen meer waar; zij geven per serie 21, somtijds 30 en meer gram en staken daarna de inspuitingen voor een maand. Vele gevallen van dementia paralytica worden hierdoor verbeterd; neemt men na 1—3 maanden geen verbetering waar, dan beginne men de malaria- of een andere behandeling. Naarmate zij te doen hadden met patienten met excitatie, met lichte of volledige demencie, verkregen schrijvers verbetering bij 68, 58 resp. 26 pCt. der gevallen. In de cerebrospinale vloeistof verzwakte de reactie van WASSERMANN in 34 pCt., verminderde de leucocytose in 73 pCt. en de hyperalbuminose in 47 pCt. der gevallen; zelden werd deze vloeistof geheel normaal. De clinische verbetering verloopt echter niet steeds parallel met de biologische.

J. GOURDON. *De l'action du psoas dans les affections articulaires de la hanche.* — GOURDON bespreekt de retractie van den psoas bij dislocaties, acute en chronische

ontstekingsprocessen van de heup, haar invloed op het beloop en de behandeling der aandoening. In verouderde gevallen is vaak operatieve opheffing dezer retractive noodig, waarvoor GOURDON aan de methode van DENUCÉ-LASSERRE de voorkeur geeft.

La Presse médicale. 1929, No. 2.

F. DE LAPERSONNE. MAURICE LETULLE (1853—1929).

R. DEBRÉ, J. MARIE et H. PRETET. *Le diagnostic bactériologique de la coqueluche, sa facilité et son intérêt.* — Het is van het grootste belang kinkhoest bij het begin der ziekte en in atypische gevallen en „formes frustes” te herkennen en dit is dan alleen mogelijk door het aantoonen van den bacil van BORDET en GENGOU, wat niet moeilijk is, sedert wij de methode van MAURITZEN kennen. In bijzonderheden wordt deze, het bereiden van den voedingsbodem enz. beschreven. In $\frac{3}{4}$ der atypische gevallen vonden schrijvers den bacil, 5 weken na het begin der aanvallen nog slechts bij 10 pCt.

P. SMIT.

Medizinische Klinik, 1928, No. 49.

F. HEIMANN. *Die Beziehungen von Erkrankungen der Drüsen mit innerer Sekretion zu den Sexualhormonen.* — Voordracht.

J. IGRERSHEIMER und H. SCHLOSSBERGER. *Pathogenität des Tuberkelbacillenstamms CALMETTE (Stamm B.C.G.) bei Injektion in die vordere Augenkammer.* — Het B.C.G. vaccin veroorzaakt bij inspuiting in de voorste oogkamer van caviae en konijnen bijna altijd een specifieke ontsteking. Deze kan zeer progredient zijn en tot phthisis bulbi voeren, kan echter ook bij sterke reactie nog teekenen van herstel laten zien en tenslotte kan de aandoening zeer goedaardig zijn. In het algemeen waren de nadeelige gevolgen van de inspuiting bij konijnen veel geringer dan bij de caviae. Het proces bleef ook bij caviae echter bijna steeds beperkt tot het oog, zwelling der regionale klieren werd bijna nooit gezien en de inwendige organen bleven vrij van tuberculose. Door passage van den bacteriestam van het aangedane oog op oogen van andere dieren werd geen verandering in de virulentie teweeggebracht.

R. WEINBERGER. *Zur Malariatherapie organischer Nervenkrankheiten.* — Wordt vervolgd.

A. WINKLER. *Ueber die metamorphosierenden Atemgeräusche.* — Bronchiaal metamorphoseerend ademgeruisch is een zeker ecavernesymptoom. Een der factoren voor het ontstaan van dit geruisch is elasticiteit der cavernewanden. Men kan deze waarnemen als verkleining der cavernes, wanneer men de patiënt voor het Röntgenscherm krachtig laat hoesten.

H. UIBERALL. *Beiträge zur Organtherapie der Fettsucht.* — Bij endogene vetzucht kan met orgaanpraeparaten van verschillende organen, ook zonder toegift van schildklier, goed resultaat worden bereikt. Schrijver geeft eenige ziektegeschiedenissen, waaruit blijkt, dat onder de behandeling gewichtsvermindering en lichte stijging van de grondstofwisseling werd verkregen. Gebruikt werd in de meeste gevallen lipolysin sine thyroidea.

PAUL BONHEIM. *Ueber die Technik der Pistyan-Schlammbehandlung.* — Ervaringen van twee jaren behandeling. Groote tevredenheid.

KLOTZ. *Die postvaccinale Encephalitis.* — Opmerkingen naar aanleiding van het artikel van WINKLER (*Med. Klinik*, 1928, No. 22). Deze had zich tegen voorstellen om de entdang uit te stellen verzet, omdat daardoor de kinderen pas op lateren leeftijd geënt zouden worden, waardoor de kans op encephalitis grooter wordt. Volgens KLOTZ is ook de zuigeling blootgesteld aan de kans om na vaccinatie encephalitis te krijgen, evenals na mazelen, varicellen e.d.

VULPIUS. *Die Harnblase als Ausdrucksgebiet für neuropsychische Vorgänge.* — Schrijver herinnert in dit verband naar aanleiding van de mededeeling van STUTZIN en WARNER (*Med. Klin.* 1928, No. 38) aan de ervaringen, die hij als officier van gezondheid tijdens den oorlog had. Toen kwamen herhaaldelijk mannen met blaas-

klachten, zonder dat er afwijkingen in de urine waren, die tijdens verlof of verblijf in het hospitaal spoedig weer verdwenen.

C. S. ENGEL. *Ueber mögliche Vereinfachungen der WÄSERMANN'schen Reaktion.* — Schrijver geeft een methode, die zoo eenvoudig is, dat de medicus haar zelve toe kan passen en inzendingen van bloed in een laboratorium alleen nog maar in bijzondere gevallen noodzakelijk is. Voor al te scherpe instelling van de reactie moet worden gewaarschuwd, daar men dan soms een positieve uitslag bij niet-luetici krijgt.

C. LEWIN. *Neo-Trivalin.* — Dit is een mengsel van morphine met coffeine en een atropine-derivaat, dat werkzamer is dan morphine alleen.

F. WOLFF. *Gonokokken-Lebendvaccine und Gonovitan.* — Aanvulling van het artikel van LOESER (*Med. Klinik*, No. 25, 1928). In het gonovitan blijven de gonococci levend en virulent. Het bespaart dus de moeite in alle gevallen versche cultures te maken.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete des Versicherungswesens.

RUBENSOHN. *Die Spätfolgen eines Herzleidens.*

RIETSCHEL. *Bronchial- und Lungenerkrankungen im Kindesalter.* — Overzichtsreferaat. (Wordt vervolgd).

P. VAN PAASSEN.

The Lancet, No. 5197, 5 Januari 1929.

W. SAMPSON HANDLEY. *Radiology from a surgeon's point of view.* — Voor therapeutische Röntgenbehandeling is in het bijzonder geschikt de chronische mastitis; het melkgang-papilloom reageert beter op radium. Met behulp van enkele gevallen van borstkanker wordt aangetoond, dat prophylactische bestraling veel ruimer en dieper (klieren langs de mammae) moet plaats hebben dan de zichtbare uitbreiding aangeeft, daar anders de stimulatie der onzichtbare kiemen door de zwakke bestraling aantoonbaar is.

C. P. DONNISON. *Blood pressure in the african native.* — Bij 1000 negers uit Kenya onderzocht. Na het 40ste jaar gaat de bloeddruk dalen en is bij 60-jarigen 105 mm. Arteriosclerose en hypertensie zijn uiterst zeldzaam.

STANFORD CADE. *Radium therapy of cancer of the buccal cavity.* — Techniek van bestraling met ingestoken naalden of in een vlakke prothese verdeeld radium. De bestraling geschiedt steeds lang met kleine hoeveelheid. Nabestraling van geopereerde halsklieren met radium in een halskraag van Columbiapasta verdeeld.

H. E. MAGEE and W. ANDERSON. *Diet and peptic ulcers in cavies.* — Diëet met onvoldoende minerale zouten en vitamines geeft primair motorische stoornis van den darm en stasis; hyperaemie bij den pylorus met bloeding of ulceratie, evenals beschadiging der bijnierschors is hieraan blijkbaar secundair. De verschijnselen gelijken op die door histamine veroorzaakt.

WILLIAMS EVANS. *Severe anaemia of pregnancy and the puerperium.* — Twee gevallen van anaemie, welke zich in volgende zwangerschappen heviger herhaalde en een critieken graad bereikte. Anaciditeit en miltzwellings bij een der twee. Beide reageerden snel en volkomen op leverdiëet.

Dr. CH. FLANDIN and J. CAMPBELL GILROY. *Four cases of appendicitis simulating other diseases.* — Namelijk resp. darmkanker, longtuberculose, ulcus duodeni en neurasthenie. Naast de onduidelijke plaatselijke verschijnselen leden allen aan ernstige cachexie en hadden hooge leucocytose.

VIOLET M. H. RENDALL. *Remarks on colonic lavage.* — Colon-irrigaties zijn slechts een onderdeel van de bestrijding van toxemie, waarnaast massage, diëet en behandeling van septische haarden noodig blijven.

CHRISTOPHER HOWARD. *Submucous injection of haemorrhoids with quinine hydrochloride.* — Techniek.

G. LENTHAL CHEATLE. *The interpretation of breast histology.* — Geïllustreerd overzicht.

J. PINKHOF.