

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Dermatologische Wochenschrift. No. 8 (Bd. 88), 1929.

J. H. RILLE. ERNST DELBANCO. — Inleidend woord van dit aan de 60ste verjaardag van dezen Hamburger dermatoloog gewijde nummer.

P. G. UNNA. ERNST DELBANCO. — Levensbeschrijving.

C. BRUCK. *Beitrag zur internen Behandlung der Ekzeme.* — Van de gunstige invloed van As, S, ichthyol of gist is schrijver niet overtuigd. Soms zijn zij zelfs nadeelig. Toch verdient de inwendige behandeling meer de aandacht, maar men trachte enerzijds het zenuwstelsel en anderzijds de stofwisseling te beïnvloeden.

A. BUSCHKE und W. CURTH. *Ein Fall von gonorrhoeischer Bauchdecken-Tuberkulid.* — Na een blijkbaar slordige tubaioperatie was een fistel blijven bestaan, welks purulent secreet massa's gonococcon bevatte en waarlangs maandelijksch bloed werd ontlast. Herstel langs operatieven weg.

A. BUSCHKE and A. JOSEPH. *Boecksches Sarkoid und papulo-nekrotisches Tuberkulid.* — Het ontstaan dezer combinatie bij eenzelfden patiënt kan worden verklaard, door aan te nemen, dat een gemeenschappelijk aetiologisch agens — tuberculose bacil — op verschillende manier (toxine, granulavormen met verminderde virulentie) en langs verschillende wegen de huid kan aantasten, waardoor uiteenlopende uitingen ontstaan, terwijl anderzijds door veranderingen in den toestand van immuniteit, tijdelijke wijzigingen in het reactievermogen der huid kunnen voorkomen.

J. H. RILLE. *Ueber den syphilitischen Primäraffekt an der Vagina.* — (Wordt vervolgd).

F. CALLOMON. *Extremitätengangrän als Folge syphilitischer Gefäßschädigung.* Een 25-jarige jongeman met behandelde congenitale lues, kreeg, nadat reeds langen tijd vage klachten over pijn in den rechter voet waren geuit, einde 1927 herhaaldelijk heftiger wordende neuralgiforme pijn aanvallen. In Februari — Maart 1928 ontstond een zweer aan den kleinen teen, waarop necrose van de eindphalanx volgde. CALLOMON, die den patiënt in dit stadium zag, liet onmiddellijk chirurgisch ingrijpen, waarbij amputatie midden in het bovenbeen noodig bleek. Als oorzaak van de pathologisch-anatomisch vastgestelde thromboarteriitis obliterans wordt door den schrijver de congenitale lues aangenomen.

E. HOFFMANN. *Berufliche Leicheninfektion mit Syphilis.* — De meening, dat besmetting door luetische lijken niet voorkomt, is onhoudbaar. Aan het lijstje van 18 waarschijnlijke en 20 zekere in het beroep ontstane besmettingen door lijken voegt de schrijver de volgende twee toe: 1. Bij een 37-jarigen sectiebediende ontstond ruim een jaar na de besmetting myelomeningitis syphilitica; 2. een bekend neuroloog internist infecteerde zich bij de sectie van een congenitaal luetisch kind. Ondanks jarenlange, intermitterend voortgezette kwikbehandeling, kreeg hij na 11 jaren dementia paralytica, waarop het volgende jaar de dood volgde.

MARTIN MAYER. *Tierversuche mit Leishmania tropica (Orientbeule).* — Tusschen de parasieten *Leishmania DONGVANI* (Kála-Azar) en *L. tropica* (Aleppo buil) moet wel veel overeenkomst bestaan. De hamster, welke een uitstekend proefdier voor het kala-azar onderzoek is gebleken, bleek dit echter in veel mindere mate voor proefnemingen met *L. tropica* te zijn.

O. GANS. *Zur Pathogenese der Psoriasis vulgaris.* — Bij het tot stand komen der psoriatische huidreacties schijnt een plaatselijke of algemeene verschuiving van de PH in het weefsel of in het organisme in het algemeen, in hooge mate betrokken te zijn. Onderzoekingen hieromtrent leidden tot een slotsom, welke steun vindt in de langs geheel anderen weg verkregen uitkomsten van de onlangs bekend gemaakte onderzoekingen van VAN KERCKHOFF.

E. MEIROWSKY. *Zur Kenntnis der sogenannten Chondrodermatitis nodularis chronica helioidica.* — Bij deze aandoening vinden wij grauwe gele scherpbegrensde knobeltjes ter grootte van een gierstkorrel of een linze, in de oorschelp, meestal bij de

helix. Daar zij zeer pijnlijk zijn kan de patiënt niet op het oor liggen. De oorzaak is onbekend. De behandeling bestaat in verwijderen door operatie, caustiek of etsing. Schrijver kon 2 gevallen histologisch onderzoeken.

P. MULZER und E. KEINING. *Ueber miliare Lymphozytome der Haut.* — Het gelukte de moeilijke diagnose met zekerheid op het histologisch praeparaat te stellen.

F. PINKUS. *Phimosenentstehung bei einem rituell zirkumzidierten Manne.* — Een 40-jarige, als kind ritueel besneden, kreeg tertiair-syphilitische zweren op de glans en de huid van den penis. Terwijl de zweren zich geleidelijk sloten, trok de penishuid meer en meer over de glans, zoodat zij deze thans weer geheel bedekt en zelfs een phimosis vormt.

O. SPIRNZ. *Unzulänglichkeiten bei der Gonorrhoebehandlung berufstätiger Mädchen.* — Schrijver meent in de particuliere practijk een toeneming der vrouwelijke gonorrhoe-patiënten te zien, vooral onder de in winkels en op kantoren werkende jonge meisjes. Van een geregelde behandeling dezer groep door den arts komt door allerlei huiselijke en uit de werkkring voortspruitende moeilijkheden dikwijls weinig terecht. Ook voor zelf-behandeling verkeerden deze patiënten in ongunstiger omstandigheden dan gehuwde vrouwen of prostituées.

P. UNNAJUN. *Ueber Färbung von Fadenpilzen in der Oberhaut.* — Voor de techniek der verschillende beschreven kleurmethodes leze men het oorspronkelijke.

H. RITTER. *Neues zur Röntgen-Oberflächen-therapie.* — Aanwijzing hoe zij die nog met een inductietoestel (ionen-buis) werken, zich zonder groote kosten een inrichting voor behandeling met Coolidge, Metallix e. d. type buizen kunnen doen samenstellen.

P. G. RINSEMA.

The Lancet, No. 5506, 9 Maart 1929.

EDMUND SPRIGGS. *The role of starvation in treatment.* — Beginselen en techniek van ontvettingskuren. De beste uitkomsten geeft een diëet, dat onbeperkt kan worden voortgezet, dus al het noodige bevat. Gunstige invloed op circulatiestoornissen en suikertolerantie.

ELIZABETH H. LEPPER and MARJORIE MAITLAND. *The bacteriology of a series of uteri removed at operation.* — Van de baarmoeders, die oogenschijnlijk geen ontsteking vertoonden, bleken toch een aantal met streptococcen of anaeroben besmet, vooral ook myomen.

MAURICE VILLARET and L. JUSTIN-BESANÇON. *The therapeutic application of acetylcholine.* — Wordt uitvoeriger gerefereerd.

WILLIAM BAIN. *The diagnosis and treatment of subacute cholecystitis.* — De infectie is steeds haematogeen en blijktens het onderzoek der aangrenzende lymphklieren doorgaans door streptococcen. Bij tijdig ontdekken is de aandoening langs conservatieven weg te genezen, waarbij aan een quantitatief beperkt diëet groote waarde wordt gehecht.

A. W. SHEEN. *Some aspects of the surgery of the spleen.* — Bij anaemia splenica (waaronder ook de ziekte van BANTI is te verstaan en die symptomatisch kan voorkomen bijv. bij milttuberculose) is miltverwijdering aangewezen, althans bij vermindering der bloedplaatjes. Bij onverklaarbare bloedingen uit de inwendige organen worde steeds het bloed op anaemia splenica onderzocht. Ook bij miltvergrooting met onbekende diagnose heeft exstirpatie goed gevolg. De operatie wordt zoo noodig voorafgegaan door verkleining van de milt met radiumbestraling.

THOMAS MOORE. *Carotin and vitamin A.* — De plantenkleurstof carotine blijkt in giften van 0.005 mgr. per rat het vitamine A te kunnen vervangen. Hoewel chemisch verwant met „biosterin" (het meest geconcentreerde vitamine A-paeparaat uit levertraan) en in dezelfde dosis werkzaam, verschillen beide stoffen in fysische eigenschappen.

W. H. C. ROMANIS. *Traumatic aneurysm of the internal iliac artery.* — Na behandeling van een pararectaal absces geleidelijk ontstaan en toegenomen; langs abdominalen weg met goed gevolg onderbonden.

J. PINKHOF.