

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift, 1930, No. 30.

P. MULZER und C. F. HAHN. *Tierexperimentelle Beiträge zum Problem der kongenitalen Lues.* — Niet kort samen te vatten.

J. C. LEHMANN. *Gastritis und Ulkus.* — Voordracht. Door een gastritis en haar gevolgen (erosies enz.), gepaard met een waarschijnlijk constitutioneele minderwaardigheid en de anatomische structuur van den wand van antrum en kleine curvatuur, kan het ontstaan en voortbestaan van een maagzweer verklaard worden; daarbij schrijft echter LEHMANN aan een neurogenen en spasmogenen component groote beteekenis toe.

K. FISCHER und H. SCHREUS. *Behandlungserfolge bei Prostatahypertrophie durch Röntgenbestrahlung und Vasektomie.* — In het eerste stadium verkrijgt men met bestraling en met vasectomie, in hardnekkige gevallen met beide tezamen, zeer goede uitkomsten. In het tweede en derde stadium echter zijn de resultaten der bestraling na bepaalde voorbereiding en voorafgaanden blijvenden catheter en vasectomie respectievelijk cystostomie, zóó gunstig, dat men deze niet mag nalaten, indien de lijder inoperabel is of operatie wordt geweigerd. Schrijvers geven korte hoge doses; men verergert den toestand hierdoor nooit. Werkelijk operabele gevallen moeten radicaal worden geopereerd.

C. J. KELLER. *Ein neuer transportabler Elektrokardiograph.* — Met afbeeldingen.

A. BIER. *Beiträge zur Heilkunde aus der chirurgischen Universitätsklinik in Berlin. IV. Abhandlung: Homöopathie. 3. Teil: Lässt sich die Homöopathie wissenschaftlich betreiben und begründen? (Schluss).*

L. VOIGT. *Die Behandlung der Aorten- und Herzsyphilis.* — Naar aanleiding van het artikel van MEYER wijst VOIGT erop, dat men met een langzame voorzichtige antiluetische behandeling onder zorgvuldige contrôle van het hart hierbij veel bereiken kan. Hij begint minstens 4 weken met joodkali per os, gaat daarna tot een niet te korte bismuthbehandeling over en begint daarna pas voorzichtig met een salvarsaanpraeparaat.

F. FRANKE. *Zur Behandlung der sog. Atherome (Epidermoide).* — Naar aanleiding van het artikel van LEVY deelt FRANKE een eenvoudige chirurgische behandeling mede, aan welke hij de voorkeur geeft boven de behandeling met den thermocauter van LEVY. Ook HALLA wijst in een korte mededeeling op de cosmetisch weinig fraaie litteekens, die de methode van LEVY achterlaat.

W. BIRK. *Ueber die Ernährungsbehandlung tuberkulöser Kinder, insbesondere mit HERRMANNSDORFERScher Kost.* — Uitvoerig zet BIRK uiteen, dat de vele bezwaren tegen het dieet van HERRMANNSDORFER niet opwegen tegen de geringe voordeelen. Het tuberculeuse kind mag volgens hem eten en drinken, wat het wil, men hoede zich tegen de eenzijdige voeding in een bepaalde richting: de hoofdzaak is, dat het kind zijn eetlust behoudt. Hij geeft gaarne wat veel vet, doch alleen als dit goed wordt verdragen.

E. VOGT. *Ueber Geburtsleitung.* — Overzicht. Slot volgt.

K. BARTH. *Brustdurchschnittsmesser.*

Münchener medizinische Wochenschrift, 1930, No. 31.

O. KLEIN. *Zur Bestimmung des zirkulatorischen Minutenvolumens beim Menschen nach dem FICKSchen Prinzip. (Gewinnung des gemischten venösen Blutes mittels Herzsondierung).* — Voor de bepaling van het minutenvolumen van het hart volgens FICK is een bepaling van het gasgehalte van het gemengde veneuse bloed, dat uit het rechter hart in de long stroomt, noodig. KLEIN bepaalt dit langs directen weg: hij volgt de methode van FORSSMANN en schuift door een geopende ader van den arm een ureterencatheter No. 6 centraalwaarts onder Röntgencontrôle in den rechter boezem en verkrijgt aldus het bloed. In 60 pCt. der gevallen gelukte hem dit.

W. SCHULZE. *Vollmarkosen mit Avertin-Magnesiumsulfat-Narkophin.* — Het

voordeel dezer narcose volgens MARTIN is, dat met het mengsel zonder bezwaar grootere giften avertine kunnen worden toegediend en zij daardoor ook voor groote operaties geschikt is. In bijzonderheden deelt SCHULZE zijn ervaringen bij 400 operaties mede, die zóó goed zijn, dat hij aan deze narcose de voorkeur geeft boven alle andere; bij operaties aan hoofd, hals, schouder, bij de electrocoagulatie van gezwellen en bij psychisch gevoelige patiënten.

I. BAGDASSARJANZ und M. TURKELTAUB. *Ueber den Einfluss des Muskelextraktes auf das Herz.* — Schrijvers deden onderzoekingen bij lijders aan angina pectoris met het spierextract van SCHWARZMANN (myol III), dat op deze ziekte een duidelijk guntigen invloed uitoefent. Het doet bij hypertonie den bloeddruk dalen, bij hypotonie stijgen, terwijl zich bij normotonie de bloeddruk weinig wijzigt. Voorts verlangzaamt het den hartrhythmus, het meest bij tachycardie; ook bij bradycardie wordt de pols nog langzamer, doch dit duurt niet langer dan 40—60 minuten, waarna vaak de hartswerking sneller wordt. De inwerking op den hartrhythmus is reeds 10 minuten na de onderhuidsche inspuiting merkbaar.

L. VON SEHT. *Ueber Bettruhe und Schonung bei Krankheitszuständen im Kindesalter.* — Het is opmerkelijk, dat de slecht gevoede, slecht verpleegde proletariërskinderen van allerlei ziekten vaak zooveel sneller genezen dan de kinderen uit betere standen. VON SEHT schrijft dit toe aan de meerdere vitaliteit van de eersten. Niet zelden ziet men zich rekkende ziekte-toestanden, zelfs met subfebriele temperaturen, snel genezen, als men de kinderen gewoon in de kamer, zelfs buiten, laat rondlopen en spelen.

B. H. U. MOHRMANN und B. HAJOS. *Untersuchungsergebnisse mit der vereinfachten serologischen Methodik der MÜLLER-Ballungsreaktion (M.B.R.II).* — Bij de nieuwe M.B.R.II is het resultaat reeds na 3 uren af te lezen, men kan met 0.35 cM³. serum volstaan. De methode is niet minder specifiek dan andere. Schrijvers vonden bij 407 onderzoekingen van lues de reactie van WASSERMANN bij 69.8 pCt. positief, de M.T.R. bij 79.6 pCt. en de M.B.R. II bij 94.6 pCt. Niet specifieke reacties bij niet-luetische patiënten werden op 749 onderzoekingen met de WASSERMANN-reactie bij 1.07 pCt. met de M.T.R. bij 1.07 pCt. en met de M.B.R. II bij 1.2 pCt. waargenomen.

F. LANYAR. *Ueber eine im Gastgewerbe beobachtete Wärmeschädigung der Hände.* — Herhaaldelijk nam LANYAR bij bordenspoelsters aan de handen verbrandingen van den tweeden graad waar.

O. NEUSTÄTTER. *Kritisches zu dem Artikel „Ueber die Möglichkeit der Entgiftung des Darminhaltes durch Neo-Kruschensalz (Quellsalz der Vangequelle)“.* — Scherpe bestrijding van HINZ en PINNER.

St. HEDIGER. *Zur Frage der Gasdurchlässigkeit der Haut.* — Opmerkingen bij het artikel van SALZMANN. Met antwoorden van DEDE en SALZMANN.

P. HÖRNIG. *Welchen Einfluss hat die Lebensversicherung von dem Rückgang der Sterblichkeit zu erwarten?* — Beantwoording van FÜRTH.

E. VOGT. *Ueber Geburtsleitung. (Schluss).* — Overzicht.

M. JOCHELSON. *Ein billiges und einfaches Netzanschlussgerät für Endoskopie, Stirnlampe u.s.w..* — Afgebeeld.

L. BÖHLER. *Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Unfallchirurgie.* — Voordracht.

Stellungnahme zur Indikation der künstlichen Schwangerschaftsunterbrechung. — Opvattingen hierover van HENKEL, LIEPMANN en MENGE.

F. KÖNIG. LUDWIG REHN †.

La Presse médicale. 1930, No. 58.

M. CHIRAY, A. JEANDEL et A. SALMON. *L'exploration du pancréas et l'injection intraveineuse de sécrétine purifiée.* — Overzicht van de verschillende methodes, indirecte en directe, met welke wij de pancreasafscheiding kunnen beoordeelen. Schrijvers geven aan de melkproef en de secretineproef de voorkeur, het meest aan de laatste. Na inbrenging van een duodenumsonde laten zij eerst door magnesiumsulfaat de gal A, B en C afvloeien en brengen daarna 60 cM³ warme melk in, die zij na een half uur aspireeren en waarin zij de pancreasenzymen bepalen. Deze methode is tijdroovender en geeft minder goede uitkomsten dan de secretineproef.

Secretine is een stof, die onder invloed van een zuur door het duodenumslimvlies wordt afgescheiden en die in hooge mate de pancreassecretie vermeerderd; sedert PENAU en SIMONNET haar leerden isoleeren, is zij in ampullen in den handel. De voorbereiding is als bij de melkproef; daarna wordt secretine intraveneus ingespoten en begint reeds na een minuut de sterkere pancreassecretie, welke telkens om de 5 minuten wordt gemeten en op fermenten onderzocht. Op deze wijze verkrijgt men bij normale pancreasfunctie een typische stijgende en dalende kromme. Afwijkingen hiervan bij pathologische toestanden en de bronnen van fouten, die nog aan de methode kleven, worden uitvoerig besproken.

F. RATHERY. *Le régime de BOUCHARDAT et les graisses chez les diabétiques; à propos de l'article de M. F. MAIGNON.* — Opmerking bij het artikel van MAIGNON.

La Presse médicale. 1930, No. 59.

M. LABBÉ, *Abcès du poumon probablement amibiasique guéri par l'émétine.* — Ziektegeschiedenis met radiogrammen.

M. LOEPER et L. MICHAUX, *Les leucopédèses viscérales étagées au cours de la digestion.* — De leucopenie, die zich bij het begin der spijsvertering voordoet, is toe te schrijven aan verplaatsing der leucocyten naar de buikorganen. In de maag vindt men deze leucocyten hoofdzakelijk in het maagsap, in den darm in den darmwand. Schrijvers bestudeerden deze leucopedesis in maag, darm, lever en nieren bij konijnen na toediening van wijn en verduidelijken hun bevindingen door vele afbeeldingen van histologische praeparaten. Bespreking van de rol, die deze leucocyten bij de digestie spelen.

G. PORTMANN. *L'amygdalectomie totale par la méthode de SLUDER.* — Operatietechniek, met vele afbeeldingen.

P. AMEUILLE, R. HUGUENIN et P. FOULON. *Etude anatomo-clinique de la pneumonie tuberculeuse.* — In hoofdzaak wordt het anatomische beeld van dezen vorm van tuberculose met behulp van vele histologische afbeeldingen besproken.

A. BERGERET et J. DUMONT. — *La formation et la structure des calculs biliaires.* — Uitvoerig wordt de bouw van galsteen met behulp van vele histologische afbeeldingen besproken. Het centrum en het geraamte bestaan uit mucus en pigment, waartusschen zich de kristallen van cholesterine afzetten. Voor het ontstaan der stenen zijn voorwaarden: een wijziging in de functie der levercellen en een wijziging in de slijmsecretie en het resorbeerend vermogen van het galblaasepithelium.

La Presse médicale. 1930, No. 60.

A. CALMETTE. *La vaccination préventive de la tuberculose par le BCG.* — Voorzigtig. CALMETTE weerlegt de verschillende bezwaren, die tegen zijn methode worden aangevoerd. Geen nieuwe gezichtspunten.

Ile Congrès international du paludisme.

La Presse médicale. 1930, No. 61.

L. LORTAT-JACOB et SOLENTE. *Grippe et réactions cutané-muqueuses.* — Schrijvers bespreken met behulp van de literatuur de verschillende afwijkingen der huid, die bij griep kunnen voorkomen en van welke sommige op de epidemie hun stempel drukken. Dit zijn herpes, rash, verhoogde zweetafscheiding met sudamina, herpes zoster, huidetteringen en -gangraen, purpura, polymorphe erythemen, scarlatini-forme en morbilliforme erythemen, erythema nodosum, alopecie, roseola, erythema circinatum, oedemen, papuleuse erupties, urticaria enz. Daarbij worden besproken afwijkingen van de tong, tranenvloed, smaakstoornissen, vermindering der zogsecretie enz.

A. MAURER et J. CORDIER. *Considérations d'anatomie chirurgicale sur le dôme pleural et les espaces intercostaux à l'occasion de la thoracoplastie.* — Anatomie van pleurakoepel en intercostaalruimten, hun verhouding tot de vaten en zenuwen, met behulp van afbeeldingen besproken in verband met thoracoplastische operaties.

La Presse médicale, 1930, No. 62.

M. LABBÉ. *Évolution du diabète infantile sous l'influence du traitement par le régime et l'insuline.* — De kinderdiabetes is doorgaans ongecompliceerd en leent

zich zeer goed voor de insulinebehandeling. Het gelukt in den regel door diëet en insuline de patiënten in volmaakte gezondheid te houden, ook als de tolerantie voor koolhydraten, zooals doorgaans geschiedt, vermindert en deze pancreasfunctien slotte als practisch geheel opgeheven is te beschouwen. Insuline geneest de ziekte nooit, verlangzaamt wel den achteruitgang. De aldus behandelde kinderen ontwikkelen zich gewoonlijk normaal, hoewel een reeds bestaande hypotrophie door insuline niet wordt opgeheven. Infecties, geestelijke inspanning (examens enz.) verergeren voorbijgaand de acidosis en de glycosurie. De oorzaak van den kinderdabetes is onbekend. Ook lichte gevallen behandelde men steeds met insuline.

L. PLAZY. *Fièvre exanthématique et réaction de WEIL-FELIX*. — PLAZY bestudeerde deze ziekte in Toulon en acht haar identiek met de exanthematische koorts, die in Marseille wordt waargenomen. Hij vond de reactie van WEIL-FELIX in den regel positief. Bij verschillende gevallen van een dergelijke ziekte, waargenomen in Tunis, Marocco enz., was deze reactie negatief. Misschien is de reden van dit verschil, dat de reactie niet lang genoeg werd gecontroleerd: meestal wordt zij pas laat, aan het einde der koortsperiode of bij het begin der apyrexie, positief.

L. H. LEROUX. *La pratique des injections sclérosantes en rhinologie*. — LEROUX verkreeg in het bijzonder bij de vasomotorische rhinitis zeer goede uitkomsten met inspuitingen van een 5 pCt. oplossing van het dubbele chloorhydraat van kinine en ureum. In bijzonderheden wordt de techniek der behandeling beschreven.

P. SMIT.

La Riforma medica. 1930. No. 15.

F. HEMIJEAU. *I medicamenti cardiovascolari*. Clinische les.

GABRIELE MONASTERIO e ELISA CAMPESE. *L'azione delle sostanze fotodinamiche sulla glicemia*. De invloed van eenige photodynamische stoffen op de koolhydraatstofwisseling werd nagegaan. De hyper- en de hypoglycaemie, die endoveneuse inspuitingen van tripaflavine bij konijnen veroorzaakt, staat sterk onder invloed van licht.

CARMELO BRUNI. *Pielotomia e nefrotomia nella litiasi venale*. Mededeeling van de uitkomsten verkregen met pyelotomie en nephrotomie in een aantal gevallen van lithiasis renale.

La Riforma medica. 1930. No. 16.

I. IACONO. *Contributo allo studio della biologia di taluni blastomiceti*. Bij ratten werd in de longen gebracht 1 cM³ van een emulsie van blastomyceta A. Als regel stierven de dieren zeer gauw. Bij konijnen was het beloop meer chronisch. Bij de gevoelige ratten ontstaan sporangia, die tot meer dan 100 sporen bevatten, die spoedig rijp worden en zich in het weefsel uitzaaien en aanleiding geven tot weefselvernietiging en het ontstaan van cavernes. Bij de minder gevoelige konijnen bevatten de sporangia slechts 8 tot 12 sporen. Als histologische laesie ziet men mycotische granulomen ontstaan.

GINO MORO. *Sviluppo del taglio dell' addome destro del Solieri*. — Over de buiksneede volgens SOLIERI.

La Riforma medica. 1930. No. 17.

GIORGIO MILLUL. *Idropionefrose in rene a ferro di cavallo*. Beschrijving van een geval van hydropionefrose in een hoefijzernier bij een 20-jarige vrouw.

FRANCESCO CATANO. *Un quadriennio di esperienze sulla vaccinoterapia locale*. — Ondervindingen gedurende 25 jaar omtrent plaatselijke vaccinothérapie.

VITTORIO ALBERTI. *Aneurisma vero*. — Beschrijving van een aneurysma van de A. articul. sup. lat. van de knie bij iemand van 38 jaar. Het aneurysma was zeer groot. Enucléatie gaf genezing.

La Riforma medica. 1930. No. 18.

UMBERTO SARAVAL. *Come si devono curare i fratturati della mandibola*. — Om bij kaakbreuken in alle opzichten een goede genezing te verkrijgen, is het noodig, dat na nauwkeurige desinfectie van de mondholte de losse beenstukken en de

tanden, die in de buurt van de breuk zitten, worden verwijderd en de breukstukken worden verbonden door een metalen brug en buizen.

HANS CURSCHMANN. *In rapporti del vomito acetonemico periodico con la emicrania.* — Clinische les over het verband tusschen het periodisch braken (acetonemisch) en hemicrania.

MARES IOLLIDORI. *Contributo sullo strozzamento erniario del diverticolo di MECKEL.* — Twee gevallen van beklemde breuk aan het diverticulum MECKELI.

La Riforma medica. 1930. No. 19.

CAMILLO NINNI. *L'esistenza dell'ultravirus tubercolare.* — Beschrijving van de resultaten van eenige proeven (niet in 't kort weer te geven), die met zekerheid het bestaan van een tuberculeus ultravirus zouden aantoonen.

GUIDO LAMI e GUISEPPINA ACQUAFREDDA. *L'azione dinamico-specifica come riflesso vegetativo.* — Na een gemengd „standaard-ontbijt” werden bepaald de krommen van de ademhalingsstofwisseling (met het toestel van KNIPPING), van de glycaemie (methode FOLIN-WU) en van het urinegehalte van het bloed (methode VAN SLIJKE). De schrijvers deden dit met en zonder voorafgaande inspuiting van ergotamine en beschouwen hunne proeven als een nieuw bewijs ten gunste van de interpretatie van de specifiek dynamische werking als vegetatieve reflex.

CANDIDO MEDULLA. *Sopra alcuni casi di forma morbosa riferibile alla febbre bottonosa di Tunisi osservati in Cirenaica.* — Eenige gevallen van „febris bothonosus van Tunis” waargenomen in Cirenaica.

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Medizinische Klinik, 1930, No. 15.

W. BUDDE. *Ueber Allgemeinwirkungen chirurgischer Eingriffe.* — Elke chirurgische ingreep heeft een zekeren invloed op het geheele organisme. Geschiedt de ingreep in de negatieve phase van de infectie, wanneer de infectie de overhand heeft, dan kan de operatie den toestand slechter maken (zoo bij pneumococconperitonitis, bij osteomyelitis in het eerste stadium). Het altijd tijdelijke resultaat bij nerveuse buikklachten (intestinale vegetatieve neurose) mag geen reden zijn om tot operatie over te gaan, daar de tusschentijden van welbevinden na een operatie bij deze patiënten steeds kleiner worden.

R. SCHMIDT. *Zur Pathogenese und Klinik der „anginösen” Schmerzzustände.* — Slot van het artikel in Nr. 14. Bespreking van de clinische verschijnselen van den aanval en uiteenzetting over de behandeling.

E. HEYMANN. *Chirurgische Eingriffe mit Hochfrequenzströmen.* — Snijden met den hoogfrequenten stroom heeft groote voordeelen, o.a. de gemakkelijke bloedstelping, daar alleen de grootere vaten behoeven te worden onderbonden. Een bezwaar is bij hersenoperatie, dat het instrument soms een sterke prikkelende werking op de zenuwcentra uitoeft, waardoor lastige spiercontracties ontstaan.

H. EHRENWALD. *Blutreiz und Gemeingefühl.* — Veranderingen in de scheikundige samenstelling van het bloed kunnen worden waargenomen; men denke slechts aan het gevoel van warmte na een intraveneuse calciuminjectie. Dit gaat waarschijnlijk door het centrale zenuwstelsel, dat door het bloed wordt omspoeld. Misschien hebben echter de binnenwanden der bloedvaten ookeen zekere gevoeligheid.

H. GEBHARDT. *Beobachtungen bei einer Masernepidemie im Flüchtlingslager zu Prenzlau.* — Deze epidemie gaf in een zeer groot percentage der gevallen (67 pCt.) verwickelingen. Het sterftcijfer was dan ook zeer hoog: 49 van 208 gevallen (23,7 pCt.).

H. KAISER. *Weiterer Beitrag zur Kenntnis familiärer doppelseitiger Hüftgelenkaffektionen.* — In een familie ontwikkelden zich bij moeder en dochter zware heupgewrichtsveranderingen. Zij zijn bij beiden het sterkst rechts. Bij beiden vindt men Röntgenologisch een os acetabuli.

K. GIRSCHEK. *Nystagmus auf einem Auge bei Augenmuskellähmung.* — Lichte oogspierverlammingen zijn soms vast te stellen door het waarnemen van nystagmus bij bepaalde oogstanden, alleen aan het zieke oog.

W. H. CROHN. *Septische Endocarditis durch Bacillus FRIEDLÄNDER.* — Casuïstiek.
G. EMANUEL und H. ROSENFELD. *Die Mastix-Lumbotets-Reaktion nach EMANUEL und ROSENFELD, und ihre Bedeutung für die Diagnose der Neurolyues.* — Deze reactie, die technisch eenvoudig is, geeft betrouwbare resultaten.

H. WALTHER. *Secale-Exclud-Zäpfchen „Reiss“, eine neue Secale-Verordnung.* — Aanbeveling.

W. VOIGT. *Meine Erfahrungen mit dem Kopfschmerzmittel „Theal“.* — Dit middel bevat gebruikelijke antipyretica, benevens saponine met het doel de resorptie te versnellen.

GOLDBERGER. *Behandlung des Speiseröhrenkrampfes mit Neuromag.* — Dit middel werkt spasmolytisch en had in één geval van oesophagospasmus uitstekende werking

P. VAN PAASSEN.

Paris médical. 1930, No. 25.

TIFFENEAU. *La pharmacologie en 1930.* — Literatuuroverzicht.

M. TIFFENEAU, J. LEVY et D. BROUN. *Influence exercée par les variations de la réaction du milieu intérieur chez l'épinoche sur l'action d'un hypnotique barbiturique, le sonéryl.* — Beschrijving van proeven om den invloed te onderzoeken van zure en alcalische milieu's op de werking van het slaapmiddel *soneryl*. Daartoe werden de tijd van inslapen en de tijd van ontwaken nauwkeurig bepaald bij stekelbaarsen, door aan het water het slaapmiddel, al of niet gemengd met melkzuur of natriumcarbonaat toe te voegen. Toevoeging van melkzuur verkort den inslapingstijd, alcali verlengt dezen.

Paris médical. 1930, No. 26.

NOBECOURT. *Pleurésie purulente félide à pneumocoques, pleurésies purulentes à pneumocoques prolongées et à reprises.*

Clinische les over etterophooping in de long en tusschen de pleurabladen. Deze kunnen, vooral bij kinderen, soms van zeer langen duur zijn. Hij beschrijft een geval van een kind, dat negen jaar ziek bleef. Bij andere kinderen ziet men, nog na verloop van verschillende jaren, plotseling recidieven ontstaan van de etterige pleuritis. Herhaalde operaties zijn noodig. De prognose der diep in de long liggende etterholten is meestal ernstig. In den etter vindt men steeds pneumococcen.

M. CHIRAY et A. LOMON. *Diagnostic de la lithase vésiculaire sans complications.* — Uitvoerig overzicht van de symptomatologie van de verschillende ziektebeelden, waaronder de galsteenziekte zich voordoet. Beschrijving van eenige laboratoriummethodes, om galstenen te diagnosticeeren.

PILADE POLLAZZI. *Traitement bacteriothérapeutique de quelques maladies des urinaires.* — Theoretische overwegingen om blaasontstekingen, veroorzaakt door den colibacil, te behandelen met een emulsie van den bacillus bulgaricus, welke laatste de ontwikkeling van den colibacil tegengaat.

Paris médical. 1930, No. 27.

P. HARVIER et J. HEITZ. *Les maladies du coeur et des vaisseaux en 1930.* — Literatuuroverzicht.

E. GERAUDEL et J. LEREBoullet. *Syndrome D'ADAMS-STOKES à évolution rapide par thrombose de la coronaire droite et de l'artère du ventriculo-necteur.* — Ziektegeschiedenis met uitgebreid sectieverslag van een man, lijdende aan hartblok. De bundel van HIS was normaal. De rechter coronair-arterie vertoonde afwijkingen. In den tekst electro-cardiogrammen en micro-photo's van de histologische afwijkingen.

P. HARVIER et J. CAROLI. *Sur un cas d'anévrysme de la pointe du coeur. Etude clinique, radiologique et anatomique.* — Casuïstische mededeeling over een tijdens het leven diagnosticeerd aneurysma van de hartpunt. Talrijke schetsmatige afbeeldingen naar Röntgenphoto's, met electrocardiogrammen in den tekst. Beschrijving der klinische verschijnselen.

Paris médical. 1930, No. 28.

N. OMER et M. HAYRULLAH. *Sur un cas de syndrome basedowien révélé par des vomissements incoercibles.* — Mededeeling over den ziekte-toestand van eene vrouw, lijdende aan hardnekkig braken. Dit ging gepaard met tachycardie en zweeten.

Verhoogde grondstofwisseling. Na behandeling met oplossing van LUGOL en galvanisatie van de schildklier volgde belangrijke verbetering.

M. BABALIAN et Melle REITLINGER. *Troubles causés par les colorants des fourrures. Troubles cutanés et troubles respiratoires.* — Bij vrouwen, die arbeiden in werkplaatsen, waar bont gekleurd wordt met anilinekleurstoffen, in het bijzonder met *ursol*, ziet men dikwijls huidaandoeningen zooals eczeem en prurigo. Ook slijmvlies-aandoeningen van oogen en luchtpijpen, soms gepaard met asthmatische benauwdheden. Vrouwen, die bont dragen, vertoonen eveneens soms huidafwijkingen door de gebruikte kleurstof. Verschillende theorieën worden vermeld; om deze overgevoeligheid te verklaren. De therapie is machteloos, tenzij de aanraking met de schadelijke kleurstoffen vermeden kan worden.

G. F. CAPUANI. *Pneumothorax et auro-thérapie associés dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.* — Studie over de behandeling van longtuberculose met pneumothorax en sanocrysine-inspuitingen. Deze laatste helpen zeer goed bij beginnende tuberculeuse infiltraten. Het beste gevolg zag de schrijver bij lijders, bij wie aan de andere zijde verschijnselen van een verschen, tuberculeus haard aanwezig waren, of ontstonden tijdens de behandeling. Van 24 lijders, behandeld met pneumothorax en uitbreiding aan de andere zijde, werd bij 20 een gunstige invloed gezien door de gecombineerde therapie van luchtinblazen en goudinspuitingen.

G. ROSENTHAL. *La chirurgie pulmonaire post-pneumothorax démontrée par la clinique et l'expérimentation.* — Naar aanleiding van de publicaties van professor J. ARCÉ uit Buenos-Ayres wordt een overzicht gegeven van de nieuwere techniek op het gebied der longchirurgie.

MORTIER HIJMANS.

The Lancet, No. 5578, 26 Juli 1930.

HARVEY CUSHING. *Neurohypophysial mechanisms from a clinical standpoint*, II. — Blijkens de zeer talrijke proeven, waarvan een overzicht wordt gegeven, staan de functies, waarvan de regeling in den bodem van den 3den ventrikel is gelegen (water-, vet- en suikerhuishouding, grondstofwisseling, temperatuur, slaap) ook onder invloed van de achterkwabhormonen, die blijkbaar deze centra activeeren. Door een aantal gevallen van chiasma-gezwel en gezwellen van den ductus craniopharyngeus wordt dit klinisch geïllustreerd.

J. S. M. CONNELL. *The use of avertin in childbirth.* — Avertine, toegediend tegen dat de weeën flink pijnlijk worden en de ontsluiting over de helft is, geeft in een dosis van 75 mgr. per kilo gewicht een toestand van slaap tusschen de weeën en weinig pijnlijke, ongestoorde weeën, die doorgaans tot na de uitdrijving voldoende blijft. Geen nadeelig effect op beloop van baring en na-tijdperk en op het kind. Bij primiparae wordt in het voorafgaande ontsluitingstijdperk morphine gegeven. De barende is tijdens de werking niet in staat op zichzelf te letten, doch behoeft geen doorlopend geneeskundig toezicht.

A. W. ELMER and M. S. CHEPS. *Comparative researches on the galactose and laevulose test for hepatic efficiency.* — De galactose-proef, bepaald met behulp van de stijging van het bloedsuikergehalte, is bij onvoldoende leverbewerking regelmatig en veelal duidelijker positief dan de laevuloseproef, en daarom te verkiezen.

ADAM L. K. RANKIN. *Puerperal infection: a bacteriological study.* — Bij aeroob kweken van den uterusinhoud blijkt een reïncultuur van haemolytische streptococci, doorgaans *S. pyogenes*, meestal met ernstige sepsis samen te gaan; niet-haemolytische streptococci met matig ernstige infectie, terwijl het opkomen van gemengde stammen, waaronder ook streptococci kunnen zijn, voor een meer goedaardige infectie pleit.

C. F. T. EAST and E. R. CULLINAN. *Nirvanol in the treatment of chorea.* — Van 15 patiëntjes verbeterden 13 na „nirvanolreactie” en kregen 2 geen reactie en ook geen verbetering. Bij twee ontstond korten tijd later rheuma.

G. NORMAN CLARK. *A case of thrombo-angiitis obliterans.* — Bij man van 40 jaar zonder lues ontstaan obliteraties in de vertakkingen der a. poplitea, die amputatie noodig maken.

J. PINKHOF.