

LITERATUUR-OVERZICHTEN.

WEEKBLADEN.

Münchener medizinische Wochenschrift, 1930, No. 39.

E. BECHER. *Vorkommen und Ursachen der Anämie bei Nierenkrankheiten.* — De bleeke kleur van nierlijders is doorgaans gevolg van echte secundaire anaemie met lagen kleurindex. Een matige anaemie (haemoglobine 70 pCt.) komt ook zonder echte nierinsufficiëntie voor als gevolg van haematurie, van de ziekteoorzaak, misschien ook door slechte bloedverzorging der bloedvormende organen. Ook vindt men anaemieën door hydraemie door waterretentie in de vaten of resorptie van oedemen; bij anurie kan bloedverduunning ontstaan, doordat ten gevolge van ureumretentie weefselvloeistof overgaat in het bloed. Een zware anaemie (haemoglobine 50 pCt.) komt voor bij echte nierinsufficiëntie tengevolge van retentie van rottingsproducten uit den darm in bloed en weefsels: dit is een anaemie door verminderde bloedvorming.

G. SCHAD. *Ueber die Inkubationszeit bei Typhus.* — De duur der incubatie hangt bij typhus niet alleen af van het aantal bacteriën, doch ook van hun toestand. Het bleek bij een epidemie in Weissenburg, dat de incubatie langer was bij personen, die besmet waren door vanilleijs, dus met bacteriën, die bevroren waren geweest. Bij dierproeven stierven minder dieren, indien de bacteriën, met welke zij waren besmet, tevoren bevroren waren.

E. LÖWENSTEIN. *Die klinische Bedeutung der Tuberkelbazillämie.* — Met behulp van zijn voedingsbodem (ei, asparagine en congorood) kon LÖWENSTEIN aantoonen, dat bij tuberculose dikwijls tuberkelbacillen in het bloed voorkomen, ook waar geen koorts aanwezig is en bij schijnbaar herstelde patiënten. Herhaaldelijk werd hierdoor in twijfelachtige gevallen de diagnose zeker. Bij 44 lijders aan verschillende vormen van huidtuberculose was de bloedcultuur 33 maal positief. Hij maakt voorts opmerkzaam op het regelmatige voorkomen van tuberkelbacillen in het bloed bij acuut gewrichtsrheumatisme. Dit onderzoek is volgens hem klinisch van meer belang dan de tuberculineproef.

A. LANDAU. *Eine Tuberkuloseinfektion in einer Schule.* — In een klasse van meisjes van 10—12 jaren, onder welke zich een kind met open tuberculose bevond, vertoonden zich 3 gevallen van erythema nodosum. Dit was voor LANDAU reden om alle 30 kinderen uitvoerig te onderzoeken op tuberculose (Röntgenbeeld, tuberculine enz.). Van deze bleken 83,4 pCt met tuberculose besmet te zijn. Deze waarneming leert, hoe noodzakelijk het is, dat schoolartsen zorgvuldig dergelijke infectiehaarden in de school opzoeken.

J. SIEGL und K. HASSMANN. *Zur Diphtherieprophylaxe mit der Schutzsalbe von LÖWENSTEIN.* — Schrijvers achten deze gemakkelijke immuniseeringsmethode zeer bruikbaar; men geeft 3 inwrijvingen in de huid van 3 c.M³ zalf van LÖWENSTEIN, om de 10—14 dagen een. Vier maanden na de laatste inwrijving was bij 80 pCt. der behandelde personen de reactie van SCHICK negatief geworden.

S. BECK. *Beiträge zur Heilkunde aus der chirurgischen Universitätsklinik in Berlin. V. Abhandlung: Der Schwefel. 3 Teil: Tierversuche über die Beeinflussung von Staphylokokkeninfektionen durch kolloidalen Schwefel.* — Alleen sulfur D 3 oefent bij dieren op het beloop van abscessen en infiltraten een gunstigen invloed uit. Bij aanwezigheid van veel bacteriën in een infiltraat kan het echter de abscessvorming niet voorkomen, wel bij de aanwezigheid van weinig bacteriën.

S. LEVINGER. *Darf während oder bald nach Ablauf einer akuten entzündlichen Erkrankung der Tonsille tonsillektomiert werden?* — LEVINGER beantwoordt volgens zijn ervaring bij 235 patiënten deze vraag bevestigend en dringt zelfs op operatie aan, indien men de ectomie van de onderste pool der tonsil vermijdt.

K. H. STAUDER. *Ueber Erfahrungen mit der 20 proz. Luminallösung.* — STAUDER is over inspuitingen met deze luminaloplossing, die tegenwoordig in bestendigen

vorm in ampullen is te verkrijgen, bij allerlei opwindingstoestanden zeer tevreden. De werking begint na 25—30 minuten en is tegen zware opwinding niet voldoende (hij geeft dan de voorkeur aan pantopon-hyoscine). Luminal kan ook met scopolamine of hyoscine worden gecombineerd.

M. NOVAK. *Schmerzverhütung und Therapie bei Brandwunden*. — Men kan de pijn van brandwonden onmiddellijk opheffen door compressen, gedrenkt in een met het bloed iso-alcalische oplossing van een pijnstillend middel. De door NOVAK gebruikte vloeistof bevat alle in het bloedserum aanwezige anionen en cationen benevens 2—4 pCt. p. aminobenzoyldiaethylaminoethanol DAB VI en 0—0.003 pCt. bijnierpraeparaat. Hij behandelt de wonden verder droog met jodoform of dermatol.

J. KRONER. *Die Behandlung der chronischen Polyarthrites im Spätstadium*. (Schluss folgt).

E. SECKENDORF. *Die erste gedruckte Nürnberger Medizinalordnung*. (Ein Beispiel für Entstehung und Inhalt früherer Medizinalordnungen).

E. PFLAUMER. *Der Ureterstein, seine Diagnose und Behandlung*. (Schluss folgt).

H. GABLER und PH. KLEE. *Ein neuer, transportabler Elektrokardiograph*. — Opmerkingen bij het artikel van KELLER. Met beantwoording door dezen.

F. J. HOLZER. *Eine einfache Vorrichtung zum Absaugen kleinster Flüssigkeitsmengen vom Bodensatz*. — Met afbeeldingen van het instrumentarium.

A. HOFFMANN. *Die Notverordnung vom 26 Juli 1930 und die Hessischen Aerzte*.

W. HANSING. *Medicus practicus redivivus*.

La Presse médicale, 1930, No. 73.

M. LABBÉ. *De quelques erreurs dans l'emploi de l'insuline chez les diabétiques*. — Een der voornaamste dwalingen is het verwaarloozen van het diëet naast de insulinekuur, voorts het intermitterend toedienen van insuline, het toedienen op andere wijze dan door inspuiting, het door sommige artsen aanbevolen gebruik van suiker na elke insuline-inspuiting enz.

A. FEIL. *La silicose pulmonaire*. — Cliniek en diagnostiek der silicose volgens de nieuwste opvattingen.

R. CHABRUT. *Contribution à l'étude de la contusion herniaire*. — Een contusie van een breuk treft bijna uitsluitend liesbreuken. Een gering trauma kan tot darmverscheuring leiden. Indien men verschijnselen vindt van darmscheuring, peritonitis, inklemming, bloeding in den breukzak na contusie, beproeve men nooit taxis, doch opereere men onmiddellijk. Casuïstiek.

La Presse médicale. 1930, No. 74.

R. LERICHE et R. FONTAINE. *Etude expérimentale de l'influence de la section de la moelle sur la pression artérielle; application à l'étude du choc chirurgical et du choc traumatique*. — Uit de proeven der schrijvers blijkt, dat, indien op een hooge doorsnijding van het ruggemerg daling van den bloeddruk volgt, deze is toe te schrijven aan den schok door het bloedverlies bij de operatie en niet aan een paralytische vaatverwijding, gevolg van de scheiding van ruggemerg en bovenste intrabulbaire vasomotorische centrum. Bij elken traumatischen en operatieven schok speelt het bloedverlies de hoofdrol.

A. DUMAS, H. GARDÈRE et BADINANT. *Les albumines et le quotient albumineux du sérum dans l'hypertension et l'hypotension artérielle*. — Bij hypotensie vindt men hypoalbuminose van het serum, bij hypertensie hyperalbuminose. De verhouding tusschen serine en globuline is hierbij echter niet altijd dezelfde: bij hypo- en hypertensie zonder stoornissen is deze verhouding niet of weinig gewijzigd, het quotient dus ongeveer normaal. Bij hypo- en hypertensie met stoornissen (koorts, collaps, decompensatie) is het gehalte aan globuline verhoogd, dus het quotient verlaagd. Als uiting van een verdedigingsreactie vermeerderd het globuline of vermindert niet, terwijl de daling van het serinegehalte voortgaat.

R. GOIFFON. *Étude de l'équilibre acide-base par l'analyse d'urine*. — In bijzonder-

heden worden de techniek van dit urineonderzoek en zijn klinische beteekenis uiteengezet. Literatuuroverzicht.

F. LEBEUF et H. MOLLARD. *Les aurides muqueuses et cutanées*. — De behandeling met goud kan tot afwijkingen aan slijmvliezen en huid leiden, welke schrijvers uitvoerig bespreken (stomatitis, erythemen, erythrodermieën, purpura, pruritus, urticaria, eczematiforme dermatitiden, metastatische afwijkingen en eenige zeldzamere huidaandoeningen). De moderne lage doseering heeft deze stoornissen zeldzamer gemaakt, doch niet opgeheven.

J. FLIEDERBAUM. *Le traitement de l'abcès du poumon et de la gangrène pulmonaire par l'émétine*. — Met emetine, intramusculair ingespoten, verkrijgt men dikwijls bij longgangreen en longabsces zeer goede uitkomsten. De verbetering treedt echter op zijn vroegst na een week in, zoodat men in ernstige gevallen met het sneller werkende novarsenobenzol moet beginnen. Sommige gevallen reageeren gunstig op novarsenobenzol en niet op emetine, andere omgekeerd. Emetine werkt onmiddellijk bacteriedoodend en ondersteunt door het opwekken van leucocytose het organisme in zijn strijd tegen de bacteriën.

XXXIVe Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.

P. SMIT.

Hospitalstidende. 1930, No. 29.

TORBEN GEILL. *Studier over Icterus*. — Bij 43 icteruspatiënten, die ambuland werden behandeld, en waarvan er 31 leden aan acute epidemische hepatitis, werd nagegaan hoe vaak bradycardie en hypotensie voorkwamen. Van 15 vrouwen hadden slechts drie bradycardie, van de 28 mannen 21. Hypotensie (bloeddruk 100) werd gevonden bij 22 icteruslijders (10 vrouwen en 12 mannen). Zeer dikwijls werd een capillairpols gezien.

CHRISTIAN KIRKEGAARD. *To Tilfaelde af Ulcus ventriculi*. — Clinische mededeeling.

Hospitalstidende. 1930, No. 30.

P. VOGT-MØLLER. *Om Pathogenesen ved Mb. BASEDOWII i Relation til REID HUNT'S Reaktion*. — Na een overzicht over vroegere mededeelingen over de reactie van REID HUNT worden de resultaten medegedeeld van proeven met tyrosine, tyramine, dijoodtyrosine, hypophyseopton en testesopton. Zij gaven geen verandering in den uitslag ervan. Een positieve reactie werd verkregen met sera van menschen met een „hyperthyreoide constitutie”, met sera van patiënten lijdende aan morb. BASEDOWII, of ernstige nephritis. Ook met serum van een normaal mensch onmiddellijk na een intraveneuse thyroxine-injectie. Negatieve resultaten werden verkregen met serum van normale personen en van lijders aan verschillende ziekten of van normale personen na toediening van joodkalium. De volgende hypothese wordt opgesteld. Bij een gedisponeerd individu ontstaat op grond van de algemeene bekende oorzaken, ook of wel zonder die oorzaken, een hyperfunctie van de thyréoidea. De vermeerderde hormoonhoeveelheid in het bloed veroorzaakt door bemiddeling van den sympathicus een nieraandoening, waardoor in meerdere of mindere mate de elimineering van het thyroxine gehinderd wordt en daardoor de M. BASEDOWII te voorschijn geroepen.

Hospitalstidende. 1930, No. 31.

OLUF THOMSON og TAGE CHRISTIANSEN. *WASSERMANN-Reaktionens Forhold hos eksperimentel-syfilittiske Kaniner*. — Door de gevolgde techniek, die zeer nauwkeurig wordt beschreven, is het mogelijk de reactie van WASSERMANN van week tot week na te gaan. Bij luetisch geïnfecteerde dieren (testisinoculatie) ontwikkelt zich een krachtig positieve reactie, vijf tot zes weken na de infectie. Dit blijft zoo geruimen tijd, soms zelfs maanden lang, tot de reactie ophoudt positief te zijn, wat soms plotseling geschiedt, zelfs als er nog duidelijke secundaire affecten zijn.

Zes tot acht maanden na de infectie is de reactie van WASSERMANN bij de dieren negatief of zeer zwak positief, onafhankelijk van het klinisch beloop der ziekte.

C. ORTMANN. *Et Tilfaelde af Claudicatio intermittens som Folge af Skudlæsion.* — Een geval van intermitterend hinken, ten gevolge van een schotwond.

G. SCHRØDER og AAGE NYFELDT. — *Symptomatiske Blodforandringer ved Nervesygdomme.* — Wordt voortgezet.

Hospitalstidende, 1930, No. 32.

G. SCHRØDER og AAGE NYFELDT. *Symptomatiske Blodforandringer ved Nervesygdomme.* — Bij een zeer groot aantal verschillende zenuwziekten werd het bloedbeeld onderzocht. Het gelukte echter niet uit deze onderzoeken een bepaalde gevolgtrekking te maken.

AAGE KRISTJANSEN. *PIRQUET'S Tuberkulinreaktion som Aarsag hil generelle Hudfænomener.* — Beschrijving van een paar gevallen, die aantoonen dat de huidreactie van VON PIRQUET aanleiding kan geven tot belangrijke huidstoornissen.

W. A. A. VAN BINSBERGEN.

Medizinische Klinik, 1930, No. 21.

H. RICHTER. *Die Prüfung des Vestibularapparates und ihre klinisch-diagnostische Bedeutung.* — Voordracht.

W. BENTHIN. *Die Diagnose der Myome.* — Beschouwing. Slot volgt.

E. G. K. WOLFF. *Weitere Erfahrungen in der Behandlung der Anaemia perniciosa.* — De lever- en ventraemonbehandeling hebben de groote bloedtransfusies nog niet onnoodig gemaakt. De leverpraeparaten zijn onmisbaar, omdat de dosis lever vaak veel grooter genomen moet worden dan door het eten van lever als zoodanig mogelijk is. Schrijver gaat wel tot 500 en 1000 gr. lever per dag. Ook met de beste behandeling blijft de prognose tamelijk slecht, wanneer het haemoglobinegehalte beneden 20 pCt. SAHLI gedaald is.

D. PULVERMACHER. *Ueber die Zweifelsche Achsenzugzange.*

A. STERN. *Periodische Abducenslähmung.* — Recidiveerende eenzijdige abducensverlamming bij een vrouw van 28 jaar, die telkens na een migraine-aanval van 1—2 dagen ontstaat.

F. BAUMANN. *Kasuistischer Beitrag zur Frage der sogenannten akuten aleukämischen Lymphadenose.* — Twee ziektegeschiedenissen.

A. MEYER. *Toxische Schädigung des Granulocytenapparates als wahrscheinliche Folge von Salvarsanbehandlung.* — Sterke leucopenie (tot 2800) met relatieve lymphocytose na salvarsaanbehandeling. Genezing na Röntgenbestraling der beenderen.

F. LEBERMANN. *Nierenkrankung oder Hypothyreose?* — Een patiënte met albuminurie, oedemen, lichte bloeddrukverhooging genas snel onder thyroxinebehandeling. Daar de patiënte bovendien verschillende kenmerken van een aandoening der klieren met inwendige afscheiding vertoonde (infantilisme, hypogenitalisme, gebrekkige geestelijke ontwikkeling) verdiept schrijver zich in beschouwingen in hoeverre de thyroxine als algemeen diureticum heeft gewerkt of als middel tegen de stoornis der interne secretie. Een proef met antithyreoidine gaf geen zeker uitsluitsel, doch pleitte eenigszins voor de laatste opvatting.

K. STAUNIG. *Ueber Zusammenhänge zwischen Medizin und Naturwissenschaft.* — Beschouwing.

F. KRAUSS. *Neophen, ein neues Antineuralgikum und Analgetikum.* — Bevat calcium, codeïne, coffeine, phenacetine en veramon.

O. STRAUZ. *Ueber Krebs und Krebsbehandlung.* — Wordt vervolgd.

P. VAN PAASSEN.

The Lancet, No. 5586, 20 September 1930.

Sir CHARLIS J. MARTIN. *Thermal adjustment of man and animals to external conditions*, II. — Behandelt den invloed van de temperatuur op de grootte der verbranding, gemeten aan de koolzuurproductie. Afkoeling geeft bij den mensch, ook bij het achterwege blijven van bibberen, een vermeerdering der ruststofwisseling, die individueel echter uiteenloopt. Ook in de verschillende jaargetijden kan men

deze verschillen waarnemen. Bij tropische warmte ziet men een verlaging van de stofwisseling, mits de hitte de lichaamstemperatuur niet verhoogt. Deze verandering volgt die der buitentemperatuur pas na eenige dagen; vermoedelijk heeft de verandering o. m. plaats onder invloed van de schildklier.

DEAN DE WITT LEWIS. *Congenital arteriovenous fistulae*, I. — Eenige gevallen. De aandoening als zoodanig is niet aangeboren, doch ontstaat, al of niet door een licht trauma, uit een abnormalen vaataanleg, die zich ontwikkelt tot het angioma circoïdes, waarin secundair anastomose kan ontstaan. De toestand geeft aanleiding tot polsversnelling (via den vagus, tengevolge van verlaagden bloeddruk), die bij druk op het toevoerende vat wordt opgeheven. Evenals bij aorta-insufficiëntie lijdt de coronaire bloedsomloop onder den lagen diastolischen druk en kan hartuitzetting ontstaan.

G. T. HEBERT. *Cog-wheel breathing*. — „Gesaccadeerd ademen” is in de minderheid der gevallen het gevolg van onregelmatige borstkasbeweging bij diep zuchten, en meestal synchroom met de hartbeweging; de laatste vorm, door den schrijver „luchtgolven” genoemd, is een physiologisch verschijnsel en het gevolg van de aanzuiging door de systole van het hart, gelijk aan den druk, die in een pneumothoraxholte kan worden aangetoond. Het verschijnsel is bij normale longen even vaak hoorbaar als bij tuberculose, en wordt soms abusievelijk voor een hartgeruis gehouden.

STANFORD CADE. *Radium treatment of cancer of the tongue*. — De voorkeur wordt gegeven aan behandeling met naalden, die sterk gefiltreerd worden en een week blijven zitten. De hals wordt in elk geval bestraald; operabele klieren bij voorkeur eerst verwijderd, anders na blootlegging bestraald.

HAROLD G. BYWATER. *RAYNAUD's disease with paroxysmal haemoglobinuria*. — Bij een kind van een luetischen vader ontstaan na een psychisch trauma aanvallen van haemoglobinurie met asphyxie van vingers, teenen en ooren.

W. H. OGILVIE. *Retroperitoneal fibroma*. — Uitgaande van voorste ligament der lendenwervels.

GUY BOUSFIELD. *Ineffective swabbing in diphtheria epidemics*. — Neusuitstrijken zijn zeer vaak positief bij negatieve keel, lintstrijkpraeparaat zoodat de negatieve keeluitstrijk niets zegt.

J. PINKHOF.

Dermatologische Wochenschrift No. 39 (Bd. 91) 1930.

G. STÜMPKE. *Psoriasis und endokrines System*. — Bij een patiënte werd de huidziekte gegeneraliseerd, nadat bij haar de eierstokken en de eileiders waren verwijderd. De tweede beschreven patiënt vertoonde als teekenen van een stoornis in de interne secretie: verschijnselen van acromegalie en hyperhidrosis.

S. CAJKOVAC. *Zur pathogenese der Psoriasis*. — Het artikel sluit aan bij SAMBERGER's theorie, volgens welke bij lijders aan psoriasis primair een „parakeratose diathese” bestaat, waarna secundair allerlei microbieele, endocrine, traumatische e. d. „insulten” de aanleiding tot het ontstaan der psoriasishaarden kunnen zijn.

J. SELLEI. *Die Sycosis seborrhoica chronica*. — Van de gewone sycosis wordt een uiterst chronisch verloopende huidaandoening afgescheiden, welke eerst het gelaat aantast (de bovenlip blijft meestal vrij), vervolgens op de cileen, de okselholten, de borst, de mons veneris, de boven- en onderbenen en het behaarde hoofd overgaat (praedilectieplaatsen der seborrhoe). Clinisch zien wij papeltjes en puitsjes op een opmerkelijk vette seborrhoische huid. De aandoening biedt buitengewoon veel weerstand aan iedere tot heden aangewende wijze van behandeling.

LEVEN. *Systematischer naevus sebaceus bei gleichzeitigen Vorhandensein einer Ptosis*. — Casuïstiek.

ORLOWSKI. *Ueber äusserliche Jodwirkung und eine jodhaltige Salbe als Kosmetikum*. — Een elken dag twee keer gedurende 5—6 min. weken achtereen voortgezette massage met cosmiod, deed zoowel histologisch als elastometrisch aantoonbare veranderingen, voornamelijk in de epidermis, ontstaan. (Vermeerdering der epidermiscellen; verbeterde voeding).

J. K. MAYR. *Zur Frage der gonorrhoeischen Provokation*. — Aan een groot materiaal kon worden vastgesteld, dat het aantal recidieven, ontstaan na toepassing

van provocatiemethodes (toegepast 30 dagen, nadat voor het eerst het praeparaat „negatief” was) en het aantal spontane recidieven niet veel verschilt. Een groot deel der na provocatie „niet genezen” gebleken gonorrhoeische infecties, zou dus waarschijnlijk omstreeks denzelfden tijd ook spontaan gerecidiveerd zijn, welke waarneming natuurlijk afbreuk doet aan de waarde der provocatie. Het voordeel dezer handeling ligt daarom vooral hierin, dat wij de latente periode (de afstand tusschen het in schijn verdwenen zijn der gonococcen en het ontstaan van het recidief) kunnen verkorten.

F. JACOBSON. *Spitze Kondylome in der Pars cavernosa der männlichen Harnröhre.* — Bij een patient, bij wien weken te voren spitse condylomen in den sulcus coronarius en langs den mond van de urethra verwijderd waren, en die voor gonorrhoe was behandeld, waarbij massage op metalen staven was toegepast, is waarschijnlijk condylomateus materiaal dieper in de urethra gebracht. Patient kreeg weken later klachten over moeilijkheid en pijn bij de mictie en er ontstond opnieuw afscheiding uit de urethra, welke vrij was van gonococcen. Een urethroscopisch onderzoek gaf opheldering van het geval. Afbeelding.

P. G. RINSEMA.

Wiener klinische Wochenschrift. 1930. No. 37.

Originalabhandlungen H. KUTSCHERA-AICHBERGEN. *Ueber den praktischen Wert spirometrischer Untersuchungen bei Lungentuberkulose.* — Om den niet Röntgenologisch geschoolden arts een vroege diagnose van longtuberculose mogelijk te maken wordt de bepaling van de vitale capaciteit aanbevolen. Bij chronisch induratieve processen vermindert de capaciteit niet noemenswaard, maar bij exsudatieve processen is dit reeds in het begin aan te toonen en wisselt deze met het min of meer gunstige beloop van de aandoening.

A. BERGEL. *Vergleichende serologische Untersuchungen mit der vereinfachten MÜLLERSchen Ballungsreaktion.* — Bij een duizendtal personen werd de gewijzigde reactie van MÜLLER in het bloed of de cerebrospinale vloeistof vergeleken met de reactie van WASSERMANN en de groote gevoeligheid en strenge specificiteit aangevend.

E. RISAK. *Zur Aetiologie des Gelenkrheumatismus.* — Bij een aantal lijdens aan gewrichtsontsteking werd het exsudaat gepuncteerd en onderzocht op P₁₁, eiwitgehalte, aantal cellen en vormen en door cultuur en kleurpraeparaat gekeurd op bacteriën. In het bijzonder de herhaalde onderzoeken geven een juist inzicht over het beloop, bevestigen de opvatting van de primair toxische ontsteking, en toonen aan hoe soms één gewricht na die primaire ontsteking bacterieel geïnfecteerd wordt.

H. JANUSCHKE. *Ueber den Mechanismus der paroxysmalen Herzatennot und des Asthma bronchiale.* — Herinnering aan vroegere mededeelingen, waarin de bronchiaalkramp als oorzaak van de paroxysmale dyspnoe werd aangewezen op grond van de werking van atropine, adrenaline, ijsafkoeling van den hals, inblazing van nirvanine, enz..

K. TSIMINAKIS. *Zur Frage der Narkolepsie.* — Beschrijving van vijf personen, die aanvallen van slaapzucht hadden, meest als rest van een encephalitis lethargica. Verdedigd wordt de opvatting, dat deze ziekte niets te maken heeft met epilepsie of hysteric, maar berust op anatomische afwijkingen van de centrale grijze stof.

H. MAYRHOFER. *Die exsudatieve Pleuritis bei Psoriasis.* — Meermalen is er op gewezen, dat de psoriasis in aetiologisch verband staat met tuberculose: tot ondersteuning van deze opvatting wordt medegedeeld het voorkomen van pleuritis en polyserositis tijdens een psoriasis bij drie personen en bij een vierde de plotselinge activeering van een oude longtuberculose tijdens het ontstaan van psoriasis.

J. SCHNITZLER. *Chirurgie der Leber und der Gallenwege.* — Voordracht van den artsencursus.

TH. STRINTSCHAK *Therapie der Pyelitis und Pyelonephritis.* — Voordracht van den artsencursus.

Richtlinien für die Praxis. J. FABRICIUS. *Wie sollen wir entzündliche Adnexe und Exsudate behandeln.*

J. ED. ST.