

arm. Bij dubbelzijdige, omschreven ponsverweekingen kan het zelfs komen tot verlamming alleen van de beide beenen. De schrijvers vermelden een merkwaardig geval van een dergelijke ponsparaplegie. Zij besluiten daaruit, dat althans bij sommige menschen de pyramidevezels in de pons niet door elkaar, doch voor arm en been gescheiden verlopen. Door dubbelzijdige ponsaarden kan het zelfs komen tot pseudobulbaire paralyse. LHERMITTE en CUEL hebben aan dit syndroom den naam paralyse pseudobulbaire pontocérébelleuse gegeven, omdat naast de classieke pseudobulbaire verschijnselen, veroorzaakt door letsel van de corticobulbospinale vezels, tevens ataxie, dysmetrie, het teeken van ROMBERG, enz. voorkomen, veroorzaakt door dubbelzijdig letsel van pontocerebellaire vezels.

L. HARDENBERG.

Geneesmiddelenleer.

Asthma en dishydrosis door arsenobenzol. — A. SZARVAS beschrijft in *Deutsche med. Wochenschr.* 1934, No. 46 verschijnselen van verhoogde gevoeligheid voor salvarsaan, die hij bij zich zelf heeft waargenomen. Wegens een folliculitis aan zijn linker pink had hij, telkens als hij met lueslijders in aanraking kwam, uit vrees voor besmetting de aangetaste plek gepenseeld met salvarsaanoplossing. Het gevolg was zwelling, roodheid en pijn, welke hem noodzaakte het insmeren te staken. Kort daarop kreeg hij aanvallen van asthma, en op beide handruggen ontstonden sterk jeukende, sterk gespannen blaasjes met helderen inhoud. Na een bestraling met X-stralen verdween deze aandoening voor eenige maanden, maar de asthma-aanvallen werden veel heviger en veelvuldiger. Toen hij na een kort verlof terugkwam, kreeg hij bij het openen van de eerste salvarsaanampul een asthma-aanval, waardoor hij begreep, dat deze met het salvarsaan in verband stond. Pas jaren later bleek hetzelfde van de dishydrosis. De asthma-aanval ontstond ook, als hij neus en mond met watten had afgesloten, indien slechts een druppel salvarsaan op de huid kwam. Toen hij dit vermeed, bleven de aanvallen weg. De dishydrosis, die, naar zijn meening, het gevolg kon zijn van zeep, sublimaat, of van het vele handenwasschen, verdween ook in een vacantie van 5 weken, doch terstond na zijn terugkeer, toen hij voor het eerst weder salvarsaan had ingespoten, kwamen asthma en dishydrosis terug. Sedert heeft hij, met goed gevolg, zich onthouden van het persoonlijk toedienen van salvarsaan.

(Vgl. betreffende overgevoeligheid voor salvarsaan het referaat in Jaargang 1932, blz. 3318).

H. PINKHOF.